

ХОЗЯИНЪ,

СОСТАВЛЯЮЩІЙ

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕГО СОЧИНЕНІЯ И ПЕРВЫЯ ШЕСТЬ ЧАСТЕЙ ЗАНИМАЮЩІЙ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Отдѣленіе второе.

THE NEW YORK

COAST AND GEOD

AND GEOD

THE NEW YORK

THE NEW YORK

ХОЗЯИНЪ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ III ГЛАВЫ.

О Поваренныхъ огородахъ или овощникахъ.

КК. Паровыя гряды къ особливому употребленію.

Кромѣ вышеописанныхъ паровыхъ грядъ дѣлающіяся временемъ оныя къ особливому употребленію, изъ коихъ еще нѣкошорыя для особъ средственнаго состоянія описать должно, другія же на примѣрѣ подѣ спаржу, аршишоки, фиги, земляницу и тому подоб. въ разсужденіи того, что оныя множайшихъ издержекъ требующъ, оставляющіяся для большихъ Господъ, и тѣмъ больше, что означенныя растѣнія, еслии рано будутъ выгнаны, вкусомъ никакъ не могутъ уравниваться вырастающимъ въ обыкновенное время на открытомъ воздухѣ.

1.

Холодныя или слѣпыя паровыя гряды заслуживаютъ между назначаемыми къ особливому употребленію первое мѣсто. Дѣлаютъ ихъ къ тому, чтобъ на открытомъ воздухѣ сидящія растѣнія нѣ-

Часть. IV Отдѣл. 2. А сколь-

сколькими недѣлями имѣть ранѣе, слѣдующимъ образомъ: около площадки, гдѣ ростеиъ спаржа или шому подобныя растѣнія, выкопашъ рвы около 12 вершковъ глубиною, набить оныя шуго конскимъ навозомъ и шакъ, чтобъ навозъ былъ вершка при выше земли. Пошомъ покрывается оной на при вершка выкопанною землею, а оставшаяся земля отгребается къ сторонѣ. Навозъ со сторонѣ не шокмо согрѣвается, но и лежащая на немъ высокою грядою земля зашиту дѣлается отъ суровыхъ вѣтровъ. На другой годъ по разкопаніи рвовъ навозъ уже оказывается согнившимъ и въ добрую землю претворившимся; оной упошребляющъ къ другому, а рвы наполняютъ свѣжимъ навозомъ. Таковыя холодныя гряды не шокмо способны къ выгонянію спаржи, но также огурцовъ, цвѣшной капусты и кардовъ или аршишюковъ. Послѣднія отъ сего въ особливости добрѣющъ. Въ теплыхъ странахъ довольно оныхъ къ выращиванію дынь и арбузовъ.

2.

Паровая гряда изъ сухаго листу способна для шѣхъ, кои къ присмотру за другими паровыми грядами не имѣющъ ни времени, ни охоты. Легко можно усмотрѣть, какъ-то и выше упомянуто было, что обыкновенныя паровыя гряды легко разгорячаются, отъ чего молодыя растѣнія слишкомъ вытягиваются, послѣ

че-

чего въ пересадку не годятся, молодые же всходы даже выгорающъ и сохнушъ. Когда вмѣсто навозу набрать дубоваго или инаго толстаго лиспу, засохшаго осенью, и положишъ какъ бы навозъ въ паровую гряду, то и будетъ паровая гряда, которая хотя не такъ скоро и сильно гонитъ ростъ, ибо медленно разгорячается, но умѣренной ея жаръ бываетъ продолжительнѣе, и нѣтъ опасенія, чтобъ сѣмена и всходы сожгло, или чтобъ растѣнія выпянулись. Они будутъ толстобылы и прочны, а по пересадкѣ удаются лучше взрощенныхъ на обыкновенныхъ паровыхъ грядахъ.

3.

Скорьныя гряды, дѣлаемыя изъ скорья, употребляемаго на кожевенныхъ заводахъ, употребляются съ добрымъ успѣхомъ не шокмо для ананасовъ, но и для многихъ иностранныхъ растѣній, однако не насыпая земли къ воспитанію разныхъ растѣній: ибо влажностъ изъ земли тошчасъ перейдетъ въ скорьныя спружки, принудитъ ихъ слечься, охолодитъ и сдѣлаться безпрлезными. Оныя служатъ только къ поставленію въ нихъ горшковъ, въ которыхъ сидятъ растѣнія, чтобъ оныя чрезъ то согрѣть и побудить къ росту. Миллеръ говоритъ, что употребленіе скорья сего лѣтъ за семьдесятъ предъ симъ изобрѣтено въ Англіи, и отъ него имѣемъ мы первое обстоятельное наставленіе о томъ.

Лучшее дѣйствіе оныхъ то, что ихъ всегда можно удержашъ въ равномъ степеніи теплоты, и что они дающъ жару, сколько нужно, не сжигая корней. Берущъ спружки скорныя шакъ свѣжи, какъ будишь лишь вынуты оныя изъ кожевенныхъ ямъ. Но онымъ, чтобъ произвели хорошее дѣйствіе, не должно бытъ спарѣе 3 или 4 недѣль, а впрочемъ они перегорашъ, спекутся въ глыбы, загниющъ и въ согрѣніе приведены бытъ не могутъ. Не должно же онымъ бытъ и мокрымъ, когда класъ ихъ въ грядѣ, для того что мокрота только гнилошъ производишь и препяшешвуешъ онымъ загорѣться. Разсыпашъ ихъ сперва въ прохладномъ, но сухомъ мѣстѣ тонкимъ слоемъ, чтобъ высохли, а не разгорячились.

Скорныя гряды насыпаются вышиною отъ аршина съ четвертью до полушора. Но для шаковой гряды обводятся каменные стѣнки, и дно въ нихъ выстилаешъ кирпичемъ, чтобъ никакой посторонней земли въ скорѣе не подмѣшалось. На влажномъ мѣстѣ гряда должна бытъ довольно надъ поверхностью земли возвышенна, чтобъ вода въ оную не вбралась, чрезъ что скорѣе вдругъ охолодѣетъ.

Гряда въ длину должна бытъ по крайней мѣрѣ въ четыре аршина съ половиною, или въ 5 аршинъ: ибо, когда скорѣе тѣсно сжать, не можешъ оное прищипи въ наспоющую горячность и оказашъ же-
лае-

лаемую услугу. При наполненіи сего парника должно того смотрѣть, чтобъ скорь ложилась рыхло. Не должно оную угнѣпшать, а еще меньше того ушапывашь ногами; но всегда положивъ доску на гряду поперегъ, станавишься на оную на колѣняхъ шѣмъ, кои горшки вставляющъ и вынимающъ.

Новая шаковая гряда въ горячностъ приходишъ недѣли чрезъ двѣ и три, а въ холодное время не прежде чотырехъ. Въ началѣ сшепенъ горячности бываешъ силенъ, и расшѣнія повредятся, есшли потчасъ горшки съ ними въ грядѣ посшавишъ. Почему вшыкающъ въ разныхъ мѣсшсахъ маленькія палочки въ грядѣ до самаго дна. Выпаскивая оныя и щуная, познающъ настоящій сшепенъ горячести, когда должно горшки вкапывашъ. Всегда держашъ въ грядѣ пару палочекъ, чтобъ знать, когда жаръ убавится и скорь охолодѣешъ. Поелику расшѣнія должно содержашъ въ одинакомъ сшепени шеплошты, шо охолодѣвающія гряды должно возобновишъ, но впрочемъ хорошо устроенная скорная гряда должна по крайней мѣрѣ три мѣсяца бышъ горяча и нешрогаема.

Когда скорная гряда шеплошу свою ушрашишъ, горшки высшавляющъ, взрываютъ скоръ навозными вилами, подмѣниваютъ свѣжаго скорья, въ запасъ содержимага, и перемѣшивающъ все со шщаніемъ; послѣ того гряда получаетъ опяшъ недѣ-

ли на 4 или на 6 достаточную теплоту. Когда ананасы или иныя растѣнія пересаживающѣ весною или осенью, вся гряда возобновляется. Если же старая хорошо сложена была, то шрешью долю верхнихъ спружекъ можно опять употребить, а двѣ шрети прибавить свѣжихъ; но если старыя будутъ влажны и очень исплѣвши, свѣжія отъ нихъ только испортятся, и вся гряда не принесетъ пользы.

Спружкамъ скорымъ нѣтъ ничего вреднѣе мокроты: когда онѣ единожды смокнушя и охладѣющѣ, не можно будетъ привесити ихъ въ горячность, и вырастетъ на нихъ желтая влажная плѣнь, подобная жидкому желтому калу, и которая съ невѣроятною скоростію всюду распространяется, такъ что и горшки оною покроешя.

Изъ таковыхъ тепличныхъ парниковъ вынуждая скорь составляетъ презрядный садовый навозъ, а особливо для твердой, связной, глинистой земли. Обсыпающѣ оною въ садахъ сперва кусты и молодыя деревца, подъ которыми хотяшъ заглушить траву, а послѣ тутъ же зарывающѣ въ землю. Покрываютъ же оною и землянику. Равномѣрно усыпающѣ въ цвѣтникахъ ходы, чтобъ трава не росла, и довольно толстымъ слоемъ, что отъ черной цвѣтчныхъ рабатоковъ земли опливаетъ въ очень хорошей видѣ.

По-

Поелику въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сей
скори въ близости достать не можно,
или оная очень дорога, можно бы испы-
тать вмѣсто оной, собирая осенью обва-
ливающіеся дубовые лиспы, чтобъ были
очень сухи. Можно смѣло полагать, что
онѣ по дробномъ скрошеніи въ спанкѣ,
употребляемомъ для рѣзки, окажутъ всю
желаемую услугу; но положимъ, что онѣ,
чему едва повѣришь можно, не такъ дол-
го, какъ скоръ ивовая, горячестъ въ себѣ
удерживать будучъ, то можно ихъ пере-
мѣнять шѣмъ чаще, потому что осенью
удобно наготовить оныхъ безденежно мно-
жесшво; но обыкновенные спанки крестьян-
скіе, въ коихъ рѣзку крошатъ, къ рѣзанію
лисповъ не очень способны. Потребны къ
сему таковыя, кои естъ уже отчасти у
крестьянъ въ Маркѣ Брандбургскомъ, у
которыхъ вмѣсто того, что рѣзальщикъ
держитъ солому, прижавъ рукою крѣпко,
находится деревянная умѣренно широкая и
толстая крышка надъ усшемъ спанка, ко-
порою солома и все, что крошить надобно,
посредствомъ снасти, къ подножкѣ укрѣ-
пленной, такъ крѣпко сжимается, что длин-
ное и короткое равно очень дробно изкро-
шить можно, такъ что ни одинъ листокъ
не вывернется изъ подъ рѣзца. Въ тако-
вомъ же намѣреніи можно бы испытать
опилки древесныя съ пыльных мѣль-
ницъ, потому что онѣ просыпаясь
въ кучахъ очень разгорячаются, что мо-

жно заключишь по тому, что ужи въ нихъ яйца свои выводяшь, и для того близъ пильныхъ мѣльницъ, гдѣ кучи опилокъ, видимо бываетъ ужей гораздо больше, нежели въ другихъ мѣстахъ. Можешь быть по же можно произвести пенечными и льняными обмяльями, производящими при обминанїи и шрепанїи пеньки и льну: ибо удалось мнѣ видѣть, что незнающіе люди закрывали оными въ ямахъ огородные корни, отъ чего такой жаръ произошелъ, что корни въ короткое время сопрѣли и сгнили. Сего никогда не производилъ отъ соломы, которою обыкновенно шаковыя растѣнїя въ ямахъ закрываютъ.

Чтобъ имѣть ежедневно шампинїоны или печерицы свѣжїя, дѣлаютъ для того особливныя навозныя гряды, къ чему Турнефоръ давно уже въ запискахъ Парижской Академіи наставленїе подалъ. Оныя отличаются отъ прочихъ паровыхъ грядъ тѣмъ, что послѣднія дѣлаются плоско, а сіи съ самаго начала сводомъ, и по срединѣ возвышенны, на стороны же скашомъ; почему оныя у Французовъ называются не couches (гряды), но meules (жерновы). Берутъ же для печерицъ навозъ несвѣжїй; самой старой для нихъ лучшей. Прочїя паровыя гряды требуютъ содержанїя больше въ сухости, а печеричныя гряды требуютъ больше влажности, да и по устройствїи своемъ не нуженъ для нихъ особый присмотръ, кромѣ того, чтобъ свѣже вы-

ро-

роспаяющія печерицы ежедневно снимають; шакже чпо продолжаются онѣ года два и больше, а напослѣдокъ годящся еще въ передѣлку свѣжихъ грядѣ.

Дѣлашь сїи гряды всего лучше осенью, съ Октября по Декабрь, хошя впрочемѣ и во всякое время года заводишь оныя можно, и въ срединѣ съ основанія положишь на аршинѣ безѣ чешверши, или на аршинѣ съ двумя вершками вышиною навозу спараго, копорой по крайней мѣрѣ лежалѣ бы мѣсяцѣ въ кучѣ нешроганѣ. Должно прилѣжно оной въ грядѣ накладывать перебивая; сгребать въ грядѣ шевяки конскаго навозу и раздробившіеся, брашь изѣ конюшенѣ вымешки и класъ въ грядѣ же; попомѣ на каждыѣ шести вершкахъ растоянїя нашыкашь въ грядѣ печеричныхъ кореньевѣ, а естѣли оныхъ недостапочно, разламываешь въ кусочки, и оными грядѣ какѣ бы нашпиковашь.

Заводя въ первой разѣ шаковую грядѣ, должно искашь въ конюшняхъ, или въ старыхъ кучахъ конскаго навозу, или въ старыхъ навозныхъ грядахъ, нѣтъ ли въ оныхъ бѣлымъ пороспшаго и какѣ бы заплѣсневлaго, или бѣлою паушиною покpышаго навозу. Можно же вмѣсто сего брашь землю съ шого мѣста, гдѣ много печерицъ роспѣтъ кучками, выбирая мѣста, пророспшія бѣлыми жилами; или когда печерицы на поварнѣ очищаютѣ и приготавливаютѣ, шо очиспки съ нихъ, въ

осо-

особливости же нижнія пшочки съ жилами собравъ размешать въ погребѣ, или въ иномъ влажномъ мѣстѣ между сараго навозу до употребленія. У кого же есть старыя печеричныя гряды, и кто хочетъ оныя только возобновить, тому легко изъ старой гряды выбрать все свернувшіяся и бѣлыми жилами проросшія глыбы, положить къ мѣсту и послѣ разкласъ въ новой грядѣ.

Когда по вышеписанному зародыши печерицъ въ гряды положены будутъ, засыпать оныя дробнымъ навозомъ, а потомъ на вершокъ толщины доброю землею, или взять земли изъ вырышай на томъ же мѣстѣ, когда основаніе гряды копано было, а прочую сносить прочь. Кому угодно, можетъ такую гряду обложить досками, а по нѣсколькихъ дняхъ уложить широкою доскою; на послѣдокъ бока гряды на нѣсколько пальцевъ прикрыть длиннымъ навозомъ, а ребро или верхъ оставить открытъ. Спуская восемь дней повторяютъ это еще нѣсколько разъ, а потомъ спустивъ недѣлю снимаютъ всю прикрытие, но такъ, чтобы дробной соръ отъ длиннаго навозу остался. Прикрываніе это два раза повторяется и тѣмъ работа за гряды кончится. Нѣкоторые выкаютъ грибные зародыши не по вышеписанному, но выбираютъ самые рослые спѣлые грибы, шляпки оныхъ разрѣзываютъ въ кусочки, и ввечеру разбрасываютъ по навозной грядѣ.

Есть-

Есѣли весенняя погода будетъ не холодна, то на грядахъ, сдѣланныхъ осенью, появившя грибы уже въ Маѣ, или неопмѣнно въ Іюнѣ, и можно будетъ оныя ежедневно обираѣ. Когда же лѣтомъ сѣлая зародышами изобильно проросшяя гряда будетъ передѣлываема, или возобновляема, можно съ нее получить по прошествіи шести недѣль свѣжѣе грибы. При обираіи должно имѣѣ оспорожность, чтообъ нижнихъ пѣпочекъ корешка изъ земли не выламываѣ, или когда вырваны будутъ, опяѣ ихъ въ землю вошкнутъ, а произходящую отъ того ямочку свѣжею землею заровняѣ; такъ же длиннымъ соломеннымъ навозомъ всю гряду прикрывѣ.

Во Франціи сѣлаютъ навозъ для грядъ печеричныхъ лучшимъ кобылей, а самымъ лучшимъ муловей. Также навозу, произходящему отъ всякой соломы, употребляемой въ подспилку въ сѣйлахъ вмѣсто обыкновенной ржаной, даѣѣ преміумство.

Когда для другихъ паровыхъ грядъ избираютъ всевозможно лучшее положеніе къ солнцу, то для печеричныхъ назначаѣ хоя открытое, но солнцу не очень подверженное, нѣсколько тѣнисное и влажное мѣсто. Шириною занимаѣѣ оное въ аршинъ съ четвертью или въ полтора, длины произвольной, вынимаѣѣ лопаткою земли на нѣсколько пальцевъ,
выкла-

выкладываяиъ оную по бокамъ, и выводяиъ гряду навозомъ по вышенисанному. На рухломъ песчаномъ мѣстѣ гряды сїи удаюиъся лучше, и грибы приносяиъ ранѣе; на плошной же мокрой землѣ должно гряды выводитъ нѣсколько выше. Не надлежииъ ихъ опускаиъ въ землю, но настилаиъ на поверхноиъсти земли, усыпаяиъ на нѣсколько пальцевъ пѣскомъ мѣлкимъ или крупнымъ, и тогда уже класиъ навозъ, чшобъ вода внизу спекала. Дѣлаюиъ же гряды на сухомъ песчаномъ мѣстѣ для весны и осени, а другїя въ нѣсколько шѣнистомъ и влажномъ мѣстѣ для самыхъ жаркихъ лѣтнихъ мѣсяцовъ. Подобнымъ же образомъ дѣлаюиъ сїи гряды въ теплыхъ погребахъ или выходахъ, дабы имѣиъ грибы зимою, но къ сему пошребно имѣиъ больше зародышей грибныхъ.

Когда печеричныя гряды повысохнуиъ, должно оныя въ жаркое время ежедневно, или такъ часто, какъ пошребуетъ нужда, поливаиъ, къ чему брать стоячую солнцемъ согрѣшую воду. Гдѣ нѣиъ иной воды, опричь рѣчной, должно даиъ оной нѣсколько дней постояиъ въ кадкѣ; можно же оную и подогрѣиъ, что въ холодныя лѣта всего легче произвесиъ прибавкою горячей воды. Охошно же къ поливанїю беруиъ помои, въ кошорыхъ перемываны печерицы.

Кто желаетъ кромѣ печерицъ имѣть
 другіе грибы, на примѣръ рыжики, *agaricus
 deliciosus* у *Линнея*, или лисицы, *agaricus
 cantarellus* у *Линнея*, и до которыхъ
 иные лучше охошники, чѣмъ до печерицъ,
 должно запасшись зародышами оныхъ,
 такъ какъ выше сказано о печерицахъ, на-
 бравъ оныхъ на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ они
 росшутъ, или спѣлыхъ сихъ грибовъ из-
 рубивъ въ кусочки, ввечеру разбросать
 по грядѣ. Для обоихъ теперь помяну-
 тыхъ грибовъ должно гряду заводить не
 на низкомъ, мокромъ, но на высокомъ,
 песчаномъ мѣстѣ, и чтобъ она больше
 въ тѣни, нежели на солнцѣ лежала. Дол-
 жно въ этомъ случаѣ подражать тому
 мѣсту, на каковомъ грибы сїи отъ при-
 роды росшутъ, между деревьями, гдѣ лу-
 чи солнца изрѣдка освѣщаютъ. Землю
 подъ сїи грибы лучше брать изъ боровъ,
 т. е. краснотѣся съ поверхности, гдѣ
 грибы сїи обыкновенно росшутъ. Если
 можно сыскать въ пыль согнившую коло-
 ду сосновую или еловую, и смѣшавъ оную
 съ доброю песчаною землею, на таковой
 грибы сїи урожаются лучше. Можно же
 таковымъ образомъ расшить и сморчки,
 а именно круглые, т. е. глухими называе-
 мые. Остроконечные же сморчки или ран-
 ніе, требуютъ гряду, больше глубокую,
 влажную, и для которой рыхлой садовой
 черноземъ всего лучше. Въ нѣкоторыхъ
 домахъ сморчки свѣжіе употребляются
 охо-

охотнѣе сушеныхъ: въ самомъ дѣлѣ они вкуснѣе, и даже просполудимы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оныхъ много родится, пригошворяющъ изъ нихъ очень вкусное блюдо. Варяшъ ихъ съ говядиною и петрушкою хлѣбанья. Кому надобно, чтобъ сморчки на грядѣ вышли еще въ началѣ Апрѣля, естли погода не холодна, должно гряду на ночь прикрывашъ ошъ морозовъ досками или рогожами, а днемъ прошивъ солнца открывашъ, и гряду держащъ въ умѣренной влажности, потому что они на сухомъ мѣстѣ не роспущъ.

В. Унавоживаніе огорода.

Когда въ земледѣліи не все равно, какой навозъ класъ въ разсужденіи свойства земли и сѣемаго полеваго плода; шакъ для овощника еще болѣе причины сдѣлашъ между различными навозами исправный выборъ.

Въ шеплыхъ странахъ *ослиной навозъ*, котораго у насъ мало или вовсе нѣтъ, всѣмъ прочимъ шукамъ предпочитася. У насъ вмѣсто онаго очень годишся *навозъ рогатаго скота*, къ содѣланію сухой и шощей земли плодоносною, къ чему онъ за шучностію своею очень способенъ.

Овечій навозъ занимаетъ второе мѣсто; онъ шучнѣе, но и горячѣе перваго; почему можно его съ пользою употребляшъ на влажной и холодной пошвѣ земли.

Кон-

Конской навозъ изъ всѣхъ навозовъ худощавѣе и горячѣе, а потому всего лучше употреблять его для очень холодной и приномъ очень влажной земли, или шаковыхъ растѣній, кои требуютъ много жару. Выше при описаніи паровыхъ грядъ сказано, что онслужившій въ оныхъ навозъ еще годенъ. Когда онъ чрезъ лѣто хорошо перепрѣвѣтъ, горѣть уже болѣе не будетъ, и тогда можно употреблять его съ великою пользою къ учиненію твердой, плотной земли рыхлою.

Противоположеніе конскому навозу составляетъ навозъ свиной, яко самый холоднѣйшій, и класъ оный должно въ землю горячую, требующую охлажденія; но можно оной и всюду употреблять, когда гдѣ надобно, чтобы нѣкопорыя поваренныя растѣнія позднѣе обыкновеннаго поспѣли, или въ силѣ на мѣстѣ своемъ удержаны были. Когда, на прим. надобно, чтобы качанной салатъ, а особливо въ очень жаркую и сухую погоду, нѣсколькими недѣлями ранѣе пошелъ въ сѣменные спѣволы, должно высаживать оной на гряды, удобренную свинымъ навозомъ. Съ разными капустами, мѣсячнымъ редисомъ и тому подобнымъ, равное обстоительство. Также и земляника поспѣваетъ мѣсяцомъ позднѣе, если буденъ посажена на мѣстѣ, удобренномъ свинымъ навозомъ; но въ разсужденіи свиного навозу должно въ особенности на то взиранъ, чтобы оной

Часть IV. Отдѣл. 2. Б. . . не

не наполнилъ овощника сѣменами сорныхъ травъ, а это происходитъ отъ того, что свиней кормящъ азадками или высѣвками сырыми незапаривая, въ копотахъ бывающъ дробныя и легкія сѣмена сорныхъ травъ. Сего же должно опасаться, когда сѣи азадки, смѣшавъ съ хлѣбными зернами, хруско мѣлющъ для свиней, при чемъ мѣлкія сѣмена сорныхъ травъ отъ дѣйствія жернова ускользающъ.

Голубиной и куриной навозъ можно либо одинъ, или съ другимъ дробнымъ перепрѣвшимъ навозомъ смѣшавъ, употреблять. Голубиной навозъ шученъ и притомъ очень согрѣвающъ, почему очень способенъ для растѣній, перешедшихъ къ намъ изъ горячихъ климатовъ; но когда голубей и куръ кормящъ въ ихъ голубяшняхъ и курятникахъ, то съ этимъ навозомъ попадаетъ много сѣменъ сорныхъ травъ въ овощникъ. Какъ у меня сѣе происходитъ, употребляю я пошому голубиной и куриной навозъ подъ деревья, насыпая онаго на самые корни ихъ, что производитъ очень скорое дѣйствіе: ибо видѣлъ, что устарѣвшія и плодъ носивъ давно переспавшія деревья, когда лишь оныя весною сказанными навозами такъ обложены были, что земля около пней по самые корни была взрыта и вынута, навозъ на нихъ положенъ и тою же землею закрытъ, тошчасъ къ отпрыску вѣшвей появилось на нихъ множество почекъ, и деревья на

на другой годъ принесли много и крупнѣйшихъ плодовъ, нежели въ молодости своей; а чрезъ то какъ бы помолодѣвъ, продолжали лѣтъ 5 или 6 свое плодоносіе, послѣ чего шѣмъ же навозомъ ихъ поддобривали.

Хошя при ражолірованіи кладушъ въ глубину лучше цѣльный, свѣжій, длинный, не перегорѣвшій навозъ, но очень выгодно какъ подъ цвѣты, шакъ и поваренныя растѣнія, при обыкновенномъ обрабашываніи и копаніи земли, класъ не свѣжій, но самой дробный и перешлѣвшій навозъ: ибо оной по ежедневнымъ опытамъ и всегдашнему обычаю искусныхъ садовниковъ только въ овощникахъ себя опмѣнно оказываетъ. Прослѣдимы хотя берушъ самый свѣжій и неперешлѣвшій навозъ, однако имѣлъ бы онъ своихъ огородныхъ овощей вдвое числомъ больше и лучшихъ, когдабъ могъ употребить навозъ, хотябъ полгода лежавшій и раздробившійся. Опчастіи выдають они не рѣдко предъ воротами большихъ городовъ, какъ у садовниковъ въ огородахъ ихъ по нѣскольку лѣтъ лежатъ большія кучи длиннаго соломеннаго навозу, и дають оному прежде совсѣмъ перешлѣть, нежели употреблять къ унавоживанію своихъ овощниковъ; однакожъ у крестьянъ навозу мало, и они счастливыми себя считаютъ, когда достанетъ у нихъ на все длиннаго навозу: они не успѣли бы въ этомъ, когда бы своей сначала большой навозной

кучѢ дали до того долежать, чѣмъ сдѣ-
 лалась она малѣе; однакожъ получали бы
 они больше и лучшихъ огородныхъ расшѣ-
 ній, когдабъ въ овощникѢ своемъ занима-
 ли подѣ нихъ только малое мѣсто, и
 столько пространства, сколько могли
 бы употребить переплѣвшимъ дробнымъ на-
 возомъ, отпѣляя онаго излишекъ отъ па-
 шенъ. На твердой, вязной глинистой
 почвѣ годится, чѣмъ къ разлученію и
 содержанію въ рыхлости частей ея упо-
 треблять меньше дробнаго навозу, а толь-
 ко перегорѣвшій; но на неплодной землѣ,
 каковѣ черной и бѣлой песокѣ, или болош-
 ная земля черная, соплѣвшій навозъ все-
 гда лучшую услугу оказываетъ. Въ пере-
 плѣвшемъ навозѣ oprичъ того есть не
 маловажная выгода, что отъ него мень-
 ше полютъ производися: ибо въ сыромъ
 навозѣ находившіяся шравныя сѣмена отъ
 долговременности сопрѣвѣи и къ всхо-
 дамъ учиняиця неспособны. Оказывает-
 ся же, что столько вредный расшѣнїямъ
 земляной сверчокъ (*Heit-Wurm*, ш. е. верхо-
 вой червь по Нѣмцки; *gryllotalpa*, заводяи-
 ся гораздо меньше, или совсѣмъ не быва-
 еиъ въ грядахъ, унавоженныхъ дробнымъ на-
 возомъ, а въ свѣжемъ всегда; пошому чѣмъ въ
 немъ больше теплоты, и пошому къ
 жишю его привлекаетъ, какъ-шо равно-
 мѣрно оказываеиця въ разсужденіи столько
 вредныхъ молодымъ расшѣнїямъ земля-
 ныхъ блохъ.

Мно-

Многіе огородники предпріемлютъ унавоживаніе овощниковъ осенью, чіпобъ землю тѣмъ больше умягчить, и меньше бы постороннихъ травъ выросло. Справедливо, что свѣжій навозъ много сѣменъ сорныхъ травъ въ себѣ содержишь, и съ собою въ землю вносишь и скоро вырастаетъ. Однакожъ есть нѣкоторыя негодныя травы, кои въ самомъ проростаніи своемъ, опчаси же и по входѣ зимою, не вызыбають; почему должно осенью вскопанную землю, когда она лѣтомъ очень засорилась сѣменами негодныхъ травъ, весною еще вскопать, еслили осеннее копаніе происходило не очень поздно. У кого же земля не очень плошная, тому вскапываніе земли осенью не нужно; а и того меньше, еслили огородъ положенъ на низменъ, и вода въ зимнія оттепели глубоко оной покрывается: ибо на такихъ оказывается, что силу навоза излишняя мокрота, на поверхности земли стоящая, очень высасываетъ и тѣмъ уменьшаетъ. Сего на плотной возвышенно лежащей землѣ совсѣмъ опасаться не можно.

Ежегодно ли овощникъ должно унавоживать, въ этомъ каждому можетъ руководствоваться состояніе почвы земной и растѣній, на ономъ водимыхъ, поному что иныя растѣнія больше питаются отъ земли требуютъ, или землю больше истощаютъ. Есть огородники, у которыхъ

навозъ, въ отношеніи къ величинѣ овощника, бережливое хозяйствованіе предлагаетъ, почему они алчностъ земли своей къ навозу извѣдали: они берутъ посудину, кладутъ въ нее пригоршни земли, и разбалшываютъ съ водою. Еслили окажется, что въ этой смѣси довольно молодил или пѣны на поверхности плаваютъ, кошорая не скоро пропадетъ, или на дно упадетъ, заключающъ изъ того, что земля ихъ еще довольно тучна и не требуетъ прибавки навозу. Я считаю, что поступаютъ они въ этомъ опытѣ очень благоразумно, нежели бы ненадежную землю заняты сѣменами и высадками, а по ихъ бы слабому росу уже узнавали надобностъ къ возстановленію силъ ея посредствомъ новаго унавоживанія.

Г. Всапываніе огорода.

Упомянуто уже прежде при случаѣ унавоживанія овощника о всапываніи, что оное подъ зиму на твердой пошвѣ полезно быть можетъ: ибо чрезъ проходящую отъ того рыхлосъ влага отъ снѣговъ и дождей не шокмо лучше втягивается въ нее, но и морозы лучше прохвапываютъ и умягчатъ могутъ; равнымъ образомъ, что отъ природы мягкая земля въ таковомъ осеннемъ прѣугошвлѣніи не имѣетъ особливой нужды.

Въ садовническѣ называется послѣ осенняго произведенное, или весною повпоренное всапываніе земли *взворапываніе*,

нїе, котораго не должно дѣлать, пока еще снѣгъ лежитъ, или когда замерзшую поверхность земли еще не распустило: ибо, у кого нѣтъ преимущественно теплой земной пошвы, земля чрезъ то столько охлаждается, что позднѣе выходящїя растѣнія во все лѣто опстають; это равномерно и въ хлѣбопашествѣ примѣчается.

При вскапыванїи и взворачиванїи овощника должно совѣщываться съ погодою, потому что онъ сего какъ польза, такъ и вредъ произойти можетъ; почему засуха и жаркое время для скапыванїя совсѣмъ не выгодна: ибо тогда не въ пору опшверзшая земля дѣйствию воздуха и солнца слишкомъ предоставляется, кои лучшую оной силу уносятъ и у растѣній опнимають.

Сама по себѣ рыхлая или неплотная земля можетъ быть въ дождливую погоду вскапываема; плотной же глинистой чрезъ то приключается великой вредъ: ибо мазкая земля тогда еще больше сгнѣшается, такъ что въ послѣдствїи корни растѣній за твердостїю ея не могутъ простираяться и сыскивать свое питанїе. Если по вскапыванїи послѣдуютъ дожди, произойдетъ плотной землѣ равномерно помянутый вредъ!

Взворачиванїе или впоричное копанїе земли весною не должно производиться слишкомъ поздно, чтобы травы и были-

нки землю не шокмо ко вреду слѣдующихъ за шѣмъ огородныхъ растѣній не обезсилѣли, но и положенія не учинили шруднымъ; для того что корни долголѣтнихъ злаковъ и сорныхъ травъ чѣмъ болѣе стоятъ, шѣмъ больше умножаются и укрѣпляются, и по выполоніи опять множествомъ появляются.

При копаніи должно работниковъ поощрять, чтобъ корни негодныхъ травъ сколько возможно сыскивали, вынимали и въ землѣ бы оныхъ не ославляли. Чѣмъ прилѣжнѣе это производится, шѣмъ больше работа полонія облегчается.

Еслили вскапываніе овощника производится въ раздѣлѣ посаженно, работники очень могутъ обманывать шѣмъ, что когда хочешь вскопать глубже, вскапываютъ они мѣльче; потому что послѣднее легче. Когда копать глубоко, заступъ не должно пускать въ землю наискось, но прямо и глубоко втыкать: даже когда за работою по слѣдамъ наблюдать, то плущующіе работники, пуская заступъ вкось, невскопанныхъ цѣльныхъ мѣстъ землю не прикрывали. Если изъ нихъ шакіе обманщики, кои два раза заступомъ захватятъ, а на третью ширину заступа пропускаютъ, и закрываютъ землю, вынупую въ смежномъ мѣстѣ, а шѣмъ отъ глазъ сокрываютъ. Чтобъ таковыхъ плутовъ содержать въ опасеніи, должно Хозяину посохомъ своимъ

имъ въ разныхъ мѣстахъ во вскопанную землю шыкать, и чрезъ то испытывать, довольно ли глубоко оная вскопана всюду. Корневья растѣнія, дабы хорошо уродились, требуютъ глубоко вскопанной земли; салаты и капуста пускаютъ корни больше въ стороны, нежели въ глубину, и пошому не требуютъ такого глубокаго вскапыванія. Между тѣмъ въ разсужденіи глубокаго вскопанія должно брать въ разсмотрѣніе находящіяся подъ поверхностью неравные слои земли, чшобы той негодной земли не вывормить на поверхность, кошую землю въ садовничествѣ называютъ дикою или голодною.

Д. Объясненіе огорода.

Когда овощникъ унавоженіемъ и копаніемъ приведенъ будетъ къ лучшему плодоносію, потребны уже только добрыя сѣмена къ возвращенію лучшихъ поваренныхъ растѣній.

Избирая сѣмена домашнія, можно и должно знать, какъ оныя спары, и способны ли еще ко всходу; покупая же сѣмена, можно въ разсужденіи старости ихъ легко быть обмануш, какъ-то нѣкоторыя сѣмена, кои у насъ выпѣвать не могутъ, выписываютъ изъ теплѣйшихъ странъ. А чшобъ покупныя не обманули, испытываютъ оныя заблаговременно, чшобъ въ случаѣ негодности успѣть другими запасшися. Лучшій же опытъ сѣменъ зимою таковъ: взявъ льняную ветошечку, положить въ

оную щепотку сѣменѣ, завязавъ ниткою такѣ, чтобѣ при разбукинутіи оныхъ довольно еще проспору вѣ узелкѣ осталось; положишь эшопѣ узелокѣ на сушки вѣ теплую воду, послѣ вѣ наполненной землею и близѣ печи поставленной горшекѣ зарышь, содержать вѣ умѣренной теплотѣ, и полишь, чтобѣ сѣмена лучше вѣ узелкѣ проросли. Чрезѣ нѣскольکو дней покажутся всходы ихѣ изѣ горшка, и по вынутіи узелка можно усмотрѣшь, всѣ ли сѣмена взошли, или вѣ пропавшемъ случаѣ ни одно не проросла сѣмѣ. Еслили же испытывающіяся таковыя сѣмена, кои вѣ огородѣ нѣскольکو недѣль лежатѣ до всходу, таковыя должно мочить по крайней мѣрѣ сушки двои или прои, прежде нежели узелокѣ сѣ ними зарышь вѣ горшокѣ сѣ землею. Таковы сѣмена луку, пасарнаку, пепрушки, селлерей, мелиссы, Испанскаго луку, и проч. Нѣкоторые крапчайшимѣ способомѣ испытывающѣ сѣмена только за четверть часа предѣ посѣвомѣ, кладущѣ оныя вѣ воду, и которое не упадетѣ на дно, считающѣ то заморухомѣ и невсхожимѣ; однакожѣ эшопѣ водяной опынѣ не совсѣмѣ достаточенѣ кѣ испытанію старости сѣменѣ вѣ разсужденіи того, не сдѣлались ли оныя неспособными ко всходу: ибо нѣкоторыя круглыя и тяжелыя зерна, хощя вѣ водѣ понушѣ, но ко всходу уже устарѣли. Впрочемѣ впереди при каждомѣ ра-

распѣнїи показано будетъ, котораго сѣмена долго ко всходу способны осмѣются.

Многіе садовники, имѣющіе надобность въ раннемъ всходѣ сѣменъ, мочатъ оныя, и за нѣсколько часовъ предъ посѣвомъ опять просушиваютъ, чѣмъ не слиплись и не было препятствія въ разсѣванїи оныхъ; или, когда сѣмена еще мокры, подмѣшиваютъ въ нихъ золы, копорая сѣмена обильяетъ и осушиваетъ. Къ размачиванію же сѣменъ дождевая вода считается лучшею, и класъ оныя въ нее на супки.

Не всѣ сѣмена одинакою глубиною сѣются. Когда сѣмена раздѣлить на три рода: на большія, среднія и малыя, можно будетъ вообще показать глубину положенія ихъ въ землю. Крупныя сѣмена суть свекольныя, сафлоровыя, черныхъ овсяныхъ кореньевъ, кардобенедикшвы, овсяныхъ кореньевъ, паспарнаковы и тому подоб. сїи требуютъ глубочайшаго положенія въ землю. Среднія сѣмена, какъ-то луковыя, салатныя, петрушкины, бѣлой рѣпы и капусы, меньше глубоко землею закрываются. Дробныя же сѣмена, на примѣръ, маїорана, шимїяна, ложечной травы, селлерей, мелиссы и тому подобныхъ, очень мѣлко только граблями въ землю загребаются.

По вскопанїи земли, на которой сѣять крупныя сѣмена, предъ посѣвомъ оныхъ гра-

граблями не взгребають; сѣють или сажаютъ ихъ, какъ скоро сдѣланная гряда нѣсколько осядетъ, и пошомъ загребаютъ граблями на гладко. Но иначе должно поступать съ средними и мѣлкими сѣменами. Послѣднія лучше сѣять въ землю, нѣсколько полежавшую, нежели свѣже-вскопанную, которая прежде ногами ушоппана, послѣ же гладко выграблена и уравнена; по оной сѣмена разсыпають, и либо слегка запрушаютъ землею, или слегка широкою дощечкою въ землю вдавливаютъ. Еслили столько дробныя сѣмена попадутъ глубоко или крѣпко землею сгнѣшены будутъ, нѣжные ростки оныхъ не пробьются и задохнутся отъ твердости земли.

Г. Рейххардъ въ своемъ *Land- und Garten-Schatz*, Th. I. С. 19 говоритъ, что корень въ особливости не больше, какъ два, а никогда три года сряду, должно сѣять на одномъ и томъ же мѣстѣ; вообще всякія сѣмена ежегодно должно мѣстомъ перемѣнять. Гдѣ на прим. въ прошломъ году сидѣли корневые растѣнія, тамъ онымъ въ нынѣшнемъ году оставаться не должно; для того что прошлогоднія растѣнія сокъ, себѣ надлежащій, въ этомъ мѣстѣ слишкомъ вытянули. Когда на другой годъ сядутъ шупъ растѣнія другого рода, будутъ они питаться сокомъ, для нихъ оставшимся, и которой собственно только имъ свойственъ. Въ тожь время земля отдыхаетъ и запасается соками, кои

кои высосали изъ нее въ прошломъ году
корневья растѣнія, и получаеиъ время
собраться съ новыми силами. Въ хлѣбо-
пашествѣ опыны это совершенно под-
тверждающъ; въ садовничествѣ же кое въ
чемъ находящся извѣстія, имѣющія осно-
ваніе свое опчаспи въ ежегодномъ добромъ
унавоживаніи, частью же въ особливомъ
свойствѣ земной пошвы. Такъ на прим.
въ моемъ жилищѣ видимы очень обширные
крестьянскіе овощники, въ копорыхъ еже-
годно, почти въ шеченіи ста лѣтъ, все-
гда на одномъ и томъ же мѣстѣ сажающъ
лукъ, снабжающій всю округу, копорой
всегда выходилъ равной доброты, и то-
гда лишь бываеиъ плохъ, когда занято
будеиъ подъ него новое мѣсто, на копо-
ромъ луку не сиживало. Луковые огороды
состояиъ изъ черной, но не очень низко
лежащей болошной земли, копорую въ
зимнія опшпели водою очень промачи-
ваеиъ, хошя и не заспаиваетсѧ она лужа-
ми. Смѣжное по сосѣдству къ сему мѣ-
сту Курфирсѧ Саксонскаго село Линшовъ
сажаеиъ у себя на огородахъ равнаго свой-
ства земли болѣе уже ста лѣтъ сряду
множесшво бѣлой капусты, къ снабженію
оною сосѣдственныхъ селеній, на Флеминг-
скихъ горахъ состоящихъ, кои за высо-
кимъ своимъ положеніемъ не имѣющъ спо-
собныхъ мѣстъ подъ капусту. Сія капу-
ста также всегда сажаетсѧ безъ перемѣны
на одномъ мѣстѣ, и урожаеиъ такъ хо-
рошо,

рошо, что врядъ ли и въ Голландіи выходящъ таковыя кочни.

Лучшій способъ къ разсѣванію сѣменъ, чтобъ наполненную оными горсть крѣпко ежашъ можно было, передній или указательный перстъ, прежде нежели рука изъ мѣшка сѣ сѣменами вынуша будетъ, протянушъ прямо, большой палецъ близъ онаго перста наложитъ сверху трехъ прочихъ перстовъ. Посредствомъ этой уловки можно изъ подъ указательнаго перста и большого пальца для самыхъ drobныхъ сѣменъ производить таковое малое отверстіе, что оныя при движеніи кисти и руки очень рѣдко выскакивать будутъ, и сѣ помощію воздуха доспапочно въ рознь разлепашься. Когда обсѣвается большое проспанснво мѣста, для каждаго верженія захватывашъ сѣменъ по равному количеству въ руку, чтобъ пересуупленіе ногою и верженіе между собою согласовались. Но какъ одни сѣмена другихъ бывающъ легче, и пошому далѣе оплешающъ, должно въ этомъ случаѣ наблюдать, чтобъ послѣ верженныхъ сѣмена начинали ложиться сѣ того мѣста, гдѣ прежде верженіе окончалось, также чтобъ второй ходъ по смѣжной полосѣ отъ первой опстоялъ ни близко, ни далеко. Когда высѣваются очень drobныя сѣмена, на примѣрѣ, макъ и пому подобныя, то ходы должны разстоять между собою не болѣе аршина. Смѣшиваніе

нїе же дробныхъ сѣменъ сѣ пескомъ, къ воспрепятствованію густой оныхъ повалки, и чрезъ что намѣренія совершенно не достигаютъ, будетъ уже не нужно, когда наблюдашь предписанную уловку въ сѣяніи.

Е. Полоніе, поливаніе и персадка.

Выпалываніемъ негодныхъ травъ не должно ни спѣшить, ни опаздывать. Въ послѣднемъ случаѣ земля ко вреду молодыхъ растѣній будетъ очень истощена, въ другомъ же общоясельствѣ останет-ся еще много сорныхъ травъ, кои за ихъ малосію усмотрены не будутъ, или корни ихъ еще въ землѣ скрываются, которые у сорныхъ травъ очень нѣжны, и при выдергиваніи прирываясь, вновь кушны травъ сихъ производятъ.

Равнымъ образомъ оспаются корни въ землѣ, когда оныя отвердѣютъ. Когда земля мокра, полонія не производятъ, чтобъ во множествѣ къ корнямъ прилипающей земли не выпаскивать. Также въ мокрой землѣ полоніе производящіе люди колѣнами своими выдавливаютъ ямы, отъ чего бываетъ не токмо непріятной видъ, но и много нѣжныхъ растѣній отъ того пропадаютъ.

Въ сухмень и при жаркомъ солнечномъ сіяніи полоніе также не хорошо, потому что смѣжные корни огородныхъ растѣній, при вытаскиваніи смѣжныхъ сорныхъ травъ, съ мѣста своего прогаются, отъ солнца увядаютъ, и шѣмъ въ

ро-

роспѣ своемѣ очень задерживающіся. Равно-
мѣрно спраждущі растѣнія, когда полю-
щіе на нихъ опирающіся, давящі и осла-
бляющі, что очень примѣнно въ тако-
вомѣ въ жарѣ выпалыванномѣ мѣсцѣ, ско-
лько растѣнія на ономѣ прошивъ грядѣ,
въ другое время полонныхъ, ошстающі,
какѣ - шо лакшукѣ, кромѣ задленія въ ро-
спѣ, дѣлается жеснкѣ, и долго или во-
все никогда нѣжности своей ошѣ шого не
получишѣ. Естѣли помянушая погода го-
сподснвуетѣ, избирающі упрѣ или ве-
чернее время, когда жарѣ солнца не шаковѣ.

Естѣли садовники не хошишѣ корней
сорныхъ шравѣ вышаскивашѣ руками, упо-
шребляющі къ сему малые полошѣбенные
крюки, имѣющіе два или шри зубца, вер-
шка въ полшѣора дліною. Можно упошреб-
ляшѣ къ сему ошпроконечной деревянной
ножѣ изѣ самага сухаго швердаго дерева,
на примѣрѣ, клену и шелковичнаго дерева;
онымѣ корни сорныхъ шравѣ подрѣзывашѣ,
и шогда уже ихѣ вышаскивашѣ, а особли-
во, когда они глубоко сидишѣ. Для расшѣ-
нній, сидищихѣ прямыми большими рядами,
какѣ - шо капустѣ, каршофелей, шабаку
и проч. упошребляющі обыкновенную ка-
пустную мошыку, чтошбѣ сорныя шравы
оною вырубать рядами; къ сему способ-
нѣе сухая, нежели влажная погода; ибо
въ послѣднюю корни легко ошживающі и
ошпросающі, въ первую же напрошивѣ
скоро увядающі и засыхающі.

Кѣ

Къ вычищанію дорожекъ сухая погода также лучше, употреблять ли къ тому обыкновенную лопашку, или шраву съ корнями выдергивать, къ чему въ недосипашкѣ желѣзнаго ножа можетъ служишь помянутый деревянный.

Не хорошее то обыкновеніе, чтобъ выполонныя сорныя шравы бросать въ навозныя кучи, или на скопномъ дворѣ, чтобъ свиньи лучшія изъ нихъ могли выбрать. Большая часть изъ выполонныхъ шравныхъ корней осипается въ кучѣ свѣжа и жива, а въ эшомъ состояніи временемъ попадаетъ съ навозомъ на пашню, и служишь къ размноженію сорныхъ шравъ. Выполонныя шравы должно либо въ уголку огорода складывать въ большую кучу, дасть онымъ сгнивать, и шѣмъ обращаться въ добрую огородную землю, или на скопномъ дворѣ, гдѣ нѣтъ навозу, разбрасывать шонкимъ слоемъ, и даже переворачивать, чтобъ шѣ шравы, копорыхъ свиньи не шронуть, совсѣмъ высохли и замерли.

Поливаніе можетъ быть сколькожъ вредно, какъ и выгодно, по обспояшельству погоды, самому производству и соспоянію воды.

Въ разсужденіи годового времени должно поливаніе производить съ различіемъ. Весною поливать еще не взошедшія сѣмена, такъ и взошедшія по упру; лѣтомъ всего лучше къ вечеру, или очень рано по

Часть IV. Отдѣл. 2. В упру

ушру, пока еще солнцемъ поливаемое мѣсто не освѣтило: ибо лѣтнее солнце не шокмо влажноснѣ скоро выпягиваетъ, но и поливаемая подъ солнцемъ растѣнія останавляющя въ своемъ роснѣ, листы на нихъ мало по малу желнѣющъ и совсѣмъ погибающъ. Естли же солнечной жаръ убавится, можно поливать и предъ полуднемъ или послѣ полденъ.

Поливаніе должно производить, не тогда шокмо, какъ земля высохнетъ, дабы отвратить гибель растѣній, но чшобъ вспомошеснвовашъ сильнѣйшему ихъ росшу, или ускоренію ихъ спѣлости и умноженію ихъ совершенства; такъ на рыхлой землѣ въ особливости должно поливать ежедневно, когда дождя не будетъ. Сіе наблюдающъ огородники или деревенскіе жители близъ большихъ городовъ очень рачительно, и учиняющъ чрезъ шо, что растѣнія ихъ на ошкрытомъ воздухѣ всегда нѣсколькими недѣлями ранѣе поспѣвають, и на продажу высланы будутъ, нежели въ другихъ мѣстахъ, гдѣ ежедневнаго поливанія не производящъ. Чрезъ самое же шо доводящъ, что одно мѣсто у нихъ въ годъ приноситъ три или четыре разныхъ овоща. На примѣръ, въ первой мѣсяцѣ сѣющъ на этомъ мѣстѣ молодой лакшукъ, морковь, горохъ, мѣсячной редисъ и проч. что чрезъ 6 недѣль сходишъ; потомъ опять сѣющъ лакшукъ для кочаннаго салату, или горохъ и бобы съ сгурцами ;

цами; послѣ бѣлую рѣпу, капусту и разныя душишныя и суповыя травы для осени и зимы. Болѣе же всего выгоняющъ они расцвѣтія посредствомъ поливанія въ таковыя весенніе и лѣтніе дни, когда парилъ, солнце скрыто за облаками, и къ дождю склонно. Въ таковую погоду роснѣ полишыхъ растѣній въ одинъ день больше споспѣшесивуется, нежели въ восемь другихъ. Незнающіе таковому прилѣжанію насмѣхающся, и считающъ излишнею работою; искусные же огородники осмѣяшся при своемъ обыкновеніи, составляющъ изъ того таинство, и поливають растѣнія свои въ таковыя пасмурныя теплыя дни, когда дождь хоща идешъ, но земли не промачиваетъ. А въ эпомѣ лишь и состоитъ вся шайна споль многихъ огородниковъ, имѣющихъ въ большихъ городахъ, или близъ оныхъ, овощники, и кои единственно отъ нихъ пропитаніе свое имѣющъ, шакъ что вдвое получающъ съ нихъ доходу, нежели тѣ, у которыхъ овощники въ двое или нѣсколько разъ больше.

При самомъ поливаніи должно наблюдать, чтобъ оное производило исподоволь, и такимъ образомъ, чтобъ земля отъ усильнаго вдругъ полишія не сплывалась, или бы долой съ водою не стекала. На эпомѣ конецъ поливальники должны имѣть рѣшетки съ маленькими скважинами, чтобы вода изъ нихъ тонкими мно-

ими лучами прыскала. Лучше нѣсколько разъ по одной грядѣ пройди съ поливальникомъ, дабы произведя поливаніе въ первой разъ шолько слегка, и какъ бы поверхностно, землю расположишь къ удобнѣйшему принятію воды отъ вѣпораго и шрешьяго поливанія, и чтобъ она дошла до корней. Когда же по особливымъ обстоятельствомъ земной пошвы земля ошвердѣетъ, потому что ошъ частаго поливанія и припеканія солнцемъ какъ бы спечется, что большею частію случается на тучной глинистой пошвѣ, такую землю прежде поливанія, крючкомъ или грабельками безъ поврежденія корневъ възрынь, и шѣмъ къ принятію воды предупровишь. Совершася чрезъ то двойное дѣло: первое для поливанія, а второе къ изшребленію находящихся посшороннихъ травъ. Поливая давно пересаженныя растѣнія, и кошорыя между собою сидяшъ просшорно, то лучше всего сшавъ съ поливальника мѣдную или жестианую шрубку, пускашъ воды изъ нее около однихъ корней, шакъ чтобъ листовъ не замочить; ибо всѣ растѣнія вообще не шерпятъ, чтобъ дешло на сшубли и лисшы ихъ много мокроты, а особливо по шпру.

Кому нѣтъ нужды растѣніямъ чрезъ ежедневное поливаніе сообщить сильнѣйшій ростъ, а потому когда не достаѣтъ времени и людей, и поливаюшя шолько по необходимости, что видимо можешъ быть

быть по вянущимъ лисамъ, кои на расшѣнїя опускаются. У кого зимующѣ нѣжныя расшѣнїя, кои вообще малой поливки тогда теплою водою пребуяшѣ, надобно тогда въ горшкѣ разкопанъ земли къ корню, и сжать оной двумя пальцами: есѣли оная слипаешся, имѣетъ еще въ себѣ довольно влаги; есѣли же рассыпается, поливанїе нужно. Но что пень и лисы зимою поливанїя не терпяшѣ, о томъ забывать не должно.

Пересадка имѣетъ намѣренїемъ своимъ то, чтобъ расшѣнїя довести къ настоящему совершенству, и чтобъ они другъ другу въ томъ не препятствовали; а это случается, когда они сидяшѣ часно. У кого на примѣръ салашъ кочанной и бѣлая капуста сидяшѣ нѣсно, кочней не получаютъ, или токмо малые; а поному большую часъ расшѣнїй разсаживаютъ.

Каждое расшѣнїе имѣетъ собственное свое время, въ которое оно съ пользою пересадишѣ можно. До такового времени боляшѣ они, долго не окрѣпчаяшѣ, или совсѣмъ пропадаютъ. Есѣли будишѣ они пересажены поздно, и надлежатъ въ число расшѣнїй, къ зимѣ пропадающихъ, будишѣ опасность, что они не выспѣюшѣ; почему улучающѣ лучшее время къ пересадкѣ, и когда на молодыхъ расшѣнїяхъ будишѣ шесть или восемь лисовъ.

У нѣкоторыхъ расшѣнїй, имѣющихъ длинныя лисы, оныя ложатся на зем-

лю, и при поливаніи зашопляются, естѣли не будущъ подсприжены. На прим. селерея, аршишоки, зимняя эндивія, и ш. под. Нѣкоторые же растѣнія имѣютъ слишкомъ длинные корни, кои въ пересадкѣ препяиспвуютъ, и пошому оныя укорочаютъ. Къ приготовленію ямокъ для пересадки, а особливо капустныхъ родовъ, употребляютъ такъ называемое *садило*, или совокъ деревянной, подобіемъ опверснаго съ конца ядичка дѣлаемый, и дѣлающъ онымъ прямую и просторную ямку, чѣмъ корни, сколько возможно, меньше загнуты были и концы не торчали, а растѣнія шли бы прямо вверхъ. Должно также наблюдать, чѣмъ коренья всѣ закрыты и ушопшаны были землею, дабы не засохли; однакожъ это въ швердой глинистой землѣ надобно производить осторожно, чѣмъ оныхъ не раздавить и шѣмъ не засушить.

Поелику растѣнія въ пересадкѣ не шокмо въ надлежащемъ разстояніи сидѣть должны, но придаетъ онымъ и хорошій видъ, когда они стоятъ рядами правильными, по шурку проведенными, да и поливаніе, выпалываніе сорныхъ травъ, обкапываніе и притребаніе къ шволамъ земли чрезъ шо облегчающа. Равнымъ образомъ и осмошрѣ каждаго высадка производить удобнѣе, нѣшъ ли гдѣ болящаго или вянущаго высадка, шо скорѣе глазамъ представившя, и можно будетъ неукоснишель-

шельно подашь помощь или перемѣнишь оной.

Въ началѣ при заведеніи овощника со-
вѣшовано, чѣшобѣ спараться имѣшь по
средиѣ онаго прудокѣ; ибо вода споячая
кѣ поливанію шекучей предпочищается.
Колодезная и ключевая вода для онаго
всѣхъ хуже. Есшлы же необходимость ве-
лишѣ оною поливашъ, должно наливѣ оную
въ просторные дщаны или корыта, въ ко-
ихъ лучше бы освѣщало оную солнце, дашь
поспояшь дни два, чѣшобѣ ся жеспкоснѣю
и холодноспѣю, а особливо когда земля и
погода шеплы, распѣнїямъ вреда не сдѣ-
лашь. Бросають же въ оную голубиной и
куриной навозѣ, разбалшывають и шѣмъ
поливають, чѣо очень полезно. Споящїя
на скошпыхъ дворахъ лужи навозной воды
служашѣ кѣ равному намѣренію, но дол-
жно жижу эшу прежде разводишь обыкно-
венною водою, ибо одна она можетѣ горя-
чеспѣю своею распѣнїя спалишь. У кого на
строенїяхъ подѣ кровлею есш жолубы, и
посредствомъ оныхъ можно набрать до-
ждевой воды кѣ поливанію, окажетѣ оная
еще лучшїя услуги, нежели прудовая вода.

Огородныя распѣнїя.

1) Салатѣ, Лактукѣ.

Сїе всюду любимое огородное распѣ-
нїе, которое въ верхней Саксонїи просшо
салашѣ, а въ нижней Саксонїи обыкновен-
но лакшукѣ называютѣ, въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ лакшукѣмъ называющѣмъ, пока оное еще молодо и не имѣетъ вилокѣвъ; а когда уже совсѣеся, именующѣмъ оное салатѣмъ или кочанной салатѣмъ.

Кипо для салату не можеть или не хочеть имѣть паровой гряды къ постѣву на оной раннихъ родовъ, чѣмѣмъ оныя пономѣмъ пересадишь на добрую, жирную и нѣсколько влажную землю; томѣмъ долженъ сѣмена еще въ Маршѣ, или какъ скоро сибѣмъ соидетъ, сѣять на шепломѣ, проливъ полденъ лежащемъ мѣстѣ. А чѣмѣмъ съ весны до глубокой осени имѣть у себя кочанной салатѣмъ, должно производить ежемѣсячно сѣяніе и пересадку, и къ чему въ особенности способны изъ прочихъ родовъ осенній зеленый и малый зеленый салатѣмъ, также монпрей называемой.

Поелику этомѣмъ салатѣмъ чрезъ образъ хожденія за нимъ подверженъ разнымъ перемѣнамъ, и производящѣмъ оныя много новыя отпродія; шо видимъ мы въ спискахъ у садовниковъ сполько различныхъ и почасу между собою перемѣниваемыхъ названий и родовъ онаго. Извѣстнѣйшіе же и болѣе у насъ уважаемые роды суть слѣдующіе:

- а) Большой, желтой, кудрявой монпрей.
- б) Ранній, желтой, яичной салатѣмъ, или малой монпрей.
- в) Бѣлой кочанной салатѣмъ.
- г) Бѣлой столбцомъ растущій поваренной салатѣмъ Версальской.

- д) Полосатой поваренной салатъ.
- е) Песстрой, или Форельной салатъ, съ бѣлыми сѣменами.
- ж) Тотъ же съ темными или черными сѣменами.
- з) Темной праль салатъ.
- и) Зеленой праль салатъ.
- ї) Желтой праль салатъ.
- к) Спрасбургской кочанной салатъ.
- л) Шведской кочанной салатъ.
- м) Принцовъ кочанной салатъ.
- н) Ранній, темной шугсвилковой кочанной салатъ.
- о) Обыкновенной простой лакшукъ, которой въ кочни не завивается, и молодые листья его обрываются въ салатъ.
- п) Зимній салатъ.

Всѣ сїи роды очень часто одинъ въ другой перераживаются. Кто охотникъ до многихъ изъ нихъ, либо по шому, чтобъ имѣть перемѣну на столѣ, или что одинъ родъ лучше другаго у него родился; тотъ, дабы не быть принуждену покупать сѣмена ежегодно, или въ сортахъ оныхъ обману, долженъ сдѣлать основаніе къ сѣменнымъ кустамъ онаго, и въ чемъ нѣкоторые знающіе садовники по той причинѣ составляютъ тайну, чтобъ у нихъ только однихъ за различіемъ сортовъ салатъ покупали, а именно: они каждого рода салата кусты для сбора сѣменъ разсаживаютъ сколько возможно между собою далѣе, такъ что въ одномъ углу огорода

сажаютъ шѣ, а въ другомъ иные. Когда же симъ разныхъ родовъ кустамъ позволишь между собою сидѣть близко и сѣмена принесть, то вырожденію въ обыкновенной простой родъ никакъ воспрепятствовать будетъ не можно.

Въ списокѣ салапныхъ родовъ, поставленному такъ, какъ состоятъ оныя у Рейххарша и Грошжана, и которыхъ названія слѣдовавшими по нимъ писателями къ избѣжанію великаго замѣшательства прилично удержаны, упомянуто о поваренномъ салапѣ. Называется оный такъ по тому, что листья его за жесткостью многіе сырые бѣтъ не могутъ, а варящъ съ говядиною и бараниною, какъ-то во Франціи и у насъ въ нѣкоторыхъ домахъ сбычайно, а особливо въ разсужденіи кочаннаго салапу; и для того роды салапу сего способнѣйшіе къ варенію проименовали поваренными.

Салапныя сѣмена должно сѣять нѣсколько рѣдко, и гряды подъ ранній салапъ готовить еще съ осени, чтобы въ началѣ Марта, ешлы снѣгъ сойдесть, къ сѣву приступить можно было: ибо хощя и будущъ морозы, сѣмена отъ нихъ никакого вреда не шерпятъ.

Пересадка производишя, когда растѣнія получаютъ четыре или шесть листковъ, и приномъ на четыре пальца въ ширину глубиною, и корни предъ пересадкою не мношко приспругаютъ. Охотно избираютъ къ

къ сему время послѣ дождя, или когда дождь собирается, за тѣмъ что въ эпомъ случаѣ не нужно будетъ поливать и закрывать отъ солнца, да и произведетъ, что салатъ гораздо позднѣе пойдетъ въ стволъ.

Высадки салатныя сажаютъ рядами по снурку, и когда пересаживаются, а особливо въ лѣшніе мѣсяцы, должно на нѣсколько дней прикрыть ихъ какими нибудь широкими листьями, или заспѣиить, поставивъ на грядъ ребромъ доску, чтобы молодыхъ высадковъ солнцемъ не спекло. Никакому растѣнію поливаніе столько не полезно, какъ сему салату. Нѣкопорыя роды онаго, какъ-то большой монпрей, Спразбургской, Принцовъ кочанной, праль, Шведской кочанной, перебуяшъ разстоянія между собою вершковъ на шесть; форельной же и малой монпрей только на четверть. На одной грядѣ сажаютъ ихъ ряда въ четыре и въ пять, что дѣлается только для красы и способности, а впрочемъ можно и безъ гряды на гладкомъ мѣстѣ сажать ихъ рядами по снурку.

Кто не хочетъ пересаживать, и оставитъ салатъ на тѣхъ же грядкахъ, на которыхъ посѣянъ сначала, то должно молодя растѣнія, когда листья ихъ будутъ въ денежку величиною, обрѣзать ножемъ по самой корень, дабы другимъ вырастающимъ и въ кочанъ свисться имѣющимъ оставить просторъ. Если таковое прорѣзываніе

ваніе упустишь, кочней не будетъ, и чѣмъ чаще распѣнія сидящъ, шѣмъ скорѣе пойдущъ въ вышину и въ сѣменные стволы.

Какъ скоро салатныя распѣнія начнутъ въ кочень свиваться, должно ихъ обгрести землею, отъ чего вилки будутъ больше, и не такъ легко пойдущъ въ сѣменные стволы. Если на сіе обыпаніе не взирая, пускающъ они стволы рано, должно опсрою лопаточкою нижній конецъ корня подрѣзать, что у садовниковъ называется опросить салатъ. Имѣющъ же нѣкоторые садовники обыкновеніе обкладывать вилки или кочки салатныя кирпичами и черепицею къ удержанію выбѣганія въ стволы. На послѣдокъ, когда салатъ, особливо же въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы, отъ выбѣганія въ стволы удержанъ не можно, лучше выдернуть оной съ корнемъ, и въ погребъ воткнувъ въ сырой песокъ, чтобы оной еще нѣсколько недѣль оставался годенъ къ употребленію.

Бѣлой длинной салатъ дѣлаютъ чрезъ то прочнымъ, что сверху поперегъ перевязываютъ его листомъ во время сухой погоды, чтобы мокрота сверху не зашла и оспавалась на листѣ; ибо отъ того происходитъ гнилость. Съ кудряваго же салату листы можно мало по малу обрѣзывать и употреблять, послѣ чего опускаетъ онъ листы свѣжіе. Если

и оной пожелаетъ кто связать, должно производить это также въ сухое время.

Кто желаетъ и по наступленіи зимы нѣсколько времени салатъ имѣть, долженъ въ исходѣ Сентября вынуть лучшіе кочни съ землею, и посадивъ въ ящикъ, держать въ погребѣ или въ оранжереѣ, и въ хорошую погоду выставлятъ на воздухъ и солнцѣ.

Зимній салатъ не есть особливой родъ отъ предшедшихъ отродій, и отличается отъ оныхъ только прочностію. Сѣютъ его въ Августѣ. Гряды подъ него дѣлаются свѣжая и ушапшывается нога въ ногу, потомъ разсѣваются по оной сѣмена, загребаются граблями, и гряда содержится въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ. Послѣ 20 Сентября расчѣнія, получивъ надлежащую величину, разсаживаются вершка на 4 или на 5 между собою. Они оспаются безъ всякой закрышки, снѣгъ защищаютъ ихъ отъ морозовъ; но безъ снѣгу отъ сухихъ морозовъ они погибаютъ. Если же счастливо прозимуютъ, по наступленіи весны оказываются вилки или кочни ихъ поспѣвшими. Если осень хороша, и если это салатъ позднѣе посѣянъ, можно пересаживать его еще въ Октябрѣ.

Желающей изъ домашнихъ сѣменъ впродъ плотно свивающихся кочней, долженъ оспалять и на сѣмена таковыя кочни; ибо сѣмена всегда шже приносятъ,
какова

какова была мать ихъ. У кого огородъ не великъ, чѣмъ разныхъ родовъ сѣменныхъ высадки посадишь въ отдаленіи между собою, и онъ помянушаго выраживанія нѣмъ удержишь, не худо тому оставишь только одинъ доброй родъ, на примѣръ хороший моншрей, а прочіе не допускаешь принести сѣмена.

Должно быть очень сухменному году, чѣмъ салащныя сѣмена выспѣли на низменномъ или глубоко лежащемъ мѣстѣ. Почему должно, чѣмъ сѣменные куски сидѣли не на низкомъ, ни на очень высокомъ мѣстѣ, гдѣ бы свободно пользовались они воздухомъ и солнцемъ. Тутъ принесушь они сѣмена множественно и лучшія, какая ни была бы погода.

Кто при собираніи сѣменъ будетъ того ожидать, пока всѣ оныя на куски выспѣютъ, потеряетъ онъ между нѣмъ самыя лучшія; ибо оныя опчасни будутъ въшромъ развѣяны, часью же и малыми птичками поклеваны. Для сего сѣменные сиволы вполнѣ по самую землю срѣзываютъ и славяишь въ сухомъ прохладномъ мѣстѣ, какъ скоро въ шрешей или четверной часи цвѣтовъ окажутся ихъ шерстистыя сѣмечка. Но лучше будетъ то, когда изъ срѣзанныхъ сиволовъ первыя и лучшія сѣмяна выпрестъ, потомъ уже сиволы опнеси къ сушенію въ показанное мѣсто. Какъ скоро оныя высохнутъ, должно не мѣшкавъ, потому что

мыши

мыши до сихъ сѣменъ великія лакомицы, оныя совсѣмъ выколошишь и спалываніемъ на ночвахъ очистишь. Выпресенныя же салашныя сѣмена не должно потчасъ сгребать въ кучу, но на плашкѣ разровнявъ до тѣхъ поръ оставишь, какъ оныя къ сохраненію въ льняныхъ мѣшечкахъ довольно высохнушъ. Хранишь ихъ должно не во влажномъ, но въ умѣренно сухомъ мѣстѣ. Не хошящіе за сѣмянными сѣволами имѣть два раза работу, выдергивающъ сѣвола изъ земли съ корнемъ оспорожно, привѣшиваютъ оныя въ безопасномъ, солнцемъ освѣщаемомъ мѣстѣ, на открытомъ воздухѣ, гдѣ они дней въ 10 или 12 доспѣвають; снимающъ ихъ потомъ, и каждаго роду особливо, относящъ въ сухое, прохладное мѣсто, выширающъ и очищаютъ. Однако первое поступаніе заслуживаетъ преимущество, потому что получающся по оному первыя отборныя сѣмена, кои одни только въ посѣвѣ употреблять должно: ибо выходящъ изъ нихъ самыя крупныя кочки; прочія же могутъ сѣяны быть для молодыхъ листовъ, кои издерживаются, пока еще вилокъ на нихъ не завьется. — Сѣмена сего салашу могутъ лежать чешыре года прочны.

2) Рапунцель, полевой или ягнякій лактукъ.

Растѣніе это, потому что не вызывается, и не требуетъ особливаго за собою присмотра, зимою и весною въ салашъ упо-

употребляется либо одно, или съ селлереею, эндивіею, лакшукомъ и прочимъ смѣшавъ. Соснавлиеиъ оиъ домашнее хѣкарспво, и варимые съ нимъ супы очень полезны къ поправленію и разпущенію соковъ въ человѣческомъ тѣлѣ. Распущіе это хотя находипся дикораспущіе (*) на хлѣбныхъ поляхъ, также по облогамъ, но сѣюиъ оное и въ огородахъ, пошому что въ посѣвѣ выходипъ оное крупіе и вкуснѣе дикораспущаго.

Сѣюиъ сѣмена его на хорошо вскопанной землѣ, около 24 числа Августа, или нѣсколькими недѣлями ранѣе, молодые всходы тщательио опалываюиъ, чшобъ оныя осенью получили надлежащій свой росиъ. Бываетъ оной тѣмъ лучше, и листы рапунцеля длиннѣе, шире, мясиснѣе, мягче и многочисленнѣе, чѣмъ шучиѣе избирется земля. Нѣкопорые охотники до

(*) У Бошаниковъ называется оное *Rapuncius*, что можно перевести по Руски *рѣпка*. Считаюиъ онаго семь родовъ: 1) посѣвный, 2) малый дикораспущій, 3) дикой съ пурпуровобѣлыми цвѣтами, 4) съ бѣлыми цвѣтами, 5) лѣсной рапунцель съ широколиственными листками, 6) лѣсной же съ узкими рѣдкозубыми листами, 7) называется у Бошаниковъ лѣсной къ малому рапунцелю однородный. Авторъ говоритъ здѣсь о рапунцелѣ втораго рода, который съ первымъ одинъ и тотъ же: цвѣтки на немъ колокольчикомъ, разрѣзаннымъ звѣздочно напятеро; бываюиъ оныя синіе, пурпуровобѣлые и совѣтмъ бѣлые, и сидяиъ отдѣленно на концахъ стебля, вверху на черешки раздѣляющагося.

до сего прочнаго и безъ старанія удачно распускающаго салату предъ всѣми прочими поступающъ еще короче, а именно: около показаннаго времени разсѣвающъ сѣмена (коихъ можно во всякомъ мѣсцѣ набрать множеству) между бѣлою и зеленою капустною, или иными растѣніями, которыхъ съ грядъ не выкапывающъ, и способствовашъ всходу ихъ оснаваяющъ будущимъ дождямъ, а иногда и появляющъ эпокъ салатъ множественно. Кто хочетъ эпокъ салатъ довести къ тому, чтобы листы на немъ вышли не просиные, какъ-вы бывающъ въ полѣ, долженъ сѣмена его разсѣвать, кой часъ оныя поспѣющъ: тогда растѣнія появившя осенью, какъ розы, съ очень многими листьями. Рыхлая, влажная земля для него всѣхъ лучше.

Сѣмена его очень легко высыпашся, почему и всего лучше, давъ имъ выпашся, стресъ землю, на которой они лежатъ, или выдернувъ кусты еще съ недоспѣлыми сѣменами, повѣсить высушить. Весною выбираютъ здоровые кусточки, сажаютъ оныя по сурку въ огородъ, поливаютъ, чтобы принялись, если погода случится сухая, и собираютъ сѣмена: оныя могутъ прочно лежать три года.

3) Садовой крессъ.

Крессъ эпокъ, употребляемый въ здоровый весенній салатъ, растетъ на всякой землѣ, хотя на доброй землѣ лучше;

ше; сѣянь его должно очень густо, а посѣявъ гладкою дощечкою съ ручкою уколопипъ въ землю гладко, чпобъ вырастающія потомъ справинки до нѣсколька разъ оспрымъ ножемъ срѣзывать можно было. На открытомъ воздухѣ сѣюшъ его въ Апрѣлѣ, и съ того времени повпоряютъ сѣвъ сполько разъ, сколько угодно имѣшь свѣжій крессъ въ году. Кому угодно имѣшь крессъ зимою, посѣянь оной въ ящикахъ, держащъ въ шепломъ мѣстѣ, и довольно поливань, пока взойдетъ, что обыкновенно произходитъ въ три дни. Потомъ перенесъ ящикъ въ умѣренно теплѣе мѣсто, а естли воздухъ теплѣ и пригрѣваетъ солнце, высавлянь на дворъ, но надъ вечеръ вносишь въ прежнее мѣсто. Сѣмена легко собирать, оныя не легко высыпаются, и бываюшъ прочны при года. Предъ сѣвомъ мочить ихъ не должно, ибо въ водѣ распускаются они, какъ лягушичій клѣокъ, и къ сѣву сдѣлаются негодны.

4) *Зимній крессъ, Сибирскій крессъ.*

Зимній крессъ не иное что, какъ обыкновенная придорожная горчица съ разширенными спручьями и перистыми лиспами, росшетъ самъ собою на влажныхъ мѣстахъ и около рвовъ множественно; сѣюшъ же его отчасти въ огородахъ, потому что молодые листы его весною въ салатъ употребляютъ, ибо они и зимою подъ снѣгомъ пребываютъ зелены. Сѣмена лежатъ прочно шолько годъ, сѣюшъ ихъ

ихъ на всякой землѣ, и только слегка граблями загребая, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ.

5) *Индѣйскій крессъ. (*)*

Распѣніе это собственнѣю надлежитъ до цвѣтниковъ, но многіе сѣютъ оное и для поварни; пошому что какъ листы, такъ и цвѣты его здоровой саламъ составляютъ. Есть онаго шри рода, крупной, малой и махровой, такъ и цвѣты на немъ двоякой краски, золото - желтой и сѣрогорючей. Сѣмена сѣютъ въ Апрѣлѣ на открытыхъ грядкахъ и въ ящикахъ; пошребны къ тому добрая тучная земля и частое поливаніе. Крупной Индѣйской крессъ обыкновенно сѣютъ около сѣнокъ и подъ окнами, чшобъ взбирался оной порѣшешкамъ вверхъ. Сами собою выпадающія и на землѣ подбираемая сѣмена лучшія. Еслии весною вышедшія молодыя распѣнія пересадишь, задерживаетъ это весьма росъ ихъ; почему лучше сѣять сѣмена ихъ тамъ, гдѣ уже имъ сидѣть должно.

Цвѣты ихъ, кои выходятъ ежемѣсячно вновь до самыхъ морозовъ, пока еще не распустиятся, приготавливаютъ въ уксусъ по подобію капорсовъ, и употребляютъ вмѣстѣ оныхъ въ саламъ. Чшобъ уксусъ не испортился, кладутъ въ него нѣскольکو спручковъ дикаго перцу. И свѣжіе цвѣты, какъ сказано, кладутъ въ саламы, чшо придаетъ онымъ красивой видъ и

Г 2

вкусъ,

(*) Капуцины.

вкусъ, имѣющій припомъ укрѣпляющее
желудокъ дѣйствіе.

б) *Ключевой крессъ, водной крессъ.*

Эта салатная трава изъ первыхъ въ
году имѣетъ многихъ на себя охошникъ
въ разсужденіи собсѣннаго вкуса,
кошорымъ она ошъ прочихъ родовъ крес-
са примѣнно опличается, и въ разсуж-
деніи лѣкарсвеннаго сильно соки шѣла
человѣческаго распускающаго дѣйствія, у
оныхъ выигрываетъ. Не въ одномъ толь-
ко Эрфуршѣ производяшъ оною великой
торгъ, но и всюду возятъ ее въ боль-
шіе города изъ опдаленныхъ мѣстъ, и
продающъ довольно дорого въ такое вре-
мя, когда еще въ другихъ свѣжихъ пра-
вахъ недоспашокъ. Въ разсужденіи дѣй-
ствія своего служитъ эшопъ крессъ ошъ
цынготной болѣзни, поправляетъ вообще
соки, разбиваетъ соки огусшѣвшіе, гонитъ
урину и выводитъ песокъ. Когда нюхаютъ
свѣжіе растертые листья, въ носъ выпяги-
вая, ободряетъ эшо сонливыхъ и пред-
охраняетъ ошъ паралича; похваляютъ пра-
ву сію и ошъ глистовъ. Въ леченіи скопа
также оная служишъ, а особливо для
коровъ, одержимыхъ цынготнымъ гнѣеніемъ
легкаго, и дается онымъ распаренная съ оп-
варомъ. Г. Рейххардъ училъ заведенію эшой
правы въ шекучихъ колодезяхъ; но какъ
я послѣ того ошкрылъ, что пчелы нико-
гда не бывающъ подвержены шѣмъ болѣз-
нямъ, кои въ другихъ мѣстахъ въ нихъ
ока-

оказывающся единственнo отъ шого, гдѣ могутъ лешать на цвѣшы сего кресса, кои по веснамъ не очень холоднымъ появляющся въ началѣ Мая, и даже въ Апрѣлѣ; испыталъ я сѣянъ его въ саду безъ ключей или воды, на сухомъ мѣстѣ. Я вынулъ нѣсколько растѣній, посадилъ оныя на низменномъ мѣстѣ, больше тѣнистомъ, нежели освѣщаемомъ солнцемъ, гдѣ они посредствомъ выпадающихъ сѣменъ въ короткое время шакъ размножились, что послѣ опалыванія оныхъ въ два первые года одержались, и не шребовали уже никакого болѣе присмотру (*).

7) *Ложечная трава, ложечной крессъ.*

Сія салатная шрава, идущая и въ лѣкарства, можетъ сѣяна быть въ Апрѣлѣ и Августѣ, потомъ пересажена рядами, на шри вершка между собою разстоянѣмъ. Земля подъ нее годится посредшвенная, а сѣмена могутъ быть два года всхожи. Дѣйствіе оной одинакое съ ключевымъ крессомъ, и росшешъ оная даже на Спидбергенѣ, гдѣ мапросы называющъ оную Гренландскимъ салатомъ, и употребляющъ оную противъ цынгошной болѣзни.

Г 3 8)

(*) Ключевой крессъ можно всюду отыскашь, гдѣ токмо находящся родники, конхъ печеніе простираетъ нѣсколько по плоскомѣстью. Листы его сходны къ рѣдичнымъ, а цвѣшки голубоватые. Легко можно оную узнать по жусу, совершенно къ редису сходствующему.

8) Огуречникъ, или борражъ.

Сія въ овощникахъ и цвѣшникахъ столько обыкновенная права сѣшся на всякой землѣ въ Маршѣ и Апрѣлѣ, и гдѣ оная однажды заведется, размножается отъ сѣмянъ сама, такъ что изъребить ее трудно. Цвѣшеть съ Мая по Септябрь и далѣе, ибо отъ раннихъ выпавшихъ сѣмянъ внонь кусты выходятъ, а цвѣты ея столько пчелами любимы, что въ глубокую осень, въ ясные полдни, видимы бывають на нихъ пчелы множествомъ. Нѣкоторые варятъ молодые лисы огуречника въ похлебкахъ; но больше употребляютъ въ салатъ, а синіе цвѣты этой травы къ украшенію блюдъ салатныхъ.

9) Пимпичель, или бибсрнелль.

Растѣніе это содержитъ для приправы салатомъ, и сѣють въ Апрѣлѣ на сухой землѣ, а потомъ на такую же землю высаживаютъ, кустъ отъ куста на 6 вершковъ разстояніемъ. Корень его зиму нашу выдерживаетъ. Нужно только обложить малою долею голубинаго или куринаго навозу сверху, то опять онъ пуститъ побѣги; ибо и опрѣчь того пересадки оно не очень любитъ, почему лучше оставлять его тамъ, гдѣ сначала посѣяно, и выдерживать кусты, гдѣ оны сидятъ часто.

10) Портулакъ.

Различаютъ портулакъ на дико растущій, или куриная нога называемый, и садо-

довый, хотя нѣтъ между оными существеннаго различія (*), кромѣ только величины и крупности листовъ. Въ разсужденіи же цвѣту естъ бѣлой и желтой, и послѣдній изъ нихъ предпочитается. Сѣмена сѣютъ весною на унавоженной грядкѣ, молодыя растѣнія разсаживаются на четверть аршина между собою, и щадательно поливаются. Онѣ разсѣвается самъ собою, и не рѣдко больше, нежели бы желалось. Какъ скоро сѣменные головки поспѣютъ, срѣзаютъ оныя, чѣмъ сѣмена въпрямъ не выбило. Избираютъ подъ него хорошо унавоженную землю, а иногда разсаживаютъ между капустою и лукомъ. Свѣжіе листья употребляютъ вмѣсто салату, также кладутъ въ супы, а съ говядиною, курицею и голубяшиною въ соусы. Они имѣютъ прохладительное и очищающее свойство, равномерно и выжатый изъ нихъ сокъ употребляется въ особенности отъ крово-

Г 4

хар-

(*) Естъ въ цвѣтахъ одного отродія ея, называемаго заичья капуста, пошому что оныя на этомъ отродіи выходятъ колоскомъ и бываютъ пурпурово-красноваты, а послѣней портулакъ и дикорастущей имѣетъ оныя розаномъ, малые, желтые; впрочемъ сходны. Изъ заичей капусты гонятъ сполько славную отъ ранъ и многихъ болѣзней, отъ убою произходящихъ, такъ называемую живую воду. Нѣтъ сомнѣнія, чтобы садовой портулакъ не произвелъ этой воды еще лучшей. Нѣкоторые Ботаники заичью капусту полагаютъ въ родъ шравъ, *Telerrhium* у нихъ названныхъ.

харканія, скорбуша, всякихъ горячекъ и огневой, въ нѣкоторыхъ припадкахъ уринныхъ каналовъ, также онъ глистовъ.

11) Цикорія или солнцеза сестра.

Корни и листья цикоріи издавна уже составляли поваренное растѣніе, но первые недавно учинились моднымъ напитокомъ либо одни собою, или въ смѣси съ воспочнымъ кофе; почему и водяниъ оную множественно въ огородахъ.

Дико распуцающая цикорія вкусомъ очень горька, и меньше сочна, нежели огородная; почему и меньше силы въ себѣ содержишь. Огородная цикорія употребляется въ салатъ, и варяниъ оную въ похлебкахъ съ мясомъ. Сія легко варимая пища онъ врачей предписывается всѣмъ инокондрикамъ, чахотнымъ и шаковымъ особамъ, коихъ послѣ выдержанныхъ жестокихъ болѣзней подкрѣпитиъ должно. Листия цикорные лѣтомъ нѣкоторые обвариваюиъ, а попомъ употребляютъ въ салатъ очень вкусной.

Къ разводу цикорныхъ корней пошребна свѣжая, хорошо унавоженная, мягкая и глубоко вскопанная земля, чшобъ они глубже проспираиъся могли. Сѣмена сѣяиъ должно въ Апрѣлѣ не рано, чшобъ подъ осень растѣиія не могли выбѣжатиъ высоки, и тѣмъ у корней опниатиъ много силы. Въ спволы пускаиъ ихъ должно уже на другой годъ.

Онъ пересадки расшѣиія получаюиъ лишь короткіе корявые корни; почему сѣмена

мена сѣютъ рѣдко, а есѣли распѣтѣя
взойдутъ густо, ирорываютъ, чѣобъ
кусѣ отъ куста сидѣлъ не ближе прехъ
вершковъ, при чемъ само по себѣ раз-
умѣется, чѣобъ во все лѣто щѣательно
выпалывать изъ нихъ сорныя травы. Кор-
ни выкапываютъ осенью, а оснавляютъ
оныхъ сѣмько, сколько нужно къ прине-
сенію сѣмянъ на другой годъ, кои лежатъ про-
чны къ посѣву года чѣшyre и шесть лѣтъ.

Кѣно желаетъ свѣжѣе корни сохранишь
на долго для кушанья, долженъ ихъ зимою
хранишь въ погребѣ, засыпавъ пескомъ.
Когда репокъ или головуцу выставишь
изъ песку, пустишь оная зимою лисы,
кои въ салашѣ совершенно уподобляются
зимней эндивіи; но должно выжидать, по-
ка въ погребѣ выросшіе лисы совсѣмъ
пожелтѣютъ: ибо, пока оныя еще зелены
хотъ мало гдѣ, содержатъ въ себѣ горечь.
Впрочемъ довольно читавшимъ Хозяевамъ
не безъизвѣстно писанное въ Рейххардо-
вомъ *Land-und-Garten-Schatz*, чѣобъ ди-
корныхъ корней накласть въ кадку, насыпан-
ную пескомъ, прошиву проверченныхъ въ
ней всюду скважинъ, чрезъ что во всю зи-
му можно имѣть довольно листовъ для
салашу.

Должно вѣдать въ разсужденіи соби-
ранія сѣмянъ, что какъ скоро оныя по-
спѣютъ, должно срѣзать ихъ съ травою,
пока еще пшички оныхъ не повыклевали,
сушишь въ засѣни, и послѣ выколошить.

Поспѣвають оныя обыкновенно на другой годъ съ посѣву въ началѣ Сентября.

Цикорныя корни, какъ выше упомянуто, нынѣ вошли въ чesнь по употребленію оныхъ въ модной напитокѣ, копорой въ разсужденіи пріятной горечи своей къ насипоющему кофе гораздо ближе, нежели другія наши домашнія растѣнія, подходитъ. Осенью или весною выкопанные корни, либо совсѣмъ высушивъ разрѣзываются, или сырые мелко изкрошиваются, а потомъ сушатся. Поджариваніе оныхъ на сковородѣ или въ кофейномъ барабанѣ должно производимо быть съ осторожностію; ибо они легко сгораются и шѣмъ силы своей лишаются. Молотіе или толченіе оныхъ должно производимо быть послѣ поджаренія, а впрочемъ поджаренные легко влажностъ въ себя притягиваютъ, букнутъ и къ молотію учиняются неспособны. Цикорный кофе называютъ не токмо Нѣмецкимъ, но и здоровымъ кофе, и послѣднее имя не безъ основанія, потому что въ ономъ разгорячающее и волненіе въ крови приключающее масло гораздо въ меньшемъ степени, нежели въ насипоющемъ восточномъ кофе оказывается, и нервы никоимъ образомъ отъ онаго не страдаютъ.

Вареніе сего здороваго кофе, и которое производится по обыкновенному образу, продолжается нѣсколько долѣе; также и сваривши дасть отстояться, чтобъ
гуща

гуща по надлежащему отлегла. Изъ фунта свѣжихъ цикорныхъ корней выходитъ четверть фунта сжеиаго кофе.

Цикорной кофе одинъ безъ подмѣси пьютъ во многихъ домахъ не токмо средственнаго соспоянїя, но и простые люди, кои иностраннаго кофе покупають не въ силахъ. Въ смѣси обоихъ родовъ кофе наблюдаютъ не одинакую мѣру, ибо послѣдняго кладутъ иногда половину, иногда третью и четвертую долю. Настоящїй къ сему размѣръ соспоянїе каждаго, или исправная домоводственная нога каждаго дома; попому что у насъ, въ Нѣмецкой землѣ, въ шуипкахъ иностранный кофе называютъ банкротская вода; ибо многія семейства пропились на ономъ. Осталось еще патріотическое желанїе сїе, чтобъ выдумать вмѣсто иностраннаго сахару и сыропу какое нибудь домашнее произведенїе къ подслащиванїю кофе: весьма вѣроятно, что хотя поднесъ еще мы наши сладкіе соки изъ нѣкошорыхъ домашнихъ расцѣнїй не можемъ или не хотимъ варить въ головы, какъ иностранной сахаръ, но что есть изъ оныхъ нѣкошорые, съ коими кофе вмѣстѣ варить можно, такъ что добрый вкусъ кофе отъ того не потерпитъ подрыву. Однакожъ, такъ сказать, не наложена еще рука на послѣднїе опыты всякаго роду.

Должно еще упомянуть о немаловажной выгодѣ цикорїи въ мѣшанїи съ иностран-

страннымъ кофе. Послѣдній раздѣляемъ мы, не взирая на его опечесство, на три главныхъ разбора: лучший, средній и самой худой кофе. Самой худой кофе имѣетъ большею частью вкусъ столько грубой, неспѣлой и суровой, что привыкшіе къ лучшему кофе, пить онаго не спанутъ. Въ смѣси съ иностраннымъ сего рода кофеемъ цикорной кофе оказывается поправляющимъ средствомъ, чрезъ что дурный вкусъ перваго либо уменьшитъ, или совсемъ заглушитъ можно. Въ этомъ случаѣ должно испытать, сколько или какую мѣру брать цикоріи противъ иностраннаго кофе, чтобъ оной поправился. У кого иностранной кофе средняго рода, то вкусъ его отъ прибавки цикорнаго кофе столько возвысится, что незнающіе объ этой подмѣси сочтутъ оной за кофе лучшаго разбору. Отъ сего происходитъ, что многія особы средняго состоянія, кои покупкою иностраннаго кофе не хотятъ привести себя въ разспройку, и къ подмѣси цикоріи въ кофе средняго разбору привыкли, послѣдній одинъ находятъ меньше вкуснымъ, и могутъ узнать, въ копоромъ вареніи цикоріи не подмѣшано. А какъ въ нѣкоторыхъ домахъ смѣшанной кофе варятъ такимъ образомъ, что либо порошокъ обоихъ кофе сыпаютъ вмѣстѣ и варятъ, или цикорной кофе сперва одинъ отвариваютъ, сливаютъ, и на отварѣ семъ варятъ настоящій кофе; то и

мо-

могутъ опредѣлить, который способъ пріутошвленія вкусомъ бывастъ лучше.

12) Эндивіа.

Листы сего растѣнія легко подвергаются перемѣнѣ, и въ разсужденіи ширины и различныхъ вырѣзовъ оныхъ перемѣняются. На нѣкоторыхъ пучныхъ земляхъ выходятъ оныя кудрявы, а на худыхъ мало кудрявы или совсѣмъ гладкіе.

Эндивію раздѣляютъ на лѣтнюю и зимнюю. О лѣтней эндивіи садовники мало заботятся, потому что лѣтомъ и безъ нее другихъ салатовъ много. Оба рода производятъ онѣ однихъ сѣменъ: получаютъ лѣтнюю эндивію, сѣявъ сѣмена весною въ началѣ Апрѣля, разсаживаемыя изъ того на чепыре и на шесть вершковъ пространствомъ высадки въ скоромъ времени идущъ въ спволы, и въ томъ же году сѣмена приносятъ; но шраву эту въ салатъ употребляютъ токмо по нуждѣ.

Чтобъ имѣть зимнюю эндивію, но которую еще и въ концѣ лѣта на столъ подавать можно, высѣваютъ тѣже сѣмена въ половинѣ Іюня на унавоженной и хорошо вскопанной грядѣ, которую въ сухмень поливаютъ. Растѣнія, когда пойдутъ они въ ростъ, прорываютъ, чтобъ не тѣсно между собою сидѣли. Можно же ихъ и пересаживать, что производится тогда, какъ получаютъ они шестой листъ, и обрѣзавъ нѣсколько листьевъ и корни, разсаживаютъ ихъ на шесть вершковъ между собою.

Са-

Садовники раздѣляютъ эндивію на желшую, шемную и бѣлую, и послѣднюю бѣлую называють вилковая эндивія; потому что она сама свивается, а другія должно связывать. Это связываніе листовъ вверху должно производить за недѣлю до употребленія, когда кустъ по землѣ расстелется. Черезъ это сообщается внутреннимъ листамъ желшоваго цвѣта, и садовники называють дѣйствіе это *подбѣливать*, но правильнѣе надлежало бы говорить поджелшишь. Далѣе, это связываніе наружныхъ листовъ концами должно производимо быть въ сухое время, и не очень туго, чтобы внутри не загнило. Мочала изъ сѣпрыхъ роговъ всего къ тому лучше. Иные имѣють обыкновеніе по связаніи куста сверху засыпать оной землею, или накидывать на нихъ сухіе цвѣточные горшки, а сверху оныхъ накладывать шеплага конского навозу, чѣмъ подбѣливаніе еще болѣе ускоряется.

Въ глубокую осень и зиму употребляютъ эндивію одну, или съ другими салатами, также съ селлереею, въ кружки изрѣзанною, либо сырую или вареную, и въ это время она больше въ уваженіи. Почему до наступленія еще морозовъ, осенью, въ сухое время выкапываютъ оную, и въ погребахъ теплыхъ или выходахъ сажаютъ опять въ песокъ или въ землю. Но всего лучше выкопаннымъ кустамъ дать нѣсколько завянуть, и по нѣкошоромъ времени

мени въ песокъ посадить. Можетъ оная даже всю зиму на землѣ лежать, а нѣсколько изъ оной по желанію въ песокъ сажать, или весною опять высадить на гряды; ибо оная все будетъ свѣжа и къ продолженію росту способна. Другимъ способомъ прибирающъ эндивію на зиму шакковымъ образомъ: выкопать въ огородѣ довольно просторную и глубокую яму, растѣнія въ оную покласать, и накрыть досками или соломенною полстью такъ, чѣмъ доски до травы не касались, и послѣ опять засыпать землею.

Къ полученію сѣмянъ кустовъ не должно осавлять на грядѣ зимовать: ибо зимою корень травы этой въ землѣ погибаетъ. Къ сему намѣренію державъ ихъ въ погребѣхъ, или иномъ сухомъ мѣстѣ чрезъ всю зиму, а весною высаживающъ, они опрыскивающъ и приносятъ сѣмена. Если не дать онымъ совершенно выспѣть, они будутъ не всхожи. Прочность ихъ продолжается лѣтъ пять и шестъ.

Прежде упомянуто о посадкѣ цикоріи и эндивіи въ песокъ въ погребѣ. Нужно песокъ въ этомъ случаѣ для эндивіи употреблять, а не огородной черноземъ. Къ сохраненію же и всякихъ огородныхъ растѣній должно брать одинъ только песокъ, высушивъ гораздо растѣнія предъ засыпаніемъ; ибо, когда положены будутъ они въ погребъ не сухи, скоро загниютъ, что въ особливости должно наблюдать съ энди-

Эндивією и арпишоками. Эндивія же проч-
нѣе въ погребѣ лежитъ, когда она по
вышеписанному будетъ завялена нѣсколь-
ко; какъ бы она ни завяла, опянь ошжи-
вешъ; почему въ погребѣ на сухомъ мѣ-
стѣ очень долго и безъ песку лежать мо-
жетъ.

13) Кервель.

Въ Бошаникѣ или православіи описы-
ваются многіе роды кервеля; почему шѣ,
кои сѣются къ обыкновенному поваренно-
му употребленію, въ особливомъ смыслѣ
называются *огородные* или *садовые кер-
вели*.

Сѣютъ кервель на сухомъ, влажномъ
и шѣнистомъ мѣстѣ два раза въ году:
въ Февралѣ, гдѣ снѣгъ сходитъ, или очень
рано весною, и съ 25 Іюля; срѣзываютъ
оной многократно, и листы всегда опро-
стаютъ вновь. Еслии посѣянной весною
кервель не обрѣзывать, выпускаетъ онъ
сѣменные стебли; посѣяннымъ же въ Іюлѣ
пользуются для сполы зимою и въ слѣ-
дующую весну. Другіе же охотники до
кервеля во всякое время распоряжатъ
сѣвъ во всѣ весенніе и лѣтніе мѣсяцы,
что еще и лучше, когда по совѣту Г. Мил-
лера давать сѣменамъ выпасть и самимъ
обсѣваться. Лѣтомъ сѣмена, кои слегка
граблями заскребаютъ, и кои лучше сѣять
рядами, всходятъ чрезъ 8 дней; напро-
шивъ весною лежатъ нѣсколько недѣль въ
землѣ, почему и должно сѣять ихъ, какъ
только

только скоро снѣгъ сойдетъ. Самой поздней сѣвъ въ году въ Сентябрѣ. Сѣмена годны бывающъ чрезъ четьре года.

Зимою мѣшающъ кервельные листы въ справные салапы, во всякое же время года въ справные супы, также съ шпинатомъ весною и лѣтомъ, равнобрно съ разными молодыми огородными правами въ соусахъ мясныхъ.

Поелику куры охотно ѣдятъ зеленяя sprawy, должно имъ бросать очистки кервелевыя, что предохраняетъ отъ обыкновенной ихъ болѣзни, насморку или сипу.

Всѣмъ извѣстно, что кервель, похваляемый за свой пріятный пряный вкусъ, содержищъ въ себѣ и врачевныя силы, но кошорыя отъ многого увариванія совсѣмъ пропадаютъ. Чтобы онъ силы эшой не утратилъ, должно класъ его въ супы не прежде, какъ снимутъ оныя съ огня. Для сего кервель должно рубить очень мѣлко, и шѣмъ замѣнить мягкость, отъ увариванія происходящую. Таковымъ же образомъ должно класъ его и въ другія блюда, а шѣмъ сообщать имъ лучшую приправу. Тѣ пользующся кервелемъ въ лучшей его силѣ, кои ѣдятъ оной мѣлко изрубленной, посыпавъ на хлѣбъ, намазанной коровымъ масломъ, въ завтракѣ.

Но чтобъ вѣдали, чего въ отношеніи къ здоровью и болѣзнямъ отъ кервеля ожидать, прилагаю я собственныя слова славнаго Доктора Бемерса: чрезъ вареніе пра-

Часть IV. Отдѣл. 2. Д шиш-

шился очень много силы поспоянныхъ или
непремѣнныхъ частицъ кервеля; почему
лучше употреблять выжатой изъ него
сокъ, или мѣлко изрубленные листы, мѣ-
шая свѣжѣе въ супъ, не варивъ въ ономъ.
Сушеная шрава не производитъ дѣйствія;
но свѣжей травы польза многочисленна.
Преимущественно надлежитъ онъ къ шѣмъ
средствамъ, которыми весною можно
вылечивать продолжительныя болѣзни.
Онъ отверзаетъ засорившіеся сосуды шѣ-
ла, разводитъ сгустившіеся соки, и пре-
имущественно гонитъ урину; почему по-
лезенъ въ разныхъ болѣзняхъ. Главнѣйше
могутъ употреблять его особы, чрезъ мно-
гое сидѣніе и недостатокъ движенія къ
запорамъ внутреннимъ случай подающія,
какъ-то спраждающія селезенкою, чахот-
кою, и перпяція опягощеніе отъ почечуя.
Сокъ кервелевъ, съ раковымъ супомъ смѣ-
шанный, предписываетъ Г. фонъ Галлеръ
отъ запора внутреннихъ. Въ водяной бо-
лѣзни дѣйствіе кервеля кажется быть
слабо, а въ дѣйствительной чахоткѣ,
какъ и всѣ другія средства, безсильно:
ибо Жофруа замѣтилъ, что продолжи-
тельное употребленіе возбуждаетъ жажду,
и къ кровохарканію подаетъ случай. По-
хваляющъ дѣйствіе его въ разбиваніи за-
пекшейся крови, производящей отъ уда-
ровъ и убой. Нѣкоторыя жарятъ листы
кервелевы въ коровьемъ маслѣ, и на вѣ-
шкѣ намазавъ прикладываютъ дѣшамъ
къ

къ брюху, дабы уменьшитъ колику и напряженіе живоша. Таковая прикладка, приложенная къ шайному мѣсу, поправляетъ закладываніе урины. Затвердѣлость грудей излечалъ лисшами его Г. Пленкъ, и Г. Мюрре разбивалъ сгустившееся молоко кервелемъ и свѣжими ольховыми лисшами. — Довольно одобренія къ множайшему посѣву этой травы для домашняго лѣкарства!

14) Драгуиъ, или Цесаревъ салатъ.

Эта салатная трава кладется въ приправу обыкновеннаго салата, или часпью смѣшивается въ сборномъ правномъ салатѣ, или одна за салатъ служишь. Въ нѣкоторыхъ же домоводствахъ дѣлають изъ нее укусъ.

Сіе кустистое растѣніе отпускаетъ изъ волошистаго долготѣшняго корня ежегодно новые, около двухъ аршинъ вышиною, тонкіе, но твердые, угловатые и вѣшвыисые сѣбли, и опѣ корня размножается, что всего лучше производитъ въ началѣ весны: тогда въ первый годъ съ цвѣтомъ не приходишь, и вообще, какъ цвѣты на немъ появляются осенью, то и на старыхъ кустахъ оныхъ иногда примѣнить не можно. Оширосіе корней при пересадкѣ кладуть пространно между собою, и приномъ въ тучную землю, гдѣ не пропускають частаго поливанія, которое для нихъ удобнѣе, нежели бы сажали во влажномъ и тѣнистомъ мѣстѣ.

Д а Все

Все растѣніе, а особливо лиспы имѣютъ оспрой, прѣной и прѣшной вкусъ; употребленіе оныхъ разводитъ соки тѣла, отверзаетъ сосуды онаго, возбуждаетъ позывъ на ѣду и прогоняетъ надмѣніе чрева. Трава сія прогоняетъ земляныхъ блохъ отъ капузты и другихъ растѣній, когда поливають водою, съ оною настоянною. Французскіе солдаты въ походѣ напиралъ мясо сими лиспами, чтобъ оное не такъ скоро поршилось. Зимою отъ стужи не требуетъ права сія никакой покрывки. Она растетъ въ Сибири и Ташарти по полямъ, и выдерживаетъ самыя жеспокія зимы.

15) *Трипмадамъ.*

Салашная сія права употребительна въ нижней Саксоніи болѣе, нежели въ другихъ мѣстахъ, и мѣшается въ лактукъ и въ сборные салашы для приправы. Кладутъ же оную и въ травяные супы. Надлежитъ къ растѣніямъ, долготѣшный корень имѣющимъ, и разводится раздираніемъ старыхъ кустовъ. Должно оныя разсаживать въ Мартъ и Сентябрь на три вершка разстояніемъ; всякая земля для нее годна.

Я нахожу въ табелѣ поваренныхъ растѣній Г. С. Людерса къ вышеписанному Нѣмецкому названію трипмадамъ присовокупленное *fedum asre L.* которое однако не есть настоящее сиснематиическое названіе, и могущее незнашока въ растѣніяхъ
обма-

обмануть, что выберетъ онъ къ употребле-
 нію въ пищу не насипящее растѣніе.
 Sedum acre, опъ нѣкопорыхъ *птичій хлѣбъ*
 называемая, распуца на песчаныхъ мѣ-
 стахъ, также на сипарыхъ каменныхъ
 сипѣнахъ всюду во множествѣ, имѣетъ вкусъ
 оспрой, и опъ того происходитъ Лашин-
 ское ея названіе. Эпа права легко можетъ
 возбудить рвоу; припмадамъ напропивъ
 называеіся у *Линнея* *sedum album*, у дру-
 гихъ же Бопаниковъ *sedum teretifolium*, бѣлой
 валикомъ домовый листъ, кошечій вино-
 градъ, *Hauss-Laub*, *Kaizen-Traubel*. Лиспы у
 нее скалкою, шупы, больше наклонены,
 нежели вверхъ сипояшъ, и сипаяшъ пло-
 тно къ стеблю, но слабо; цвѣшпы на че-
 решкахъ и бѣлыя цвѣшпочные лиспы имѣ-
 юшъ по длинѣ своей красноватую черту.
 Sedum acre напропивъ называеіся желтой
 бѣкой домовой листъ, каменной перецъ,
 чихотка, *Mauer-Pfefer*, *Stein-Pfefer*, *Wiesel-*
Kraut, *scharfe Kaizen-Traublein*, имѣетъ
 вверхъ шорчащіе, нѣсколько загнутые,
 густо между собою распуцшіе лиспы, кои
 вверху обыкновенно разрѣзаны на шрое,
 и желтые цвѣшпы въ коленцахъ лиспо-
 выхъ сипаяшъ плотно. По сему бѣлыя цвѣт-
 ки припмадама шравы могутъ незнающимъ
 бышъ вѣрнымъ оплицишельнымъ знакомъ,
 и молодые еще не зацвѣтавшіе ея стебли
 употребляются въ салатъ. Голландскіе са-
 довники, гдѣ эшопъ салатъ въ чести,
 первые прозвали шраву сію *трипмадамъ*,

а опшуда перешло это названіе и къ намъ. Выжатой сокъ этой травы употребляется наружно съ великою пользою отъ почечуиныхъ шишекъ.

16) *Скорсонера или черной овсяной корень.*

Этотъ года два и больше продолжающійся корень называется также Испанская скорсонера, пошому что произходитъ изъ Испаніи; у насъ же въ Нѣмецкой землѣ именуютъ его Нѣмецкою скорсонерою, пошому что множественно сѣется въ нашихъ огородахъ. Сѣютъ его весною, какъ скоро снѣгъ сойдетъ, также 25 Іюля, и пошомъ пересаживаютъ, или оспаляютъ на шѣхъ грядкахъ, гдѣ былъ посѣвъ. Въ послѣднемъ случаѣ продергиваютъ шакъ, чшобъ корень отъ корня осшался не ближе шрехъ вершковъ. Онъ довольствуется и посредсвенною землею, когда нѣтъ лучшей, или кшо употребить шаковой не хочетъ; но въ первой годъ его изъ земли не вынимають, чшобъ больше росту пріобрѣлъ. На зиму прикрываютъ голубинымъ или куринымъ навозомъ, или гораздо перепахавшимъ овечьимъ, вскопавъ прежде землю: отъ сего величина корней примѣшнымъ образомъ увеличивается. Какъ скоро сѣмена поспѣютъ, должно оныя неукоснительно собрать, чшобъ не разлетѣлись. Они всхожи лежатъ шри года.

Черные овсяные отшличаются отъ другихъ корней въ шѣмъ, чшо прочіе, когда пой-

пойдутъ въ спволъ или цвѣсть начнутъ, бывающъ тверды, дровянисты и въ пищу не способны; черные же овсяные корни напрошивъ, сидѣвъ при и четыре года нашой грядѣ, гдѣ посѣяны, оспающся мягки и вкусны, хошябъ цвѣли и сѣмена приносили.

Г. Гледитшъ наминаетъ, чпо цвѣтами скорсонеры можно оказатъ пчеловодству великую помощь; ибо оныя къ собиранію воску и меду весьма способны, а припомъ цвѣтутъ съ Августа въ Октябрь, слѣдспвенно въ такое время, когда почти нигдѣ уже цвѣтовъ нѣтъ; припомъ же хоня обыкновенное время цвѣту ихъ Іюнь и Іюль, но можно для сего медлишь посѣвомъ и пересадкою, чпо въ разсужденіи корней, которыхъ въ первой годъ не выкапываютъ, можетъ быть равнодушно.

Въ кореньяхъ сихъ имѣемъ мы здоровую пищу, употребляя оныя въ супы, ошчасшижъ въ приправу другихъ блюдъ съ мясомъ, подобно другимъ огороднымъ кореньямъ.

Эшотъ корень состоитъ съ цикоріею, селлереею и лакшукомъ, въ разсужденіи врачебныхъ силъ, когда оныя растутъ на дичи, въ одномъ классѣ, но много оныхъ шеряетъ, подобно помянурымъ растѣніямъ, по пересадкѣ въ огородъ. Дикораспущій черной овсяной корень имѣетъ горьковашый вкусъ, но по засушеніи оной пропадаетъ и превращается въ сладковашой

вашой медвяной вкусъ. Корень травы обыкновеннаго львиного зуба превышаетъ его силу.

Выше сказано, что цикорные корни учинились замѣною воспочнаго кофе, но въ скорсонерѣ нашли оныя какъ бы сильнаго совмѣстника; потому что вкусъ отъвара ихъ еще лучше и даже подходитъ къ Левантскому кофе. По этой причинѣ начали скорсонеру разводить прилѣжнѣ; можетъ быть обоихъ сихъ упомянутыхъ корней въ употребленіи вмѣсто кофе превзойдетъ низкая скорсонера, съ одноцвѣтнымъ почти голымъ стеблемъ, *Scorsonera humilis* у Линн. распускающая въ дубровахъ и борахъ, и долголѣтний корень имѣющая; а особливо что Линней предписываетъ употребленіе оной въ Аптекахъ.

Примѣч. Переводч. — Скорсонера или черной овсяной корень, въ Россіи называется *кудрявецъ*, и растетъ множественно по лугамъ и облогамъ. Проспой народъ употребляетъ молодые стебли его въ пищу сырые; а объ употребленіи корней никто почти не знаетъ. Цвѣты на этой травѣ желтые лучистую звездою.

17) Рѣчатая селлеря или рапунцельной корень, (*Rhapontica*).

Корень этотъ имѣетъ различныя названія, кои садовникамъ подали случай къ ошибкамъ. Въ Саксонскомъ садовничьемъ спискѣ сѣменамъ названъ оной *рапунтика*,

ка, которое составляет Латинское его названіе, равно какъ и *Oenothera biennis*. У Нѣмецкихъ садовниковъ называется онъ *die zweijährige Nacht-Kerze mit borstigen Stängel, Garten-oder Französische Kapunzel, Küb-Kapunzel*, т. е. двулѣшняя ночная свѣча съ щетинистымъ стволѣмъ, садовой или Французской рапунцель, рѣпной рапунцель.

Вывезенъ къ намъ этошъ корень лѣтъ за 50 изъ Виргиніи. Сырой онъ вкусомъ какъ пущарнакъ, и употребляется въ салатъ, какъ селлерей. Сѣвъ его должно производить ежегодно весною на доброй рыхлой землѣ, и распѣнія по благоусмотрѣнію разсаживать; ибо, когда пойдетъ оное въ стволъ, корень сдѣлается твердъ и негоденъ къ употребленію въ пищу. Къ собранію сѣменъ оставляютъ нѣсколько корней зимовать, попому что зиму они выдерживаютъ; но чшобъ корни имѣть для поварни зимою, должно ихъ осенью выкапывать, листья корневые оспорожно обрѣзывать и беречь въ погребѣ.

Не должно надѣяться на собственное размноженіе сихъ корней онъ выпадающихъ множественно сѣмянъ, попому что оныя еще осенью всходятъ, и съ начала весны пойдутъ въ стволы; по сему лучше сѣвъ производить весною, и распѣнія разсаживать на 3 вершка между собою.

18) Садовой или рѣпной рапунцель.

Это огородное распѣніе не рѣдко съ предшедшимъ въ спискахъ за одно смѣ-

живается, а пошому покупщики обманываются. У *Линнея* называется оное *campanula Rapunculus*; у другихъ же *Бопаниковъ* *Rapunculus esculentus*; волнистой колокольчикъ по переводу съ Нѣмецкаго *Wellen-förmige Glocken-Blume*.

Лиспы и корни сего растѣнїя въ салатѣ употребляются, у насъ, во Франціи и Англіи, сѣются весною на открытомъ воздухѣ, и размножаются сами собою, гдѣ однажды посѣяны. Земля подъ нихъ потребна средспвенная, и корни между собою должны имѣть на два вершка простору.

19) *Гонощи*, или *рѣпной кербель*, или *пеперлей*.

Я посѣвалъ сіи три огородныя растѣнїя сряду, чѣмобъ чипашели, какъ-то не рѣдко случается, за одно смѣшавъ оныхъ не могли. Рѣпной кербель у *Линнея* названъ *Chaerophyllum bulbosum*, а у *Ривинїя* *Myrrhis foetens*, ш. е. мирра вонючая, пошому что лиспы его воняютъ.

Пеперлейной салатѣ въ великомъ употребленїи въ верхней Нѣмецкой землѣ. Развариваютъ именно корни, слупляютъ кожу, и дѣлаютъ салатъ съ солью, перцомъ, уксуsomъ и масломъ.

Охощники до сего салату, чѣмобъ долѣе и ранѣе онымъ пользоваться, располагаютъ одинъ сѣвъ въ Сентябрѣ, другой въ Іюнѣ, на простой землѣ, продергивая ославляютъ растѣнїя между собою на 2 вершка. Назначаютъ подъ нихъ землю средспвен-

спивенной доброты; но на добромъ, рыхломъ и тѣнистомъ мѣстѣ корни бываютьшѣ шолще. Оныя съ наружности черноваты, внушри бѣлы, и когда пойдуть въ стволъ, дѣлаются пверды и неудобны въ пищу, потому что ошчасу дровянѣють и замирають. Сѣмена лежатъ прочны два года.

Впрочемъ еще замѣшшь должно, что растѣніе эпо, бывъ роду кервельнаго, бываетъ настоящей болиголовъ, пока не принесетъ сѣмянъ, во всемъ подобно, и легко за оную почтено бытъ можетъ; почему Г. Кранцъ пишетъ, что онъ изъ сего кервеля въ вѣнъ болиголовной экстрактъ соспавлялъ, и тѣмъ самъ себя и другихъ обманывалъ. Еще должно вѣдать, что корень сего кервеля вытягивается въ длину, когда начнетъ въ стволъ итти, и тогда уже для спола негоденъ; прежде же бывають онъ рѣпчатъ и мясистъ. А у болиголовы корень длинной; по сему можно осперечься, чтобъ не сдѣлашь ошибки въ поваренномъ употребленіи.

Корни сїи имѣють сладкой и прїятной вкусъ; Австрійцы въ особливости эпомъ салатъ любятъ, и путешеествуя, во многихъ мѣстахъ шщетно объ ономъ спрашиваютъ.

20) Земляной орѣхъ, земляной каштанъ, *Bunium bulbo castanum* у Линн.

Плодъ эпомъ ошъ прослоюдимовъ не рѣдко за одинъ съ предшедшимъ почитается.

шается. У славныхъ Ботаниковъ называется онъ, у Г. Диприха *Erd-Nuß*, а у Г. Планерна *Erd-Konten*, впрочемъ же *земляной жолудъ*, *земляной каштанъ*, *свиной каштанъ*, *овечій орѣхъ*, и находится дикорастущій въ нашихъ лѣсахъ. Рѣписшой, мясистой корень его отпускаетъ бороздчатой стволъ, копорой вверху на нѣсколько суковъ раздѣляется. У каждого раздѣленія сидитъ листъ, копорый подобенъ корневымъ листамъ, только поменьше разрѣзы имѣетъ. Сѣмена его поспѣваютъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ, въ которое время и листы пропадаютъ, и тогда гдѣ они растутъ на дичи, должно собирать коренье; ибо не замѣшивъ мѣста, по опадении листовъ искать оныхъ будетъ трудно.

Въ огородахъ сѣютъ сѣмена ихъ въ Сенсябрѣ, на посредственно доброй землѣ, и слегка загребаятъ граблями. Когда они взойдутъ, опалывающіяся отъ сорныхъ травъ, растѣнія же такъ прорываютъ, чпобъ не меньше двухъ вершковъ между собою сидѣли. Они приносятъ на другой годъ сѣмена, кои всхожи могутъ лежать два года.

Корни ихъ вкусомъ подобны каштанамъ, очень питательны, и употребляются въ пищу отчаси сырые, частью же печеные въ горячей золѣ, съ коровимъ масломъ и перцомъ; также употребляются съ приготовленіемъ зеленой капусты, и всюду, гдѣ подаютъ сладкіе каштаны съ ку-

кушаньемъ. Въ сѣпарину предписывали ихъ имѣющимъ недоспапокъ естественныхъ силъ къ дѣйсствіямъ любви.

21) *Американской земляной орѣхъ, Glycine apios, у Линн.*

Размноженіе сего изъ Америки перешедшаго плода производится у насъ разсадкою корней побочныхъ, потому что у насъ цвѣты облешаютъ, не произведши сѣмянъ. Въ Виргиніи же въ продолговатомъ спручкѣ содержатъ почкообразныя сѣмена, кои отъ тамошнихъ жителей употребляются вмѣсто гороху; бѣдѣ же и корни ихъ, уподобляющіеся вкусомъ арпишюкамъ. Корни простираются далеко вокругъ, ежегодно опускаютъ новые стебли, кои около смежныхъ растѣній обвиваются, и естли оныя слабы, придавливаютъ. Впрочемъ они очень прочны, не требуютъ никакого особливаго присмотра, и естли выведены будутъ пирамидою, придадутъ садамъ особое украшеніе.

22) *Земляные орѣшки, земляныя мыши, по Голландски Aerd Muizen.*

Это булависное растѣніе называется у *Линнея* *Lathyrus tuberosus*, у древнихъ же писателей *Terrae glans*, и кромѣ предшешихъ названій имѣетъ еще: *земляная фи-га, пашенной жолудъ, незаправской свиной хлѣбъ*. Плодъ эшотъ въ разсужденіи правы своей описанъ въ главѣ о кормныхъ травахъ подъ буквою Г. (о), яко отличный кормъ для всѣхъ скошовъ; по-
тому

тому что ѣдятъ ее охотно лошади, ро-
гапой скошъ, козы и овцы.

Корни сіи, подобно картофелямъ, про-
долговато-круглы, однакожъ самые боль-
шіе не крупнѣе грецкаго орѣха; а какъ ви-
домъ опчаспи подобны мышамъ, да и
оканчивающіяся оспрымъ хвостикомъ, то
и подало это случай къ названію ихъ зем-
ляная мышь.

Находящіяся сіи корни опчаспи дико-
распущѣе, гдѣ не пускающъ свиней, по-
тому что сіи, бывъ до нихъ лакомы, всю-
ну выскиваютъ. Гдѣ корни сіи будучъ
посажены единожды, не легко ихъ испре-
бипъ; потому что не замирающъ, и глу-
боко идущъ въ землю. Сажаютъ ихъ въ
Мартѣ и Апрѣлѣ на два вершка глубиною,
и на 6 вершковъ распояніемъ, на всякой
землѣ; почему и сажать ихъ должно лишь
на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ добрыя расшѣнія
не успѣваютъ. Зеленые листья ихъ упо-
добляются такъ называемому пшичьему
горошку (*Vicia cracca* у *Линн.*), имѣющъ
таковой же цвѣтъ и сырочки. Размноже-
ніе отъ корней, подобно картофелямъ,
употребительнѣйшее.

Первой годъ осматриваютъ ихъ не про-
гавъ, а на другой годъ выкапываютъ въ
началѣ Ноября, при чемъ оказывается
оныхъ множество. Крупные очистивъ отъ
волошей, хранятъ въ погребахъ или ямахъ
въ пескѣ; дробные же осматриваютъ на мѣ-
стѣ и закапываютъ землею. Когда на-
добно

добно будешъ засадишь оными новое мѣсто, отбираютьъ маленькіе корешки, кои для весенней посадки вмѣстѣ съ крупными выкапываются, и сажаютъ.

Кожа на сихъ корняхъ мягка и черна, ядро же бѣло и нѣжно, подобно каштановому, къ копорому и вкусомъ очень подходитъ.

Пріуготовленіе въ кушанье сихъ корней различно. Обмывъ оныя варящъ въ водѣ съ прибавкою малой доли коровьяго масла, подаютъ на столъ горячіе, гдѣ облупивъ, ѣдятъ съ коровьимъ масломъ и солью. Обыкновеннѣе опшвариваютъ ихъ въ водѣ, какъ каршофели, и ѣдятъ съ солью. Когда же подавать ихъ на столъ, подобно сладкимъ каштанамъ, къ разнымъ кушаньямъ, или варить въ оныхъ, тогда напередъ очищаютъ съ нихъ черную кожу.

Г. фонъ Минхгаузенъ не находитъ оныхъ по своему вкусу, и говоритъ: должно привычку сдѣлать, чтобъ показались они вкусны; но какъ можно о вкусахъ спорить? Въ Голландіи эшотъ плодъ очень любящъ, и Госпожи, коихъ уста довольно нѣжны, прикусываютъ оной вмѣстѣ сухарей съ чаемъ. Но столько по крайней мѣрѣ достоверно: кто не охотникъ до сладкихъ каштановъ, тому и земляные орѣшки сѣи не будутъ по вкусу. Въ сѣверной Нѣмецкой землѣ древа сладкихъ каштановъ не растутъ, и пошому за иноспранные мароны или сладкіе каштаны

выходитъ много денегъ изъ государства. Легчайшій способъ къ пресѣченію сего ненужнаго выпуску денегъ, чѣмъ правитель-ство, выписавъ нѣсколько фунтовъ земляныхъ орѣшковъ изъ Графства Цинфенскаго, въ кошоромъ великой торгъ оными производится, роздало охотникамъ къ разводу оныхъ, дабы чрезъ то замѣняющее кашпаны распѣніе сдѣлалось знакомѣе и множественнѣе; ибо поднесъ еще большая часть охотниковъ къ кашпанамъ лишь по наслышкѣ или изъ чтенія сославляется.

23) Земляныя яблоки, земляные артишоки, Иерусалимскіе артишоки.

Не взирая на то, что сіе корневое распѣніе имѣетъ опсеченіемъ своимъ Бразилію, растетъ оное и въ Европѣ холодной, гдѣ морозы въ землѣ его не повреждаютъ. Это плодъ, бывшій прежде въ уваженіи, но нынѣ опъ картофелей почти совсѣмъ ушѣсенный. Однакожъ заслуживаетъ онъ, чѣмъ опять за него принялись, и по крайней мѣрѣ разводили для кормленія рогатаго скота и свиней; ибо всегда остается еще довольно мѣстъ, кои для картофелей низменны и влажны, а особливо въ мочливые годы, и на шаковыхъ земляныя яблоки очень хорошо родятся. Также и въ семъ естъ главное преимущество земляныхъ яблокъ предъ картофелями, что онымъ зима не вредитъ, можно ихъ ославлять въ землѣ до весны, и тогда продолжая оными зеленой кормъ,

кормъ, когда еще другія свѣжія растѣнія, какъ-то капуста, рѣпа и тому подобное исходящъ. Если назначить подъ нихъ добрую землю, хорошо вскопанную и унавоженную, приносятъ они тридцати и пятидесяти крапной плодъ. Лучшее подъ нихъ мѣсто влажное и песчаное. Сажая ихъ въ глубокую осень, или весною, какъ скоро снѣгъ сойдетъ, на два вершка глубиною въ землю, и вершковъ на десять разсѣянїемъ, избирая къ тому малыя булочки, или крупныя разрѣзывая на части, чѣмъ въ каждомъ кускѣ былъ роспокъ или такъ называемой глазокъ. Въ теченїи лѣта должно ихъ опалывать, къ чему способнѣе взвращиванїе земли широкою, и лучше шѣмъ посѣпорожня правы изпреблываются. Сѣволовъ правныхъ сѣзывая не должно, для того что корни ошъ того останутся дробны, а сверхъ того тверды и дровянисты. Тѣ корни, коимъ не зимовать для весенняго корму, выкапываютъ для употребленїя въ Ноябрь и Декабрь, и кладутъ въ погребъ или въ яму въ песокъ.

Не взирая на то, что *Декомбе* на стр. 537 о своихъ землякахъ пишетъ: „Вошъ самой негодной изъ огородныхъ, овощей во всеобщемъ мнѣнїи; но простой, народъ, сославляющій многочисленнѣйшую часть человѣчества, онымъ питается,“. Есть между нами особы средняго сосноянїя, кои охотно бдятъ плодъ эшотъ,
Часть IV. Отдѣл. 2. Е *сѣ-*

съ говядиною и бараниною вареный, даже что въ недоспѣлкѣ оного зимою охотники вырубаятъ его изъ замерзшей земли. Но поелику эшопъ плодъ болѣе водянь, нежели мучнянь, и производишь надмѣнїе, должно употреблять его съ перцомъ, и при варенїи всегда первую воду сливать. Желаящїй очистишь мѣсто, гдѣ въ прошломъ году сидѣли земляныя яблоки, онъ вырастающей оныхъ травы, долженъ появляющуюся траву всегда выдергивать, онъ чего они скоро пропадутъ. Старые же швердые стволы можно сушить, и въ безлѣсьи употреблять вмѣсто дровъ, или къ умноженїю навоза бросать въ навозныя ямы.

24) *Трюфели*; *Lycoperdon tuber*, у Линн.

Эшопъ плодъ, также соснавливающей лакомой кусокъ на сполахъ у знающихъ особъ, не должно бы покупать такъ дорого у Италїанцовъ, для того что есть оный по мѣстамъ и въ нашихъ дубовыхъ и буковыхъ лѣсахъ, и опѣскивается особливыми промышленниками, прїюфельные егери называемыми, посредствомъ прѣученыхъ къ тому собакъ; почему удивительно, что наши Хозяева по сѣхъ поръ не прилѣжатъ къ разводу сего плода, чѣмъ бы отчасти не плашить денегъ за него для собственнаго употребленїя, частью же онъ продажи оныхъ умноживъ свой доходъ произведенїемъ, на которое сполько вѣрной расходъ.

Мы

Мы имѣемъ три рода трюфелей, которые между собою различать должно. Перваго рода *бѣлые трюфели*, о которыхъ здѣсь рѣчь идетъ. Оныя обыкновенно лежатъ глубоко въ землѣ нѣсколько пучной въ лѣсахъ, шарообразны, величиною съ грецкой орѣхъ, имѣютъ бѣлую нѣсколькими возвышеніями усаженную корку, а внутри плотную и твердую. Внутреннее вещество ихъ состоитъ какъ бы изъ большихъ пузырьковъ, изъ которыхъ въ каждомъ содержится опредѣленное число спмечекъ; а какъ въпрочемъ плодъ этотъ надлежитъ къ грибамъ, то въ этомъ оплчается онъ всѣхъ оныхъ. Второю родъ *оленьи трюфели*, которые называются по Нѣмецки *Hirsch-Brust unter der Erde*, инако же подземные ядровиные грибы съ суковатою щелухою, *Lycoperdon cervinum* у *Линн.* Сіи оленьи трюфели имѣютъ толстую какъ бы маленькими сучками или глазками усаженную щелуху, и поспѣвъ прескаются въ разныхъ мѣстахъ. Роскошный запахъ оныхъ привлекаетъ оленей, свиней и зайцовъ, кои съ жадностію оныхъ ищутъ и выкапываютъ. Третій родъ *свинные трюфели*, называемые инако въ Нѣмецкой землѣ *falsche Hirsch-Brust*, также *Erdb-Mast*. Можно оныя назвать подземные продолговатые и гладкіе ядровиные грибы. Этотъ грибъ имѣетъ также запахъ, большею частью лежитъ глубоко въ землѣ, часто перемѣняетъ свой яйцеобразной про-

Е 2

долговатой видѣ въ сердцеобразный и треугольный, а желшовапый цвѣтъ въ темный. Дикія свиньи до нихъ лакомы; но спѣлые, мягкіе и мало воняющіе оспавляютъ, а бѣашъ швердые, незрѣлые и вонючіе. Г. Гледишъ соединяетъ оба сіи послѣднихъ рода, и счиаетъ за опродіе первого. Оба послѣднихъ рода находяшся болѣе на сухихъ и песчаныхъ мѣстахъ въ лѣсахъ, гдѣ мало подрости, и гдѣ дождь хорошо проникаетъ можетъ, большею часпью около деревьевъ. Поелику сіи роды трюфелей по мѣрѣ спарости своей различнымъ образомъ перемѣняющся, и въ особливости пріемлютъ разную краску: шо сортовъ ихъ ни въ какое время не лзя въ точности показатъ и опредѣлитъ. Г. Брэдлей утверждаетъ поному въ своихъ Физическихъ примѣчаніяхъ о садоводствѣ, что бѣлые, сѣрые и черноватые трюфели только одинъ родъ соспавляютъ; что каждый трюфель бѣлъ, пока еще не выспѣлъ; что начавъ созрѣватъ сѣрѣетъ, а совсѣмъ поспѣвъ учиняетъ весь черноватъ; внутренность трюфелей весною бываетъ бѣла, осенью же съ прожилками или мarmorована. Весенніе трюфели нѣжиѣ осеннихъ, но послѣдніе счиаются лучшими.

На всѣ сказанныя перемѣны не взирая, должно къ познанію доброты трюфелей взираетъ на цвѣтъ оныхъ, и наблюдаетъ еще отъ Маттіола замѣченное различіе, что

имен-

именно лучшіе съ наружности бывають черны, кожа ихъ наполнена глубокихъ трещинъ и желвачковъ, мясо внутри бѣловато, а запахъ имѣющъ сходный къ чесноку. Сїи въ Италїи счисляются лучшими. Средній родъ, который у насъ находится, съ наружности бываетъ также черенъ и шароховатъ, мясо внутри темноваго, а иногда подобно мускашному орѣху испещрено. Бѣлые же или бѣлокрасноватые и больше гладкіе, имѣющъ шло непрїянное и совсѣмъ не уважаются. Иногда трюфели величиною бывающъ съ грецкой орѣхъ, иногда меньше; но гдѣ имѣющъ способность роспи, достигая въ сомъ полуфунта и выше.

Выше упомянуто, что какъ трюфели росшущъ внутри земли, а на поверхности оной никакихъ признаковъ своихъ не имѣющъ, почему бы ихъ прїискати можно, то отыскивающъ ихъ егеря съ собаками. Сїи собаки соспавляющъ въ Италїи родъ малыхъ пуделей, коихъ шамъ *Путта* называютъ. Употребляющъ же шамъ къ сему и свиней, у которыхъ рыло желѣзнымъ кольцомъ сомкнуто, чтобъ они трюфели обнюхавъ и выкопавъ могли, но не съѣли. Есть еще насѣкомое, могущее открывать сокрытые въ землѣ трюфели, а именно подвержены они червопочинъ. Червякъ, нападающій на оныя, бѣлъ, и превращается въ синюю муху. Гдѣ таковыя мухи на землѣ примѣчены будуще,

считаютъ за знакъ, что въ этомъ мѣстѣ лежатъ трюфели.

Но получаютъ трюфели другимъ и легчайшимъ образомъ, чрезъ посѣвъ и выращиваніе оныхъ въ огородахъ по подобію другихъ грибовъ.

По замѣчанію Г. Канслера въ описаніи его путешествія, трюфели могутъ расти во всякомъ мѣстѣ, когда лишь на оное воду, въ которой трюфели варены, съ помоями и очисками. Вода, въ коей варены печерицы и другіе грибы, равно производитъ дѣйствіе. Оные вырастаютъ на градѣ, къ сему пріуготовленной, когда ошваромъ симъ оную поливать. Г. Гледитшъ таковой разводъ трюфелей ошваромъ оныхъ подтверждаетъ.

Г. Брайлей учинилъ насъ другому и еще вѣрнѣшему способу. Онъ желаетъ имѣть спѣлыхъ трюфелей, а именно таковыхъ, на которыхъ кожа черная; а сіи находятъ шокмо осенью съ Октября по Декабрь. Въ это же время и посѣвъ оныхъ производить должно, и кому удастся получить спѣлые трюфели, долженъ беречь оные къ помянутымъ мѣсяцамъ, къ чему способна вода; и въ водѣ, увѣряетъ онъ, можно уберечь ихъ цѣлые полгода. Мѣсто, на которомъ ихъ заводятъ, должно быть земля рыхлая, съ пескомъ смѣшанная. Выкопавъ земли на чепыре вершка глубиною, просѣявъ оную, и этою просѣяною землею закрыть выкопанное мѣсто,

сто, на вершокъ или полшара толщиною, положишь сѣмена шрюфельныя разсоянїемъ одно опъ другаго на 9 вершковъ, не вдавливая оныхъ въ землю. Оспавшуюся землю, разболшавъ на водѣ, залишь симъ распворомъ шрюфели. Гряду сего рода оставишь въ покоѣ на цѣлой годъ, и въ будущемъ Октябрѣ можно будетъ произвестъ выкапыванїе. А какъ положенные шрюфели не пускаютъ опростковъ, и такъ какъ карпюфели не размножаются, лучше будетъ шрюфели разрѣзывать и класъ ихъ въ землю кусочками. Есшли же въ нашихъ сѣменахъ шрюфельныхъ доспанъ не можно, должно выписать оныхъ изъ Италїи свѣжихъ, и везъ въ мокрой землѣ, или завернувъ въ мокрой мохъ; шрюфели тамошнїе запахомъ предъ нашими сильнѣе, и сушеные изрѣзанные кружками опправляюща въ другїя сѣманы на продажу.

Трюфели во Франціи, Италїи и Нѣмецкой землѣ счишаются за лакомой кусокъ, и варятъ оныя свѣжїе, или пекутъ въ горячей золѣ, а по снятїи наружной кожи бдятъ съ перцомъ, солью и деревяннымъ масломъ, или сушеные употребляють въ пошажї, соусы и паштеты. Въ особливости предлагають оныя шѣмъ, кои имѣють нужду въ художественномъ побужденїи къ роскоши. Однакожъ не должно кормить себя оными щедро; ибо замѣчено, что чрезмѣрное упошребленїе оныхъ

можетъ приключать смерть. Оныя, подобно всѣмъ грибамъ, шверды, неудобоваримы, соснавляющъ надмѣвающую пищу, къ копорой не слабой желудокъ пошребенъ.

25) Картофели, или тарчуфели, или эртюфели.

Эпошъ за пятьдесятъ лѣтъ у насъ общимъ учинившійся плодъ разумѣетъ уже водить каждый кресъянинъ и поденьщикъ масшерски. Требуешъ оной хошя посредспвенной земли, однакожъ не все не одобренной. Сажаютъ ихъ съ великою и малою выгодною на худошавой и шучной, на легкой и шяжелой, холодной и шеплой земляхъ. Хошя же родяшя они всюду, однакожъ песчаная и рыхлая земля для нихъ способѣе, нежели швердая и плотная. Урожаютъ же они въ сухменныя лѣта на самыхъ низкихъ мѣстахъ, шакъ какъ въ мочливыя на горахъ и возвышеніяхъ, очень хорошо, но шолько шрава шупъ бываетъ не шакова высока и шолспа. Но какъ годовой погоды предузнать не можно, шо должно подъ картофели назначать средспвенное положеніе мѣста, ни высокое, ни низкое, шшобъ по состоянію погоды швершеннаго неурожаю не пошербшъ. Тѣ, копорыхъ принуждаешъ неволя очень низменное мѣсто занимаешъ подъ картофели, должны способшвовашъ шѣмъ, шшобъ на шаковомъ мѣстѣ мотыкою вскопашъ маленькіе бугорки, посадить въ оныя картофель, засыпать еще землею, а послѣ, когда шолоніе нужно будетъ, взры-

взрыпую при изстребленіи поспороннихъ
прабъ мошикою землю еще на бугорки
взмешать, и шѣмъ ихъ возвыситъ, чшобъ
каршопели совѣмъ отъ мокроты были
безопасны.

Нельзя собшвенно ушверждать, чшобъ
свѣже унавоженная земля для каршопелей
вредна была: ибо у насъ эшо произво-
дися во всей провинціи, хотя и естъ
Хозяева, кои сажаютъ каршопели на мѣ-
стахъ, за годъ или нѣсколько лѣтъ предъ
шѣмъ унавоженныхъ, и кои въ теченіи се-
го времени другіе плоды носили. По сосѣд-
ству моему на поляхъ землю изобильно
навозятъ подъ каршопели, и на другой
годъ безъ дальняго угобженія сѣютъ на
ней пшеницу.

Выгоднѣ ли землю подъ каршопели
пахать или вскапывать, эшо должно въ
каждомъ мѣстѣ испытать. Естъ эконо-
мическіе писатели, паханіе предпочитаю-
щіе, и полагающіе въ основаніе, что ко-
паніе требуетъ больше времени и тру-
довъ. Въ эшомъ они правы. Но когда на-
прошивъ у другихъ естъ намѣреніе, чшобъ
пашню, а особливо когда оная справяна,
къ слѣдующимъ сѣвамъ шѣмъ пріугошо-
вить, онымъ выгоднѣ землю подъ каршо-
фели копать: ибо достовѣрно, что на
копаной землѣ больше оныхъ урожается,
нежели на паханой. Такъ на прим. у насъ
слишкомъ испытано, что вскопанное
подъ каршопели мѣсто, естли не въ по-

ловину, по третью больше картофелей приносятъ.

Гдѣ сажаютъ картофели на вспаханной землѣ, тамъ шедъ за сохою или плугомъ бросаютъ куски оныхъ въ борозду, чинобъ слѣдующая за тѣмъ борозда ихъ закрыла, что ускоряетъ работою, нежели бы сажали оныя по землѣ вспаханной и гладко забороненной.

При сажаніи картофелей, и что рядами производить должно, попребно взирать на состояніе почвы, въ каковомъ разстояніи ихъ класъ въ землю. На самой доброй землѣ должно рядамъ разстояніе между собою на 12 вершковъ, и въ такомъ же разстояніи сажать картофели вдоль по бороздамъ на землѣ средней доброты, гдѣ шрава ихъ не такъ сильно росшетъ: довольно бытъ бороздъ отъ борозды на девять вершковъ, и на столькожъ корню отъ корня. Еслижъ наконецъ земля самая худая, борозды или ряды должны разстоятъ на поларшина, и на столькожъ корень отъ корня.

Не согласны въ томъ, какіе къ сажанію брашь картофели, крупные ли, средніе ли, или самые малые. Сколько я примѣнилъ могъ, по крупные сѣменные картофели на худой землѣ приносятъ плода больше, нежели средніе, а сіи больше, нежели самые дробные. Я съ намѣреніемъ на шаковой землѣ сажалъ особливы-

ми полосками сѣменной картофель всѣхъ трехъ показанныхъ разборовъ, и замѣчалъ палочками. Дробные картофели опускающъ очень тонкую и низкую шраву, крупные же напрошивъ много толстыхъ и высокихъ стеблей, да и уродились вчешверо и шестеро больше, нежели дробные. Отъ среднихъ картофелей вышелъ плодъ средняго содержанія. Физическая причина тому сѣя: крупной кусокъ, пошому что сначала самъ изъ себя силу заимствуетъ, пускаетъ очень здоровой и толстой стебель, отъ онаго происходятъ въ нѣсколькихъ линіяхъ разстояніемъ отъ глазка особливые роски корней, кои вышягивающся и завязываютъ на себѣ особливья булавы. Когда таковыя корневые роски усилятся и распространятся, къ чему большая сѣменная часть еще довольно силы сообщитъ имъ въ себѣ содержишь, занимается чрезъ то больше пространства, и по истощеніи сѣменнаго куска молодая булава въ состояніи будучъ чрезъ то больше питанія къ себѣ прилягивашъ. Напротивъ дробные сѣменные куски имѣютъ силъ мало, а пошому отпускаютъ ростки слабые, тонкіе и короткіе, кои оставаясь на шѣсномъ разстояніи, скудное питаніе получаютъ, да и на стебляхъ выводятъ лишь маленькіе листы, кои слѣдственно меньше вышягивающъ въ себя питанія же изъ росы, дождя и воздушныхъ солей, нежели листы крупные, отъ чего естественнымъ

нымъ образомъ должно уродиться картофелей не много и то мелкихъ. Если же напротивъ земля будетъ добрая и въ полной силѣ находящаяся, можно на оной сажать и мелкие картофели по тому основанію, что изъ махерей произшедшіе слабые корешки въ землѣ найдутъ добрыхъ кормилицъ, отъ коихъ приняты будутъ лучшимъ образомъ, и приведутся въ укрѣпленіе. Но это должно разумѣть о землѣ, умягченной и рыхлою учиненной чрезъ многое паханіе, нежели вскапываніе: ибо мелкие сѣменные куски въ твердой землѣ найдутъ много сопротивленія, въ которую слабые ростки проникнуть и распространиться не могутъ.

Почему всегда на сѣмена должно берегать крупные картофели; а чтобы удовольствоваться въ вышеписанной теоріи, равномерно взять трудъ посадить картофели трехъ разныхъ разборовъ, и мѣста ихъ замѣнить. Замѣнь отъ сего разбору шаговъ великъ, что тамъ, гдѣ впрочемъ полосины крупныхъ картофелей на сѣмена употребляется, засаживая отчасти половиною среднихъ картофелей, частью же малыхъ по состоянію почвы, пойдетъ оныхъ гораздо меньше половины, въ четвертую или шестую долю. Одинъ только случай, какъ выше сказано, исключая, чтобы самую плохую землю засаживать крупнымъ картофелемъ. Въ этомъ обстоя-

тель-

яшельствѣ бережливость великой убы-
шкѣ приключишѣ.

Когда крупные сѣменные картофели
разрѣзываются въ куски, должно остере-
гаться, чтобѣ глазковѣ не перерѣзашѣ, для
того что они отѣ того пропадутѣ и ро-
стковѣ не пускаютѣ. Однаковѣ болѣе, неже-
ли въ одномѣ намѣреніи, въриѣ держатѣ-
ся вышеписанной теоріи, и въ куски кар-
тофелей не разрѣзывать: ибо примѣчено,
что разрѣзанные куски, когда земля мо-
кра, или послѣ сажденія оныхѣ дождѣ пой-
детѣ, скорѣ загниваютѣ, меньше силь-
ные ростки пускаютѣ и приносятѣ плодѣ,
въ срединѣ ржавость имѣющій и невку-
сный; подобное выходитѣ и отѣ неразрѣ-
занныхѣ, но побитыхѣ или загнившихѣ
сѣменныхѣ картофелей; а потому до по-
садки надлежитѣ ихѣ осматривать, и за-
гнившіе съ побитыми откладывать, упо-
требить въ кормѣ скопамѣ.

Еще многіе поселяне въ сажденіи кар-
тофелей производятѣ сугубую погрѣш-
ность въ томѣ, что либо глубоко оные
въ землю кладутѣ, или садовымѣ ро-
номѣ провертывая въ землю ямки, даютѣ
онимѣ столько простору, что и одинѣ кар-
тофель съ нуждою помѣстится, а они
кладутѣ въ нее нѣсколько другѣ на друга.

Еслили земля не довольно мягка, то
роженѣ садовой производивѣ ямку, учи-
няетѣ оную внизу и въ бокахѣ твердо,
такѣ что ростки пробьются въ нее не мо-
гутѣ,

густѣ, принуждены будутъ сперва сдѣлать нѣсколько изгибовъ, пока проникнутъ, и шѣмъ всходъ ихъ задерживается, или еще и совсѣмъ они погибаютъ. Когда же въ шѣсную ямку положишь нѣсколько картофелей другъ на друга, роскамъ будетъ шѣсно, они переплешутся, и помѣшаютъ другъ другу росши. Производитъ же это и отъ того, что нижней картофель ляжетъ очень глубоко, а верхній слишкомъ высоко.

Отвращаются же отъ погрѣшности шѣмъ, что при сажаніи картофелей дѣлать ямки засступомъ. Въ этомъ случаѣ можно дать сѣменнымъ картофелямъ надлежащую глубину и просторъ, а именно: должны они имѣть поверхъ себя земли на три вершка, что и глазомѣръ при разверзаніи земли показать можетъ. Когда же въ одну ямку класъ нѣсколько картофелей, можно оную сдѣлать просторнѣе, такъ чтобъ между картофелями было на ладонь разстоянія. Къ сему потребно два человека: одинъ долженъ копать засступомъ, и заколупивъ землю приподнять въ бокъ на ономъ; другой кладетъ картофели, и пошомъ первой засступъ ослабляя вынимаетъ, отъ чего земля упадетъ и засыпаютъ картофели. Если картофелей сажать много, распоряжающіяся люди въ вышесказанномъ учрежденіи.

Многіе роды картофелей, изъ которыхъ каждой въ разныхъ провинціяхъ особ-

ли-

ливымъ именемъ называется, и кои въ другихъ мѣстахъ не извѣстны, почему писателя всѣ вообще лучше разумѣть будишь, когда покажешь онъ, (поселику одинъ родъ предъ другимъ въ томъ или иномъ намѣреніи лучше) каждой изъ нихъ по виду и краскѣ; ибо нѣкоторые роды другъ въ друга перерождаяются, когда по близости сиюшъ, и посредствомъ цвѣтовъ своихъ взаимно оплодотворяются. А какъ въ нѣкоторые годы картофели народныхъ болѣзней естли не возбуждаютъ, то умножая и худшими учиняшъ могутъ, и даже въ скопахъ болѣзней производяшъ (смотри Виттенберг. еженедѣльные листы 1779 года стр. 92); не должно потому Хозяину бышъ равнодушну, какой родъ картофелей водить къ употребленію въ пищу, потому, что когда о здоровости или вредности картофелей рѣчь идешъ, главнѣйше показашъ то могутъ роды ихъ.

Нѣкоторые изъ новыхъ писателей различные сорты оныхъ по ихъ признакамъ, въ пользу садителей, довольно явственно описали. Но никто не учинилъ сего обстоятельнѣе, какъ Г. Пр. Симонъ въ своихъ физико-практическихъ предложеніяхъ о Хозяйствѣ. Я введу сюда описаніе его, умноживъ оное прибавленіями.

АА. Лѣтніе картофели.

Называютъ нѣкоторые картофели лѣтними единственно въ отношеніи къ ихъ поспѣванію, что они ранѣе зрѣютъ

и въ пищу употребляются предъ поздними родами, кои въ исходѣ Сентября поспѣвають и потому осенними картофелями называющся, хотя впрочемъ оба главныхъ рода въ одну пору весною сажаютъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называющъ лѣтніе картофели Яковлевскими, потому что они около дни С. Якова (25 Іюля) спѣлосъ получающъ. Между тѣмъ нѣкоторые оспаваютъ и позднеспѣлые роды до половины Сентября въ землѣ, для того что тогда они нѣсколько долѣе своей доброй вкусъ удерживающъ, который у нихъ обыкновенно, а особливо когда лѣто было мочливо, или сидѣли они на низменномъ мѣстѣ, въ началѣ зимы пропадаетъ; ибо учиняющся они тогда какъ бы сальны и не столько мягки, а потому не столько здоровы человѣкамъ въ пищу: понеже всѣ картофели должно счищать подозрительными, чѣмъ меньше оныя рухлы и мучняны. Свойство это усмотрѣвъ въ нихъ можно по свареніи, когда они по свареніи оспаются внутри бѣлы. Но внутри желтоватыя и красноватыя, хотя нѣкоторые до шаковыхъ больше охотники, далеко въ этомъ хуже, и лучше употреблять оныя въ кормъ скотамъ, нежели въ пищу человѣческую. Тоже должно разумѣть и о бѣлыхъ внутри картофеляхъ, кой часъ преспанувъ они бывъ мучняны, и съ принятіемъ оспраго вкуса теряютъ свой мучняной или хлѣбной вкусъ. На бѣлыхъ карто-

шофеляхъ бывающъ и цвѣшны бѣлые. Желтые сначала вкусомъ бывающъ не худы, но со временемъ опчасу швердѣющъ, что шѣмъ скорѣе учиняется, чѣмъ желшѣе ихъ краска. Цвѣшны на шаковыхъ бывающъ красные или синѣе, и опчаси бывающъ они очень урожайны. Сѣ красными болшешою часшью шожо обспояшельсшво.

1) *Картофель сѣ сѣтлотемною или мяснаго цвѣта кожей*, бываешъ нѣсколько горбовашъ, и по мѣрѣ плодоносшя года и земли очень крупешъ. Урожай сего рода посредсшвенъ. Лисшы, сшдшщѣе на шешномъ одинакомъ сшсешлѣ, опшсшчашся сѣ нижеслѣдующимъ шпорымъ родомъ своимъ желшовашо-зеленымъ цвѣшномъ примѣшшо опъ всѣхъ поздносшѣющихъ родовъ.

2) *Картофели сѣ желтою кожей*, не сполько выходяшъ горбовашы, круглы и крупны. Кушты принсшсш въ разсшженш количесшва или числа плодовъ изобильнѣе, кои пришомъ мучнянѣе и вкуснѣе первыхъ. Но въ эшомъ родѣ ешъ шощъ порокъ, что плодъ во многѣе годы полшсашъ внутри черныя пшшна, кои шшовашы и шверды. Кромѣ сшхъ опшсанныхъ опъ Г. Симона лѣшшнихъ картофелей имѣешъ мы еще соршы, кои въ верхней Нѣмецкой землѣ не могутъ бышъ безъшзвѣсшны, потому что у насъ нахощашся во множесшвѣ, а именно:

3) *Англинскіе бѣлыя имѣютъ бѣлую* кожу и еще бѣлѣйшее мясо, которое муч-
яно и изъ всѣхъ картофелей вкусомъ
лучше; они урожайны, очень крупны, и
въ Августѣ уже поспѣваютъ. Могутъ
они въ самую осень въ землѣ оставаться,
послѣ чего долѣе удерживаютъ вкусъ
свой. Урожай оныхъ сколько хорошъ,
что на доброй землѣ отъ каждого куста
получается оныхъ по полугарнцу, а иног-
да цѣлой гарнецъ. Въ скудныхъ домо-
водствахъ, гдѣ въ варевѣ недостатокъ,
уже съ половины Іюля ощупываютъ ру-
ками, и крупные изъ земли вынимаютъ,
а прочіе оставляютъ отроспашъ, кои
къ исходу лѣта оказываются крупны.
Сіи картофели занѣскольکو лѣтъ пере-
шли къ намъ изъ Англіи, почему въ
нижней Нѣмецкой землѣ и называются
Англинскими.

4) *Красные, длинные, почкообраз-*
ные картофели, поспѣваютъ нѣсколько
позднѣе предшедшихъ сортовъ. У насъ
называютъ ихъ *воловыи рога*, по виду
своему, сходному къ рогамъ: урожай ихъ
не изобиленъ, хотя они и очень длинны
вырастаютъ. Есть и осенніе картофе-
ли шаковагожъ виду, но тѣ и другіе
должно счищать между подозрительны-
ми родами, пошому что салны и нѣ-
сколько горячаго оспраго вкуса, хотя
употребляющся охотно въ поварняхъ,
по-

потому что съ вареныхъ и сырыхъ легко слупляется съ нихъ кожа.

Б. *Осенніе картофели.*

Осенніе картофели опять различають на два рода вообще, изъ которыхъ одинъ и лучший родъ имѣетъ темную, а другой желтоватую кожу.

АА. *Осенніе картофели съ темною кожею.*

1) *Круглой, красной, гладко-кожей, малой родъ.* У сего не бываетъ одинакого толстаго и высокаго спвола, но слабой и низкой, изъ котораго близко отъ земли выходитъ много опраслей и малыхъ вѣшвей. Большая часть сихъ распѣтій въ плодоносные годы и на добрыхъ пашняхъ не цвѣтетъ. Этотъ родъ по долговременнымъ перемѣнамъ выраживается, такъ что поднесъ еще онаго у насъ мало. Надлежитъ оной въ число полезнѣйшихъ въ пищу человѣческую; но и въ немъ бываютъ выродки множественно, состоящие въ томъ, что многіе куски, кои на поверхносіи земли опличаются одинакими крупными спволами, внутри земли получаютъ множесиво жиловатыхъ корешковъ, на которыхъ виситъ чрезмѣрное число длинныхъ, тонкихъ, и глубокими глазками снабженныхъ плодовъ; почему оныя тщательно отбираютъ изъ сѣменныхъ картофелей.

2) *Длинные, гладкокожіе и крупные, которыхъ одинъ конецъ остръ,*

а другой тупѣ. Цвѣтъ кожи сихъ очень шменѣ. Они вообще кажутся плоско сдавлены, и по сходству своему на ткашской челнокъ въ верхней Нѣмецкой землѣ называющіеся челноковыми карпофелями, а у насъ по сказанному выше въ Но 4. воловьѣ рога. Глазковъ у нихъ мало, и шѣ лежатъ почти наравѣ съ поверхностною; въ кожѣ разваривающіеся водяно, лучше варить ихъ облупивъ кожу. Почему оные всегда чистящѣ сырые, и употребляющѣ въ приправу кушенья. Поелику приносятъ они мало цвѣтновъ и сѣменныхъ булавицъ, а при томъ вообще не плодовины, то должно ихъ садить больше къ употребленію челоуѣческому, нежели въ кормъ скотамъ.

3) *Шероховатую кожу имѣющіе, круглые, краснотелные.* Въ верхней Нѣмецкой землѣ называютъ ихъ Доннерсбергскими, по тому что водящѣ оныхъ множественно въ Доннерсбергѣ съ окрестностями. Бываютъ они очень крупны, множествомъ на корнѣ, глубокихъ глазковъ на себѣ имѣющѣ мало, и отличающіеся весьма предъ прочими родами плодovitостію. Они имѣютъ высокіе, толстые, темнаго цвѣта стволы, опускающіе много побочныхъ отраслей. Цвѣтутъ сильно, и въ плодовиные годы на добрыхъ земляхъ завязываютъ много плода. Вкусъ оныхъ въ невыродившемся состояніи очень хорошъ, и
когда

когда варятся въ кожѣ, бывають очень мучняны; однакожь они выраживаются тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ ними сажаятъ другіе роды каршофелей, тогда чрезъ чешыре или лѣтъ пять совсѣмъ въ обыкновенный шѣхъ мѣстѣ плодъ: доказательство, что расшѣнія сїи по естесву своему склонны болѣе другихъ родовъ расшѣній принимають оплодотвореніе отъ другихъ своихъ породъ и перераживаются.

4) *Шероховатую кожу имѣющіе, темнокрасные, какъ бы сплюснутые, большею частью продолговатые.* Въ Рейнландской округѣ называють оныя Генсбергскими, чаятельно по тому, что въпервыхъ получены изъ мѣста сего названія въ нижнемъ Элзасѣ. Стволъ прямой бывають толсты, шемень, высокъ, и получають мало побочныхъ отпрысковъ, но много цвѣтущихъ и корней. Плодъ эшопъ по содержанію доброты земли въ сравненіи къ другимъ бывають несравненно крупнѣе (исключая вышеописанные въ № 4, Англическіе каршофели,) и предъ всѣми родами каршофелей, кромѣ скопскихъ каршофелей, приносятъ изобильнѣйшій урожай. Когда эшопъ плодъ разрѣзаетъ, оказываются въ немъ красныя пятна, какъ бы пламень, чего нѣтъ во всѣхъ родахъ, досель описанныхъ. Осенью они бывають по самое 20 Февраля вкусомъ нѣсколько суровы, съ сего же времени чрезъ все лѣто до са-

мой жашвы вкусомъ и прочностію превосходящъ всѣ роды картофелей. Плодъ эпомъ въ землѣ главный свой ростъ получаетъ съ 24 Августа по Октябрь. Почему не должно сажать онаго въ полѣ, потому что въ эпомѣ случаѣ въ разсужденіи пашвы скоша картофели заранѣе должно выкапывать.

Эпомъ родъ, гдѣ сажаютъ шотландскіе или Американскіе картофели, перерабатывается всего скорѣе, и такимъ образомъ, что на цѣлыхъ десятинахъ, онымъ засаженныхъ, бываешь не видно ни одного цѣльнаго и невыродившагося куста.

ББ. *Осенніе картофели съ желтоватою кожею.*

1) *Совсѣмъ круглые*, подобны почти во всемъ второму роду лѣтнихъ картофелей; въ томъ лишь только отъ нихъ отличаются, что имѣютъ зеленоватой шволъ, которой по длинѣ своей въ трехъ или чешырехъ мѣстахъ сходяща острымъ ребромъ, и свѣтлозеленые нѣсколько сморщившіеся листы.

2) Второй родъ имѣетъ *гладкую очень желтую кожу*, большею частью продолговатъ, оспаеется дробенъ, а по свареніи внутри пѣгой и твердъ.

3) Третій родъ состоитъ въ такъ называемыхъ *шотландскихъ картофеляхъ*. Называютъ же оныя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ *Американскими*, новыми или *Англин-*

Англинскими, дикими, воловьими, свиными картофелями, и земляными грушами.

Еще бы надлежало въ это опродіе включишь *бѣлые тонкокожіе* такъ называемые *сахарные картофели* (или суповые картофели), но оныхъ ко всеобщему вожденію препоручать не можно, хотя они и всѣхъ лучше вкусомъ, но не всякому полезны шѣмъ, что рѣдко выходяшъ крупны и урожайны, требуютъ опмѣнно доброй земли, а сверхъ того выкапывашъ ихъ трудно.

Теперь долженъ я въ особливости упомянуть о томъ родѣ картофелей, копорыхъ разводъ въ Рейнскихъ и сосѣдственныхъ къ нимъ странахъ, а опчаси и у насъ, предъ всѣми прочими родами былъ сполько неудачливъ. Оной есть вышеупомянутые въ № 3. такъ называемые *скопскіе картофели*, кои не прежде 1770 года извѣсны сшали, и какъ не безъ вѣроятности утверждаюшъ, въ это время непосредственно изъ Америки въ Нѣмецкую землю вывезены, почему и прозваны Американскими картофелями. Они по опмѣнной своей крупности въ началѣ доспались въ руки многимъ изъ моихъ знакомыхъ здѣшной округи, но кои по нѣсколькихъ годахъ вожденіе оныхъ бросили, и принуждены были для сѣмянъ выписывашъ свѣжіе невыродившіеся картофели издалека. Я шравы ихъ еще не видывалъ самъ,

а потому прилагаю описаніе Г. Симона. Трава сего расшѣнія, говоритъ онѣ, или листы, вѣшви, самой спволѣ, крупнѣе, нежели на всѣхъ извѣстныхъ поднесъ родахъ картофелей. Спволѣ бываетъ также съ шрема и чешырьма тонкими ребрами свѣрху до низу и свѣшлозеленѣ; спволы же у всѣхъ прочихъ родовъ бывающъ темны, кромѣ описаннаго подѣ буквами Б. Б. вѣ Но 1, кошорый много кѣ сему сходсшвуешъ, но шолько шверже и дровянишѣе. Листы на немъ также свѣшлозелены, но большею частію съ желшовапозелеными пашнышками, величиною съ сочевичное зерно; на поверхности у взрослыхъ расшѣній нѣсколько морщиновашы и шероховашы, оспровашы кѣ концу, и опчашы сходны кѣ листамъ сырея.

Цвѣшъ сего расшѣнія во всѣхъ своихъ непремѣнныхъ частяхъ совершенно сходенъ съ цвѣшами всѣхъ извѣстныхъ донынѣ родовъ. Одна шолько коронка его бѣловашѣе и съ фѣолешовою опшѣнкою. Изъ цвѣша вырастаетъ много сѣменныхъ головицъ, кошорыя шягосшю своею спволѣ почти совсѣмъ кѣ землѣ приклоняющъ, такъ что на доброй землѣ не многіе изъ нихъ удерживающъся прямо.

Шлодъ сего новаго расшѣнія вѣ началѣ, какъ намъ знаемъ спалѣ, былъ несказанно крупенѣ, такъ что у нѣкошорыхъ на доброй землѣ вырощенный урожался до двухъ фуншовъ вѣсомѣ. Но давно уже шруд-

шрудно сыскать шаковой крупной, и кажешся, что онъ съ году на годъ мѣлѣетъ. На многихъ ошдѣленныхъ корневыхъ булавахъ присаживается множесиво побочныхъ выросшковъ, подобно новымъ булавамъ, что сообщаетъ имъ онъ прочихъ родовъ совсѣмъ ошличный видъ. Внутри сїи плоды, на тучной землѣ сидѣвшіе, при разрѣзаніи оказывающъ на себѣ красный пламень, но на песчаныхъ и худощавыхъ земляхъ ростшіе бывающъ бѣлы или желтоваты. Вкусъ оныхъ прѣсенъ, сладковатъ и суровъ. Последнее больше оказываешся въ ростшихъ на тучной землѣ, однакожъ по нѣсколькихъ лѣтахъ примѣтили въ нихъ удобреніе вкуса и нашли, что какъ на добрыхъ, такъ и худощавыхъ земляхъ соразмѣрно они предъ прежнимъ поправились. Впрочемъ они плодовище и урожайнѣе всѣхъ прочихъ родовъ.

Въ кормъ рогатому скоту, по ихъ остротѣ, должно давать съ осторожностію, не по многу вдругъ, и съ мякиною или рѣзкою смѣшавъ. Безъ этой предосторожности и въ излишнемъ кормленіи легко приключаютъ они рогатому скоту вонючіе и опасные поносы. Нѣкопорымъ скопамъ они и совсѣмъ не здоровы, а подобно молодой дятловинѣ приключаютъ надмѣніе. Поросята свиньи онъ сего корму легко подвергаются опасности выкинуть, что вразумительно по острой и щекопящей суровости сего земляного пло-

да. Вообще свиньи, кормимыя одними си-
ни картофелями, испускающъ изъ себя
чрезмѣрное множество урины, такъ что
хвѣстовъ ихъ не можно удержатъ въ сухомъ
состояніи. —

Чрезъ сѣи скопскіе картофели, какъ
выше упомянуто, произошли совершенные
выродки отъ прочихъ картофелей, кото-
рыхъ главное состояніе вышесказанный пи-
сатель описываетъ шаковымъ образомъ:
изъ кажущихся наружно здоровыми, са-
мыхъ совершеннѣйшихъ и толстыхъ кар-
тофелей (я говорю здѣсь о первомъ по-
явленіи сихъ выродковъ изъ настоящаго
добраго сорту, ибо послѣ сего времени
во второмъ и третьемъ степени выродив-
шійся плодъ былъ уже очень примѣненъ)
всякаго рода, исключая скопскіе карто-
фели, вырастающъ ежегодно и на вся-
кихъ земляхъ нынѣ уже зараженныхъ, въ
большемъ или меньшемъ количествѣ, ша-
ковые кусны, коихъ наружный видъ даже
 незнамоу показывается, что есть по
неудавшееся и выродившееся растѣніе.
Стебель кусновъ различается почти отъ
всѣхъ прочихъ родовъ, издавна извѣ-
стныхъ картофелей тѣмъ, что имѣетъ
на себѣ темнозеленую, какъ бы смѣшан-
ную краску, содержащую въ себѣ какъ бы
посредство между краски тѣхъ стволо-
въ картофельныхъ и стволо-въ скопскихъ
картофелей. Сверхъ того стеблы сѣи,
а именно въ первомъ выраживаніи, быва-
ютъ

ютъ всегда однобылые, и вообще все растѣніе съ самаго всходу описываетъ въ ростѣ предъ прочими добрыми кусами. Листы на нихъ имѣютъ поверхность не столько гладкую, какъ на прочихъ давно извѣстныхъ картофеляхъ, но шероховатые, морщиноватые, худощавые, кудрявые и свернувшись. Оные бываютъ близки къ стволу, и сидятъ не на соразмѣрномъ черешкѣ, но почти приросли къ стволу. Цвѣтъ оныхъ не темноватъ или темно-зеленъ, какъ листовъ испари вывезенныхъ картофелей, но какъ особливо смѣси разныхъ красокъ, такъ что по темно-зеленому есть свѣтлозеленыя и желтозеленыя пятна. —

За нѣчто особенное считатьъ должно, какъ въ выродившихся картофельныхъ растѣніяхъ очевидность показываетъ, что и все внутреннее сложеніе сего растѣнія не правильно, и что естественные пути къ круговращенію, также всасываемые и извергаемые влажности соковъ, коимъ растѣнія питаются должно, состоятъ въ нихъ меньше, какъ въ надлежащемъ порядкѣ и размѣрности. Отъ сего почасу находятъ въ нихъ спержень, какъ бы заржавѣлый и высохшій, даже въ самыхъ всходахъ. Отъ сего-то происходитъ сморщиваніе, коржавые и дробные растѣнія, кои очень рано осенью желтѣютъ, и въ самое то время умираютъ, когда сильнѣйшій ростъ плода въ землѣ происходитъ долженъ.

женъ. Знаюки природы по сему не удивятся, что плоды сихъ неудавшихся растѣній оспаются очень дробны: бываеиъ оныхъ шолько по два, а очень рѣдко по три отъ одного куста, также къ употребленію въ пищу жесткихъ, и слѣдственно неудобныхъ. Самая наружная кожа шаковыхъ плодовъ бываеиъ оплична: опчаси выходииъ оная темна, часью же блѣдножелта на одной булавицѣ, а не рѣдко обѣ сѣи краски какъ бы сплывшіяся. Опыны и очевидность научаиъ, что главнѣйше бываеиъ при особливыхъ класса сихъ выродившихся картофельныхъ растѣній.

Первый родъ изъ вышеописаннаго выродившагося растѣнія и соспавляетъ первый степень выродка. Никогда на правѣ его цвѣшовъ не примѣчено. Причина сего можетъ заключаться въ весьма разрушенной организаціи растѣнія, которое претписивуетъ сему рано замирающему растѣнію цвѣшы произвестъ.

Второй родъ произходииъ отъ глазка или зародыша ростковаго булавицы картофельной перваго рода, и соспавляетъ второе поколѣніе сего выродка. Это опродѣ получаетъ уже опашь больше силъ къ росту, и какъ бы нѣкое опдаленное плодосіе. Въспо одинакаго спвола, каковъ бываеиъ въ первомъ, оказываеиъ на немъ спволъ съ побочными опраслями. Видъ и краски листовъ оспаются хошя одинаковы, однако же бываеиъ на немъ листовъ
боль-

больше, и имѣющихъ при томъ здоровѣйшую краску. Многочисленныя углубленія и возвышенности оныхъ дѣлаются также примѣшнѣе, отъ чего и бывающъ они очень кудрявы и далеко не столько свернувшіяся, каковы были въ прошломъ году. Изъ сего роду нѣкоторые кусты уже цвѣтущъ, однакожъ несравненно въ меньшемъ числѣ и въ самые лучшіе годы. Почему большая часть изъ сего роду выходитъ изъ числа выродившихся первыхъ и слѣдующаго третьяго поколѣнія.

Третій классъ состоитъ изъ такихъ выродившихся растѣній, кои отъ предшедшаго втораго рода уже болѣе къ коренному или матернему своему виду склоняются, и цвѣтомъ также и прибавляющимся плодоносіемъ больше сходятся. Одни только кудрявые и узкіе близко къ стволамъ сидящіе листья и совершенно темные цвѣтомъ стволы отличаютъ ихъ еще. Въ прошломъ году имѣлъ я случай описать это въ особенности замѣшнѣе. До разцвѣтанія были они больше близки къ выродамъ, нежели послѣ сего времени; ибо послѣ цвѣту своего пошли они въ свой ростъ несказанно скоро, и казалось что листья ихъ и всѣ кусты очевидно распросирались, и къ первобытнѣе своему несказанно близко возвращались, также и плоды дали довольно крупны.

Хоша

Хотя же въ Рейнскихъ окрестностяхъ со времени вывозу въ 1770 году скопскихъ или Американскихъ картофелей и примѣченъ вырождаи и неурожай во всѣхъ прочихъ добрыхъ картофельныхъ родахъ, однако произошло это съ особливомъ опличіемъ, что въ одномъ сортѣ зло сіе многочисленнѣе появлялось, и скорѣе распространялось, нежели въ другихъ. Въ числѣ перваго были многоцвѣтныя картофели, въ числѣ же послѣднихъ мало цвѣтущіе оныхъ роды, а именно, пошому что выраживаніе посредствомъ сѣменной пыли распространялось, послѣдніе же роды оною меньше и медленнѣе заражались. Но сіе обстоятельство очень примѣчанія достойно, что и въ нововывезенныхъ Американскихъ картофеляхъ это выраживаніе такъ же оказалось, пошому что посажены оныя были на одномъ полѣ.

Что же выраживаніе добрыхъ картофельныхъ родовъ Рейнландцы единственнo выводили отъ Американскихъ картофелей, это изъ того ясно видимо, что во многихъ мѣстахъ, въ городахъ и деревняхъ, въ коихъ Американскихъ картофелей еще не знали и не садили, долѣе пощажены были отъ таковыхъ неурожавъ, нежели ихъ сосѣди, имѣвшіе сіи картофели, пока наконецъ вся сторона отъ заведенія сихъ новыхъ картофелей вырождкою старыхъ ихъ картофельныхъ родовъ наказана была.

Это

Это самое зло, къ предупрежденію или отвращенію котораго правительсва въ верхней Нѣмецкой землѣ полезныя узаконенія издали, угрожаетъ самымъ шѣмъ же Нижнюю Нѣмецкую землю; попому что многіе Хозяева онѣ путешествующихъ своихъ пріятелей получили сіи Американскіе картофели за нѣкую рѣдкость, а они бывъ привлечены необычайною ихъ величиною, весьма щцательно начали прилѣпашъ къ ихъ разводу; и хотя они въ слѣдствіи вкусъ оныхъ нашли меньше пріятенъ, нежели старинныхъ картофельныхъ родовъ, но продолжаютъ водить оныя для корму скопины и спола служяго, по крайней мѣрѣ въ смѣси съ другими старинными родами. Я увидѣлъ впервые Американскіе картофели за шесть лѣтъ предъ симъ, когда одинъ возвращающійся изъ верхней Нѣмецкой земли и въ Мекленбургѣ живущій ремесленникъ имѣлъ оныхъ два чрезмѣрной величины, и хотѣлъ отвезти оныя домой. Когда этомъ проѣзжій показалъ ихъ мнѣ и другому до новостей склонному Хозяину, принужденъ ихъ былъ уступитъ ему за хорошую цѣну. Онъ разрѣзавъ ихъ на сколько кусковъ, сколько было глазковъ, въ слѣдующую весну посадилъ, и когда выросли, обѣщалъ и мнѣ дать на заводъ; въ этомъ гдѣ получилъ онъ ихъ нѣсколько мѣрокъ, кои всѣ употребилъ въ посадку, а попому уже началъ дарить своимъ добрымъ пріятелямъ онѣ
сихъ

сихъ по своей величинѣ и опмѣнному плодородію столько удивительныхъ картофелей. Какъ я его чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того увидѣлъ, сказалъ онъ мнѣ о сильномъ размноженіи своего новаго плода, присовокупивъ къ тому, что оныя по худому вкусу своему на господской столѣ не годящіяся, но въ кормъ скотамъ опмѣнно хороши, и что когда я посѣщу его, могу отъ него получить по обѣщанію. Но какъ мнѣ опять чрезъ нѣсколько лѣтъ бытъ у него не удалось, узналъ я между тѣмъ о произшедшемъ великомъ неурожаѣ старинныхъ картофельныхъ родовъ, вошедшемъ со времени введенія сихъ Американскихъ. Тогда посѣпилъ я помянутого моего пріятеля, который тотчасъ началъ жаловаться о выраживаніи и великомъ неурожаѣ старинныхъ картофельныхъ родовъ, чему и самъ не зналъ причины. Я спрашивалъ у него, что получившіе отъ него на заводъ Американскіе картофели также ли жалуются на неурожай старинныхъ своихъ картофелей; онъ отвѣчалъ, что сїи картофели по нынѣ давалъ лишь такимъ людямъ, кои послали ихъ вдаль въ подарокъ, и что одинъ лишь изъ сосѣдей его получивъ ихъ посадилъ, но недавно началъ очень жаловаться на неурожай старинныхъ своихъ картофелей. Я подаль обоимъ имъ совѣтъ, чтобъ Американскіе картофели водить перестали, достали бы на сѣмена изъ другихъ

гихъ мѣстѣ старинныхъ не выродившихся картофелей, и посадили бы ихъ на новомъ мѣстѣ, гдѣ Американскіе или скопскіе картофели опнюдѣ не были сажаемы.

Естьли же во всей округѣ всюду найдяся одни выродившіеся картофели, и на сѣмена не можно получитьъ хорошихъ, остаешся только два средства къ поправленію, а именно: выбирать на сѣмена лучшіе картофели къ посадкѣ, и вырощать сѣмена отъ булавицѣ.

Выше описаны сорты больше и меньше зараженныхъ картофелей, почему должно отбирать къ саженію булавицы тѣхъ кустовъ, кои меньше заражены. Припомѣ же разсматривать лисы и стволы возшедшихъ картофелей по вышеописаннымъ признакамъ, и имѣющіе кудрявой листъ, какковыя въ верхней Нѣмецкой землѣ *дураками* называющъ, выдерживать, а пусыя мѣста засаживать бобами, рѣпою, брюквою и капустою по состоянію земли.

Разводъ сѣмянъ картофельныхъ совѣтовалъ уже за нѣсколько лѣтъ умершій Профес. *Сандеръ*, чрезъ что можно завести новыя и незнакомыя опродія. Поселику выводилъ онъ худобу плодовъ отъ вырощиванія, и разводъ оныхъ отъ сѣмянъ считалъ за вѣрное и легчайшее средство къ предваренію дальнѣйшаго распространенія зла, и сохраненію сей важной отрасли пропитанія; шо преподавалъ онъ въ Карлсруэскихъ еженедѣльныхъ листахъ въ

№ 11. 1780 года, слѣдующее наставленіе: ---
 Должно нѣсколько картофельныхъ ку-
 шовъ въ огородѣ или въ полѣ оставить
 единственно къ тому (въ полѣ должны
 сіи сѣмянные кусты бысть удалены отъ
 другихъ картофельныхъ нивъ, а особливо
 на копорыхъ естъ Американскіе картофе-
 ли, или выродившіеся), чѣмъ они цвѣли
 и сѣмена принесли; беречь ихъ, и охра-
 нять отъ поврежденія цвѣшны. (Къ сему
 намѣренію еще лучше посадить въ отда-
 леніи отъ другихъ картофельныхъ пашенъ
 небольшое дѣло булавицъ, кои неподозри-
 тельны заразою, чѣмъ единственно отъ
 нихъ сѣмена получить; а притомъ какъ
 не всѣ роды хорошо цвѣшутъ, то лишь
 таковаго роду, кои сильно цвѣшутъ.
 Осенью, пока еще не наступятъ морозы,
 собравъ сѣмянные головки, и повѣсивъ
 въ тепломъ покоѣ до шѣхъ поръ, какъ
 размякнутъ или совсѣмъ сгніютъ; тогда
 въ посудинѣ, наполненной водою, переми-
 рать ихъ до шѣхъ поръ, какъ сѣмена всѣ
 на дно упадутъ. По свѣрху плавающее бѣ-
 ловатое сочное вещество переливать изъ
 блюда въ блюдо, пока сѣмена изъ онаго
 опадѣются; послѣ чего высушить ихъ на
 сѣрой бумагѣ. Сѣмена сіи бывають гора-
 здо дробнѣе сочевичныхъ зеренъ, ямочекъ
 на себѣ не имѣютъ, и цвѣтомъ блѣдно-
 желты. Не рѣдко сѣмянные головки или
 яблоки сами сваливаются на землю, и сѣ-
 мена попавъ въ оную, выдерживають зиму,

а весною всходятъ. Между шѣмъ, какъ
растѣнія сїи у насъ ежегодно замираютъ,
нѣтъ нужды сѣмянъ сихъ сѣять прежде
весны. Землю подъ оныя должно хорошо
прѣугошовить и умѣренно изнавозить. Не
худо еще съ осени навозъ въ землю поло-
жить. Сѣмена должно глубоко закапывать,
на примѣръ глубже, нежели самыя дробныя
селлерейныя и тому подобныя; пошому
что въ первое лѣто не лзя еще будетъ
по обыкновенію землю вокругъ вскапы-
вая къ сѣволамъ пригребать. Лучше же
ихъ сѣять рѣдко, нежели часпо; ибо впро-
чемъ корни и сѣволы будутъ дѣлать другъ
другу препятствіе. Осенью можно уже
первыя картофели выкапывать, по мень-
шей мѣрѣ самыя крупныя, отъ чего остав-
шіеся лучше распространятся. Первыя
булавицы бывають величиною въ грецкой
орѣхъ, и могутъ употреблены быть въ
кормъ безъ толченія. Сего росшу пугаться
не надлежитъ; съ каждымъ годомъ будутъ
они вырастать крупнѣе. Булавицы будутъ
на другой годъ съ среднвенную дулю ве-
личиною, а въ третій годъ достигнутъ
полнаго росу и выдутъ очень красивы
видомъ. Выкопанными булавицами въ слѣ-
дующій годъ можно другое мѣсто заса-
дить. Съ нѣсколькихъ сажень можно до-
вольно получить картофелей на сѣмена.
Однако ни старыхъ, ни новыхъ картофе-
лей не должно садить шѣсно въ намѣреніи
шомъ, чшобъ больше получить приплоду;

навѣрно получишь меньше, ежели посадишь шѣсно. Не должно же хранишь картофелей во влажныхъ погребахъ, отъ чего они хотя бывающъ вкуснѣе, но лучше держащъ ихъ въ сухомъ мѣстѣ. —

Выше мимоходомъ сказано, что не худо не сажашъ картофелей на одномъ мѣстѣ почасу сряду, что за главное правило въ разсужденіи плода сего замѣчается. Правда и то, что есль нѣкопторыя растѣнія, кои ежегодно на одномъ мѣстѣ съ выгодою садить можно, какъ - то лукъ, бѣлую капусту и проч. какъ - то въ здѣшнихъ мѣстахъ первой бываетъ самой крупной во всемъ Маркѣ Брандбургскомъ, а бѣлая капуста Линшовская по сосѣдству здѣсь самая рослая изъ всей Саксоніи, и кои съ непамятныхъ временъ сажающся на одномъ и томъ же мѣстѣ; однако опытъ научающъ въ разсужденіи многихъ другихъ плодовъ земныхъ, а особливо картофелей, что они крупнѣе и множественнѣе родятся, когда посадка ихъ чрезъ нѣсколько лѣтъ на то же приденъ мѣсто. Гдѣ землю подъ нихъ вскапывающъ заступомъ, тамъ скорѣе можно садить ихъ на томъ же мѣстѣ; но гдѣ оную пашущъ, тамъ надлежитъ выжидать вдвое, есльли не хотѣшь даже въ самые плодоносные годы прешерпѣть на нихъ неурожаю.

Что же также выше сказано, что копанная земля больше приноситъ картофелей, нежеди паханная, но многіе Хозяева

на своихъ обширныхъ поляхъ картофели для скопа въ великомъ множествѣ сажашъ, а къ тому землю не копають, но за недоспашкомъ времени отъ другихъ полевыхъ работъ только просно пашутъ, и что оное съ большею и меньшею пользою происходишь можеть; потому намѣренъ я здѣсь вписать картофельное земледѣліе одного практическаго писателя, потому что оное во многихъ сѣранахъ еще совсѣмъ незнакомо, а и того меньше введено. Писатель этошъ Г. Бергенъ, которой свое земледѣліе картофельное описываетъ таковымъ образомъ:

Предположивъ, что послѣ картофелей рожь сѣютъ, и для того пашню, по причинѣ зимнихъ влажностей съ осени вспахивають, разумѣется, что для картофелей оную перепашать должно, и сію предвѣдущую работу по оному учреждать надлежитъ. Мой способъ состоитъ въ киданіи картофелей за сохою въ борозду, а не такъ, какъ въ Саксоніи и можеть быть въ другихъ мѣстахъ употребительно. Съ тремя пахарями и чепырьми садильщиками засаживаю я очень легко въ день чепыре упря земли Магдебургскихъ (съ небольшимъ десятина съ четвертью), чего по Саксонской или другой методѣ учинить не можно. Сохи становятся рядомъ, и ведутъ узкіе въ три или чепыре вершка шириною борозды, такъ что въ каждой проходѣ захватили онѣ земли вершковъ двенадцать: таковое

пространство именно должны имѣть между собою ряды каршофельные. Изъ четырехъ садильщиковъ каждой занимаетъ свое мѣсто по длинѣ десятины, и позади послѣдней сохи, когда она его минуетъ, кладетъ каршофели въ опверзшую борозду. Таковымъ образомъ сохи ходятъ, а садильщики управясь на одномъ концѣ десятины, переходятъ на другой, а по срединѣ десятины лежатъ запасные каршофели въ мѣшкахъ, сколько нужно оныхъ къ засаженію мѣсна. Однакожъ каждому садильщику должно имѣть на свою часъ, сколько нужно, чтобъ за оными не бѣгать. Таковымъ образомъ сохи безпрестанно дѣйствуютъ, садильщиками не задерживающа, и вспахивающа столькожъ, какъ бы и саженья не происходило. --- Возьмемъ, на примѣръ, учаспокъ земли въ 40 сажень длиною. Каждой садильщикъ займетъ изъ нихъ десять сажень. Первой съ конца загона шамъ, гдѣ начинается паханіе, онъ управяется работою своею, между тѣмъ какъ соха идетъ вверхъ, и давно готовъ бываетъ, когда она заворачивается назадъ; равно перешедъ на другой конецъ загона, управяется онъ въ началѣ другой борозды, пока сохи оную проведутъ. Таковымъ же образомъ и прочіе садильщики на своемъ разстояніи каждой. — Если паханіе производится плугами, то нужно, чтобъ по крайней мѣрѣ передней плугъ запряженъ былъ волами, или когда оныхъ нѣтъ,

нѣтъ, то бы по бороздѣ идущая лошадь была не подкована; ибо впрочемъ при завершѣ плуга назадъ лежащіе обнаженно въ первой бороздѣ картофели будутъ раздавлены, загниютъ и не взойдутъ. Однакожъ многое зависитъ отъ садовника, и рачительные, а при томъ душою и шѣломъ здоровые работники, могутъ сему способствовать, вдавливая ногою брошенный картофель въ сторону цѣлой земли, или бока борозды, куда впряжной скотъ обыкновенно не спускаетъ. (Таковымъ людямъ должно и то наблюдать умѣть, что выше сказано о надлежащемъ разстояніи сѣмянныхъ картофелей, что именно когда оныхъ нѣсколько вмѣстѣ ляжетъ, чтобы не оставляли оныхъ соприкнувшись, но раздвигать, къ чему въ особенности способно имъ употреблять ногу.) Нѣтъ собственно въ томъ нужды, чтобы картофели ложились точно въ разстояніи девяти или двенадцати вершковъ, или на какое угодно пространство по длинѣ борозды; нужно только на то взиравъ, чтобы разстояніе это не слишкомъ сблизить или бы разтянуть, то намѣреніе почти достигнуто. Множайшая въ этомъ точность потребуетъ и множайшаго времени. (Однакожъ очень хорошо, когда садовники будутъ имѣть предъ собою вѣрной глазомѣръ, чтобы всюду сближеніемъ картофелей роспу ихъ помѣшательства не сдѣлалось, а разтянутіемъ мѣры не захвачено

было безъ нужды земли. Удобнѣе къ сему опредѣлять еще человѣка съ старыми граблями, у коихъ бы только на концахъ были зубья, и чѣмобъ онъ ими шедъ по бороздѣ зачерчивалъ разстояніе, гдѣ класъ картофели.)

Вспаханная шаковымъ образомъ бородами земля оспаивается лежать до шѣхъ поръ, когда съ навозомъ прошлаго года вывезенныя, или собственно шущъ находившіяся сорныя травы вмѣстѣ съ картофельною шравою взойдутъ: тогда при ясной погодѣ, и особливо на глинистой землѣ, желѣзною бороною и всегда двоекрашно въ двѣ бороны заскораживающъ. Не должно опасаться, чѣмобъ плоды повреждены были ошъ поврежденія ихъ травы, и либо бороною выворочены, или землею заворочены. (Не лзя сказать собственно, чѣмобъ выдергиваніемъ и разрушеніемъ травы плодъ не былъ ослабленъ, чѣмъ очень примѣпно на срѣзываемыхъ кускахъ прежде времени въ кормъ скопинѣ, и для того дѣйствіе это не всякому Хозяину понравится, а пошому будетъ онъ держаться копанія, послѣ копорого меньше сорныхъ травъ вырастающъ. Но какъ въ картофельномъ земледѣліи, великимъ количествомъ происходящемъ, людскими руками сего управить не можно, и паханіе необходимо, шю этошъ образъ можно производить только въ маломъ дѣлѣ, да и въ маломъ количествѣ производя избирать

расть на сѣмена каршофели крупные, когда праву ихъ выдергивашъ или разрушашъ, чтобъ были они въ силахъ опять опшпущишь праву и спволы.)

Теперь слѣдуетъ обкапываніе или пригребаніе земли къ растѣніямъ, которое довольно знакомо и во всѣхъ мѣстахъ руками производися. Но меньше извѣстно, а можетъ и совсѣмъ незнакомо, что сїю дорогую и ошягошительную работу удобно производить гораздо дешевле, легче и намѣренію совершенно соотвѣпствующимъ образомъ. Скопы именно должны снйашъ сїю работу на себя, шакъ какъ вообще они опправляющъ всѣ шяжелыя работы въ домоводствѣ; а потребна къ сему одна лошадь съ сохою: лишь должно ея управляшъ шакъ, чтобъ по намѣренію выше или глубже сошникъ пускашъ въ землю, и шѣмъ больше или меньше земли приворачивашъ къ растѣніямъ. Обсыпаніе происходитъ на обѣ стороны вдругъ, почему должно накладывашъ двѣ полицы, или дѣлать особливую двойную полицу, которая бы взрѣзываемую сошниками землю на обѣ стороны валила. Впрочемъ безъ сего учрежденія промежъ двенадцати вершковой должно будетъ сохою въ обыкновенномъ ея учрежденіи проходить два раза, чтобъ землю на обѣ стороны къ растѣніямъ привалишъ: понеже въ этомъ устроеніи соха противъ воли пашущаго забираетъ глубже въ землю, шо слабая,

безсильная лошадь дѣйствія сего совершить не можешь. Сверхъ того должно ей быть къ сохѣ привычной, почему между рядовъ зеленой картофельной правы пойдешь она сполькожъ исправно, какъ близъ открытой борозды; непривычную же лошадь не могъ я провести больше двухъ разъ.

Что впрочемъ шестнадцать или двадцать работниковъ едва совершить могутъ, исполняешь въ этомъ случаѣ одна лошадь и одинъ работникъ. Наемнымъ или непривычнымъ къ этому дѣйствію должно прибавить охоты прибавкою овса и пива; тогда будешь имѣть удовольствіе ежедневно видѣть болѣе половины десятины обработанной въ той же добротѣ, какъ управляютъ человѣческія руки мотыкою, отъ одного работника съ лошадью.

Подобно производимому вскапыванію руками производися оное и сохою двоекратно. Въ первой, разъ, когда картофельная права выроснетъ едва въ три вершка; а впорично, когда выроснетъ оная вершковъ шести. Опытъ научаетъ, что плоды тѣмъ бывають крупнѣе, чѣмъ больше будутъ накрыты землею, или оная пригребена къ спволамъ. Хотя приваливаніе земли сохою, когда пускается оная въ первой и впорой разъ равною глубиною, можешь и въ одинъ разъ на рыхлой землѣ совершенно быть; но безъ по-
впо-

вторенія паханія намѣреніе въ изстребленіи постороннихъ травъ достигнута не будетъ, а еще должайшимъ ошдохновеніемъ росу ихъ воспоспѣшествуется; ибо, когда сажаніе картофелей происходитъ въ исходѣ Апрѣля, то первое окапываніе производится въ началѣ Іюня, а второе въ началѣ Іюля; выкапываніе же картофелей въ Септябрѣ. Когда опмѣнишь работу вторичнаго обкапыванія, то постороннимъ травамъ къ опроснанію прибудетъ цѣлой мѣсяцъ, а вообще цѣлая четверть года. Сверхъ того и работнику легче будетъ произвестъ то въ два раза, что въ одинъ разъ совершишь въ самомъ дѣлѣ трудно. (При семъ напомнимъ должно, что къ дѣйствію окапыванія сохою потребенъ еще работникъ съ руками, которой бы травы, близъ кустовъ картофельныхъ растущія, и коихъ соха не захватишь, рукою или крюкомъ выдергивая, клалъ къ споронѣ.)

Еще должно наблюдать одну выгоду въ разсужденіи сажанія картофелей, которая по состоянію погоды и пошвы земли ростъ плода сего очень ускорить можетъ, въ сравненіи съ другимъ мѣстомъ, гдѣ дѣйствія сего не произведено. Состоитъ она въ томъ, чтобъ картофели предъ посѣвомъ нѣсколько проросши въ тепломъ погребѣ, или въ теплой избѣ, отъ чего они нѣсколькими недѣлями ранѣ пойдутъ въ стволы, и тѣмъ очень укрѣплятся. Нерѣдко около обыкновенной поры сажанія картофелей

мо-

можетъ господствовать мочливая погода, что ни пахать, ни копать будетъ не можно, и принуждено ожидать, пока земля обсохнетъ, въ особливостижъ естли мѣсто случится низменное; можетъ также въ Апрѣлѣ и холодная погода продолжашься, которая всходъ и роснѣ раснѣній задерживаетъ; можетъ и земля сама по себѣ быть такого холодного свойства, что на ней всякія раснѣнія нѣсколькими недѣлями позднѣе изъ земли выходятъ; наконецъ можетъ случиться, что за другими полевыми работами опоздаешь, и картофели посадить въ надлежащее время не успѣешь: во всѣхъ таковыхъ случаяхъ чрезмѣрно выгодно пророцать картофели предъ посадкою, и шѣмъ ускоряшь ихъ всходомъ. Я неоднократно видалъ даже на теплыхъ пашняхъ, что посаженные картофели лежали въ землѣ по три и четыре недѣли, пока пустили траву. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣтъ иной земли, кромѣ пучной и связной, которая, естли непосредственно послѣ паханія упадетъ дождь, а попомъ сдѣлается сухмень, таковую получаешь на себѣ швердую скорлупу, что картофельная трава оной пробить и выдраться не можетъ. Такъ было въ 1783 году съ шѣми полями, на которыхъ картофели шестою долею позднѣе выдрались, а прочіе едва въ Іюнѣ послѣ случившагося дождя появились, и опъ того произошелъ великой неурожай. Равно-

мѣр-

мѣрно также не одинъ разъ на моемъ вѣку случилось, что когда въ Маѣ и Юнѣ въ особливости было бездождіе, шѣ только картофели принесли изобильной урожай, кои пророщенные были сажены; ибо они ростомъ правы своей землю за-благовременно застѣнили, и содержали оную въ свѣжести отъ пекущихъ солнечныхъ лучей. Между шѣмъ сего проращиванія не должно производить слишкомъ, и росткамъ не дашь выпянувшись много, для того что въ этомъ случаѣ при саженіи въ землю ростки множественно опламывающся, что для слабыхъ булавѣ, не содержащихъ въ себѣ довольно силъ къ произведенію вторичныхъ ростковъ, естественнымъ образомъ выгодно быть не можетъ. По расположенію об-стоятельствъ можетъ быть довольно, когда ростки начнутъ только показываться; если же выростутъ длинны, должно будетъ относить ихъ въ плоскихъ коробахъ или на лоткахъ къ тому мѣ-сту, гдѣ садить: такъ поступили нѣко-торые Хозяева, когда у нихъ въ 1781 году Майскими морозами рожь побилло. Поселику остались у нихъ еще для свиней назна-ченные картофели въ погребахъ, и опу-стили ростки уже въ ядены длину, они вынесли ихъ на лоткахъ въ полѣ, и по скошеніи ржаной соломы, вспахавъ въ кон-цѣ Мая землю шу взметомъ, посадили кар-тофели по бороздамъ, кои чрезъ нѣсколь-

ко дней взошли, и очень хорошо уродились.

Обкапываніе и обсыпаніе землею картофелей производися не для одного токмо изшребленія постороннихъ шравъ, но и къ споспѣшествованію плодоносія оныхъ, и сообщенію ихъ способности въ отношеніи къ человѣческому здоровью. Для изшребленія сорныхъ шравъ одного только мѣлака взрубанія земли мошлыкою на поверхность доспапочно; но пригребающъ кучки на сѣменные булавицы, ш. е. къ сѣволу, чшобъ корни выросли крупны и множественно. Чѣмъ больше на нихъ земли будешъ взворочено, шѣмъ лучше выдешъ ихъ вкусъ и способность отношительная къ человѣческому здоровью. Близко къ поверхности земли, или совѣмъ обнаженно на воздухъ и солнцъ лежащіе картофели, должно счишашъ за нѣкошорой родъ яду.

Но чшобъ чшшатели въ шомъ больше удостовѣрились, приведу я здѣсь повѣствованіе одного Бришискаго писателя, кошорой пришомъ рассказываетъ и испорію картофелей. Извѣстные картофели, пишешъ онъ, опчизну свою имѣютъ въ Перу, чшо въ Америкѣ. Они растутъ тамъ дикіе, и изшари поднесъ сосшавляли единшвенный хлѣбъ шамошнихъ жителей обнаженныхъ горъ. Они мѣлуютъ ихъ и пекутъ въ хлѣбы, называемые тамъ *Хунно*, и кошорые по испоріи очень извѣсны. Эшимъ хлѣбомъ снабжающъ Испанскіе

скіе Индѣйцы рудокоповъ Потозскихъ, и
отъ торга сими хлѣбами получаютъ боль-
ше, нежели работники заслуживаютъ рудо-
копаніемъ. Испанцы въ Перу пригото-
вляютъ изъ нихъ различныя блюда, кошо-
рья намъ неизвѣстны, и живутъ съ ни-
ми сколькожъ роскошно, какъ черной на-
родъ въ Ирландіи. Францискъ Драке вы-
везъ картофели въ 1586 году впервые
въ Европу, возвращаясь изъ своей экспе-
диціи въ Испанскую западную Индію. А
какъ онъ при этомъ возвращеніи привезъ
съ собою поселенцовъ Виргинскихъ, то
большая часть писателей утверждали,
будто бы картофели имѣютъ отечесствомъ
своимъ Виргинію, гдѣ они врядъ ли и ро-
стутъ, а всего меньше чтобы утвер-
ждать можно было, что ихъ тамъ сажая-
тъ въ маленькія бороздки подобно селле-
реѣ, и какъ оную засыпаютъ по самой
верхъ травы землю до шѣхъ поръ, какъ
начнутъ они цвѣсти; съ того распро-
снраются они далеко въ землѣ, и выраста-
ютъ до чрезмѣрной величины, какъ увѣ-
рялъ меня въ томъ доброй мой пріятель,
Донъ Педро Малдонакъ, тогдашній Гу-
бернаторъ провинціи Эмеральдосъ. Онъ счи-
талъ наши картофели за ничто прошиву
выращаемыхъ таковымъ образомъ въ Перу.
Содержатъ ихъ комянушымъ образомъ для
того, чтобы стволы не росли и съмянъ не
приносили, а шѣмъ бы не опшнмали у кор-
ней питанія. Въ Англіи съмена картофе-
лей

лей не выпѣваюшъ, такъ какъ въ Америкѣ, что довольно доказываеиъ, что картофели суиъ растѣнiе иносиранное; и для самаго сего кажешя необходимосiю, кромѣ другихъ причинъ, содержаиъ ихъ по образу Американскаго земледѣлiя, дабы лишииъ ихъ вонючаго и ядовитаго свойства солановъ (*), кошорыхъ опродiя и картофели. Ядовитость сiя въ нихъ шакова сильна, что когда они въ жаркихъ сiранахъ, коихъ земля припекаешя солнцемъ, выросиуиъ, то самыя свиьи ѣсиъ оныхъ не сiпануиъ: и я знавалъ людей, кои по сильному оиъ нихъ запаху за сiполомъ усидiиъ не могли, и кошорой свиьи еице больше обоняюиъ. Даже на самыхъ корабляхъ, гдѣ они прiучены были къ жестокому корму, видѣлъ я, что оиъ картофелей, родившихся въ жаркихъ сiранахъ, трогати не хошѣли; ибо картофели шамъ дѣлаются шверды и суковашы, когда слишкомъ будущъ подвержены дѣйсiвию солнца, хошя впрочемъ должны быиъ мягки и мучняны, и получаюиъ такой зловонной духъ, что никакъ оныхъ ѣсти не можно. По сей самой причинѣ въ Бургундiи, когда шамъ впервые картофели посажены были, употребленiе оныхъ заиращено указомъ; ибо счишали, что они причиною жестокихъ тогда случившихся болѣзней.

Но

(*) Дурманъ шрава.

Но въ холодныхъ странахъ, когда ихъ отъ солнца сохраняющъ (а эшо произходитъ отъ многого насыпанія на нихъ земли, чпо въ жаркїя лѣта, а именно, когда они на худой землѣ имѣющъ корошкую траву и пошвы своей засѣнятъ не могушъ, сугубо производить должно), во нючїи и вредный вкусъ шакъ отбемлется, чпо совсѣмъ онаго не примѣнно. (Холоднѣйшїй самъ по себѣ климатъ Нѣмецкой земли въ особливости учиняешъ, чпо картофели, бывъ ошродѣ бѣлены и дурмановъ, у насъ вредное свое свойство, которое въ жаркихъ странахъ въ себѣ оказывающъ, съ присовокупленїемъ добраго земледѣлїя совсѣмъ теряющъ. Попадающае временемъ и у насъ картофели, сидѣвшїе открыто на поверхности земли, отъ чего они совсѣмъ зеленѣющъ, а по сваренїи пропивный запахъ въ себѣ оказывающъ. Случаются иногда по обкопанїи картофелей проливные дожди, кои землю съ корней опять обмывающъ, и осипавляющъ оныя либо обнаженными, или совсѣмъ мало землю покрывшими, отъ чего должны быть оныя очень нездоровы, и на чпо у насъ поднесъ еще не обращали вниманїя. Въ таковомъ случаѣ не должно намъ скучать трудомъ, чпобъ картофели еще разъ, и больше прежняго, обсыпашъ, когда лѣто случится дождливое.)

По сему, продолжаетъ Бришпской повѣствователь, единственно въ разсужденїи сего свойства картофелей въ Бриш-

Часть. IV Отдѣл. 2. И шскихъ

тскихъ островахъ, куда они впервые привезены были, употребленіе ихъ было очень ограничено; а всеобщее употребленіе нынѣ оныхъ въ Англіи, кажется, что имѣло основаніемъ приключившееся въ Ирландіи, гдѣ во время гражданской войны хлѣбныя поля ошѣ войскъ изшреблены были, картофельныя же нивы, не взирая на то, что войска по онымъ ходили, недосташокъ хлѣба замѣнили. Но сихъ картофелей никакъ не лзя сравнять съ Испанскими (Перуанскихъ горѣ именно), кои имѣющъ особый корень и праву, а при томъ гораздо вкуснѣе и здоровѣе. (Этотъ писатель не то мыслилъ, чтобъ родившіеся въ Англіи картофели сколько ошѣ Перуанскихъ различествовали, чтобъ корни ихъ не составляли наружнаго виду булавы. Слѣдственно различіе не въ видѣ, а токмо въ величинѣ плодовъ и листовъ, также въ краскѣ, вкусѣ и здоровости составлять должно. А какъ вышеписанное земледѣліе картофелей въ Перуанскихъ горахъ ошѣ обыкновеннаго Европейскаго ошѣходитъ, не худо бы оному у насъ подражать для опыту, въ чемъ главнѣйшее можно считать обсыпаніе землею ствола по самой верхѣ, пока оной цвѣтъ не началъ. По сему обкапываніе землею должно производимо быть чаще. О саженіи же писатель этотъ объясняется явственнѣе. Еслии взявъ въ примѣръ безъ извѣстнаго сажаніе селлерей, то должно картофели

фели пересаживать, и вѣроятно мнѣ, что могутъ они отъ того получить лучший вкусъ Американскихъ картофелей, которъ шамъ часшю можешъ отъ сего заисить; ибо сѣменные картофели, или которыя посажены въ землю, когда по неосторожности выдернуты будупъ дѣшми, сварены и на столъ поданы, оказываютъ въ себѣ несноснѣйшій вкусъ, и сокъ столькожъ зловонной, какъ и бѣдой. А какъ изъ сего сѣменнаго картофеля, которой въ землѣ съ дѣшми своими общую связь имѣетъ, злой сокъ въ нихъ переходитъ, то сѣе пересадкою отвращается: ибо сообщеніе между машкою и дѣшми пѣмъ пересѣкается. Когда же далѣе содержатъ селлерю образцемъ, то отъ одной маточной булавицы большіе дѣшй произойдетъ, когда отдѣленные булавицы опнимая, разсаживать порознь, каждую въ надлежащемъ одна отъ другой разспояніи. Къ подтвержденію сего опыта пошребно очень мало сѣменныхъ булавицъ посадить, потому что каждая изъ нихъ содержишь нѣсколько ростковъ, изъ коихъ всякой особливое расшѣніе соспавитъ. Можешъ быть не бесполезно будешъ, когда кто не хочешъ отдѣлишь къ сему мѣста въ парникъ, то въ ящикъ въ комнашѣ, очень рано посадить картофелей, временно выславлять ихъ на воздухъ и солнце, или въ саду содержавъ, на ночь закрывать отъ морозовъ, чтобы посредствомъ сего произвести очень раннюю пере-

садку. Очень вѣроятное изобрѣтеніе здоровѣйшаго и лучшаго вкусомъ плода труда такого достойно, который сверхъшного богатѣйшимъ урожаемъ предъ образомъ обыкновеннаго сажденія награжденъ бытъ можешь).

Видимы еще по мѣстамъ картофельные загоны, на которыхъ картофельную траву заблаговременно срѣзываютъ и въ кормъ скотинѣ употребляютъ. Сравненіе урожая срѣзаннаго заблаговременно картофеля противу урожая шного, съ котораго травя не срѣзана, всегда показываетъ, что плодоносію его чрезъ то крайнѣ претягиваешься. Кто хочетъ траву картофельную скосить, не долженъ производить сего до цвѣту, но въ глубокую пору лѣта, когда уже сѣменные яблоки совсѣмъ завязушся. Однакожъ и тогда видимо бываетъ, что оппрыскиваютъ новые листы и вѣтви изъ срѣзанныхъ сѣвловъ, изъ чего можно заключить, что корни не лишились своего росна, и что оный тогда только уменьшается, когда не достаешь имъ листовъ и цѣлыхъ сѣвловъ; ибо всякое расцвѣтіе сѣвловъ питается изъ земли кореньями, какъ и изъ воздуха своими листьями. Почему въ разсужденіи скопскаго корма должно помышлять только объ однихъ картофельныхъ булавицахъ, а до травы не касаться; потому что травя эта сославляетъ изъ всѣхъ кормъ безсильнѣйшій, которой дѣлаетъ лишь голодные

ные скошы, прочіе же только въ смѣси съ другимъ кормомъ. Сверхъ того картофельная права гораздо нездоровѣе картофельныхъ булавицъ самаго худшаго рода, для того что подвержена дѣйствию воздуха и солнца. Это объясняется болѣе шѣмъ, что права картофельная очень добрый табакъ составляетъ, а особливо когда онъ, какъ-то въ Швеціи съ нѣкошораго времени дѣлающъ, по образу выдѣлки табачной прѣгошвленъ будетъ. (*) И шакъ лучше картофельную праву употреблять вмѣсто подстилочной соломы, или бросать по скошному двору, или въ навозной магазинъ, къ умноженію навоза.

Когда поле находишься въ округѣ звѣринца, гдѣ содержишься черная дичь (свиньи дикія), бесполезно шущъ садишь картофель; ибо шѣмъ не токмо привлечешь дикихъ свиней въ хлѣбное поле, но и какъ онъ ни на какой хлѣбъ столько не напающъ, какъ на картофели, то посѣянной на другой годъ хлѣбъ на этомъ мѣстѣ совсѣмъ взрывающъ и вышолачивающъ, ища оставшихся ошъ прошлаго лѣша картофелей, и шѣмъ весь сѣвъ опустошающъ. Картофелямъ въ шаковыхъ мѣ-

И з стахъ

(*) Въ прошломъ 1788 году сушиль я для опыту картофельные листы просто, не прѣгошвляя по табачному, а потомъ скрошивъ курилъ, и нашелъ въ оныхъ очень крѣпкаго табаку вкусъ, хотя не-пріятный; а сіе, какъ думаю, по недостатку прѣгошвленія.

стахъ должно сидѣшь въ огородахъ, въ копорые свиньи войши не могушъ, или садишь въ полѣ съ шѣмъ только, чтобъ послѣ картофелей пашня шла въ парѣ, а не рожью обсеяна была.

Сборъ картофелей происходитъ въ Сентябрѣ такъ, что лѣтніе картофели вынимаюшъ въ началѣ сего мѣсяца, а осенніе въ концѣ онаго. Избираюшъ къ сему сухое время, чтобы по крайней мѣрѣ въ пищу человѣческую назначаемые прибрашь сухи.

Нѣкоторые Хозяева, водящіе большимъ количествомъ картофели въ полѣ, выпаживаюшъ оныя сохою, чтобы меньше труда имѣть; однакожъ въ основаніи ничего они не выигрываютъ, потому что больше труда булавицы собирашь или въ землѣ искашь, когда очень много оныхъ осипавшихся невывороченныхъ сохою на поверхность. Сіи Хозяева, пуская потомъ борону, хотя выкапываютъ оныхъ еще нѣсколько и подбираюшъ, но чрезъ это производяшъ то въ два раза, чтобы можно въ одинъ разъ сдѣлать: умалчивая о томъ, что много картофелей сошникомъ разрываемъ или повреждаемъ, а шѣмъ учиняемъ непрочными.

Еслили пашня не тверда или не связана, очень способно навозными вилами кучку, въ которой сидишь куснѣ картофельной, захвативъ выворотишь и всѣ булавицы; однакожъ удобнѣе употреблять же-

желѣзную лопашку, или заспупѣ, на землѣ всякаго рода: ибо наступая на это орудіе ногою и попомѣ погнувѣ за рукоятѣ, не шокмо выворачивашѣ землю съ картофелями легче, но и изѣ боковѣ онымѣ же оставшіеся выкапывашѣ, для того что плодѣ этоѣ не рѣдко далеко распростираея въ землѣ лежитѣ. Рога обыкновенныхѣ навозныхѣ вилѣ для малыхѣ и среднихѣ булавицѣ картофельныхѣ стояшѣ очень пространно между собою, и при исканіи въ землѣ не захватываютѣ. Работникамѣ, копающимѣ картофели, должно подшверждать, чтобѣ они вынимая оные изѣ земли, разбирали порознь, малые, средніе и крупные особливо, и каждаго разбору бросали въ особливые коробки или мѣшки, также и поврежденные булавицы особливо, чтобѣ послѣдніе первыхѣ зимою не заразили, и не приключали бы въ оныхѣ гнилости; поврежденные картофели должно скорѣе употреблять въ кормѣ скотинѣ. Машочные или сѣменные картофели иногда находяшяся при выкапываніи еще свѣжи, но оныхѣ собирать въ кучу не должно, для того что они не только силы въ себѣ не имѣютѣ, но и въ кормѣ свиней вредны.

Сентябрь не рѣдко бываетѣ очень дождливѣ, почему принуждено собирать картофели и мокрые. Когда поврежденные или загнившіе картофели на мѣстѣ хорошо отобраны будуще отѣ здоровыхѣ, можно въ разсужденіи прочности сихѣ быть безопасну,

естьли только по привезеніи съ поля пош-
часъ разсыпаны будутъ оныя въ кадки и
поспавлены въ погребъ, или засыпаны пе-
скомъ въ ямъ. Но справедливо и это,
что когда кшо имѣнѣ удобность мокры-
ми съ поля свезенные картофели нѣсколь-
ко времени въ шѣнистомъ мѣсѣ посу-
шить и завялить, а потомъ уже поло-
жить въ сухой погребъ, тогда получаютъ
они лучшій вкусъ. Въ ямахъ съ пескомъ,
на высокомъ мѣсѣ состоящихъ, хорошо
же могутъ они зимовать. При великихъ
урожаяхъ дѣлаютъ нѣсколько таковыхъ
ямъ, чтобы съ Января мѣсяца начать упо-
треблять одну яму послѣ другой, и на-
чашую яму должно всю вдругъ опорожнить
и картофели перевезти домой. Ямы тако-
выя не слишкомъ наполняютъ; сверхъ
картофелей должно оставить мѣста вер-
шковъ на двенадцать, засыпать чистою
соломою, а потомъ насыпать весь песокъ,
вынутый при копаніи ямы: чрезъ это учи-
няютъ, что никакіе морозы въ самыя же-
стокія зимы и мокрота отъ дождей и
тали до картофелей доходить не могутъ.
Гдѣ нѣтъ песчаныхъ возвышенныхъ мѣстъ,
а одна только глина, или иного содержа-
нія мѣста, то должно брать предоспо-
рожность, сохранять ихъ на всякой слу-
чай сухи. Ямы окладываютъ досками или
камнями, а когда класть картофели, вы-
стилаютъ стѣны соломой, наполняютъ
яму всю, оставивъ къ верьху четверти
на

на три аршина мѣста, настилаютъ сверху соломою, и засыпаютъ яму землею, захватывая мѣста на 12 вершковъ шире устья ямы вскругъ. Потомъ около насыпи обводятъ ровокъ, а изъ него еще ровокъ къ покашой сторонѣ, чѣмъ шѣмъ снѣговую и дождевую воду отъ ямы отвесити.

Нужда научила нѣкоторыхъ крестьянъ, живущихъ на низкихъ мѣстахъ и не имѣющихъ на поляхъ своихъ возвышеній къ выкопанію ямъ, или за воровствомъ картофеля въ полѣ класъ опасующихся, хранишь оныя чрезъ зиму въ своихъ сѣнныхъ сараяхъ. Поступаютъ они шакowymъ образомъ: ставятъ нѣсколько пустыхъ кадокъ тогда, какъ накладываютъ въ сараѣ сѣно, и уже на нѣсколько аршинъ слой онаго будетъ положенъ; потомъ обкладываютъ сѣно вокругъ бочекъ, убивая оное плуго, приподнимаютъ бочки по мѣрѣ возвышенія сѣна, отъ чего происходилъ внутри пуста, въ которую со временемъ насыпаютъ картофеля, и сверху опять на нѣсколько аршинъ набиваютъ сѣномъ, чѣмъ морозъ дойти не могъ. Картофели прежде сего должно въ сараѣ хорошо высушить, почасту ворочая ихъ деревянною лопатою, и шѣмъ освободивъ отъ всякой земли, приставшей къ нимъ при выкапывантіи. — Нѣкоторые строятъ для нихъ особливые чуланы плошныя, съ полуденной стороны къ жилымъ покоямъ примыкающіе; выкапываютъ въ нихъ зем-

лю вершковъ на двенадцать, но не близко къ основанію чулана подсыпая; опшодяшъ жолубами сшекающую съ кровель дождевую и снѣговую воду въ другое мѣсто; окна ушчають ячменною или овсяною соломою; насыпають каршофелей въ чуланъ, сколько хопяшъ или могушъ, и накрываютъ ихъ соломою шакже яровою, которая морозъ не шаково, какъ озимая пропускаетъ. Однакожъ какъ въ холодныя зимы въ шаковые чуланы проходишъ морозъ, шо досшавляють себѣ болѣе безопасности шѣ, кои шаковые чуланы къ Декабрюсѣ наружности обкладываютъ длиннымъ конскимъ навозомъ, внутри же закрываютъ каршофели сухимъ мохомъ, которой бородами съ луговъ выпаскиваютъ, или засыпають льняною косприкою на нѣсколько фушовъ шолщиною. Потребна къ сему немалая шочность, штобъ зашщиту сдѣлать снаружи и внутри равную, и штобъ оная между собою шакъ сказать смыкалась: ибо когда морозъ хотя гдѣ найдешъ малое опшверзшѣе пробрашся и захватитъ нѣсколько каршофелей, шо замерзанѣ просшираетъ опчасу вдаль, и замерзшѣя булавицы вскорѣ ледъ свой прочимъ сообщаютъ.

АА. Употребленіе картофелей къ разнымъ домовымъ надобностямъ.

Кромѣ нѣкоторыхъ бѣшвъ, въ поварнѣ изъ картофелей пригошовляемыхъ, и о чемъ сказано будешъ въ другомъ мѣстѣ, обра-

обращаютъ ихъ къ разнымъ домовымъ потребамъ съ множайшею и меньшею выгодою, почему объ этомъ здѣсь вкращѣ предваришельно упомянушь должно.

Печеніе хлѣбовъ изъ однихъ картофелей, или съ примѣсю хлѣбной муки, во первыхъ привлекаетъ наше вниманіе, а особливо по тому, что это составляетъ замѣну въ голодное время обыкновеннаго нашего хлѣба.

Хлѣбъ изъ картофелей однихъ въ Нѣмецкой землѣ не слишкомъ употребителенъ; но *Пормантѣе* научаетъ насъ, какъ прѣготовляющіи оной во Франціи. Во первыхъ варятъ картофели въ водѣ, слупляющіи съ нихъ потомъ кожу, и скалкою раздавливающіи въ тѣсто. Это должно производить, пока оныя еще не остыли. Къ сдѣланію опары, кладутъ въ горшокъ нѣсколько такового тѣста, разболтавъ съ водою и скорбиломъ (крухмалъ), которое, какъ извѣстно, изъ картофелей же прѣготовляется, и въ шепломъ мѣсцѣ поставивъ квасятъ сушки. Этой заквасы всегда берутъ по нѣскольку въ опару къ печенію хлѣбовъ. Можно же употреблять вмѣсто сего обыкновенное хлѣбное кислое тѣсто. Приступая къ печенію хлѣбовъ, поставитъ съ вечера опару съ водою и картофельнымъ тѣстомъ. При замѣшиваніи тѣста въ слѣдующее утро, должно всегда прибавлять часть скорбильной муки, изъ картофелей сдѣланной. По

сва-

сваляни хлѣбовъ дають онымъ два часа
сшояшь, смачивають поверхность оныхъ,
и сажаютъ въ печь. Хлѣбъ эшотъ можно
ѣсть, но онъ всегда имѣетъ въ себѣ нѣ-
сколько правойной вкусъ, а особливо когда
взяшы будущъ картофели нехорошаго рода.
Какъ же картофельная мука или скорбило
пріуготовляется, о шотъ писано будетъ
въ IX Части во второй Главѣ въ No 10).
По трудной выдѣлкѣ выходишь онаго изъ
двухъ четвериковъ картофеля около двухъ
тарницовъ; почему лучше употреблять въ
эшо печеніе обыкновенную муку или скор-
било, дѣлаемое изъ пшеницы: кромѣ того,
что онъ примѣчательныхъ Хозяекъ давно
изыскано, что картофельное скорбило
льнаное бѣлье учиняетъ рѣдко, а эшо дол-
жно производить онъ находящагося въ
картофеляхъ ѣдкаго свойства. Скорбило
изъ картофелей можетъ употребляемо
быть къ разнымъ печеніямъ и клѣцкамъ
въ таковыхъ домахъ и мѣстахъ, гдѣ пше-
ница не родится, а наличныхъ денегъ за
скорбило гдѣ выдавать не хотяшь.

Еще должно упомянуть, что въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ шкачи дѣлають изъ
картофелей *шлихту*. Они толкутъ или
разтирають сырые картофели, вымыва-
ють, протирають сквозь вѣшюку, раз-
водять горячею водою и нѣсколько ва-
рять. Что же шлихта сія по состоянію
рода картофелей, изъ котораго она сдѣ-
лана, на льняномъ полотнѣ должна про-

ИЗВО-

изводишь тоже дѣйствіе, какъ выше сказано о картофельномъ скорбилѣ, легко догадаешься можно, когда извѣстно, что и изъ пшеничной муки шлихша, есѣли долго на полошнѣ не засохнешъ, оное учиняешъ рѣдко или мягко; почему должно картофельную шлихшу, есѣли полошно долго въ бѣленіе не попадешъ, изъ онаго вымывашъ, и лежашъ въ шлихшѣ не осмѣляшъ.

Хлѣбъ изъ картофелей съ хлѣбною мукою лучшимъ образомъ прѣупотвоялетъ ся такъ: картофели обмывающъя начисто, и съ кожею изпирающъя сырыя на обыкновенной шеркѣ. Полагающъ по равной долѣ муки и картофелей, также на полшора пуда муки кладущъ пригоршни соли и нѣсколько шмину. Мука пшеничная или полбенная или ржаная пополамъ съ яшною, или пополамъ съ овсяною, къ сему лучше. Одна ржаная мука къ сему меньше способна. Опара спавишъ въ особливомъ горшкѣ. Картофели въ хлѣбномъ корыпѣ обливающъя горячею водою, а потомъ заквашиваеиъся дежа съ опарою и подбавкою муки. Когда шѣсто взойдетъ и нѣсколько опяшъ осядетъ, всыпающъ оставшуюся муку и мѣсяшъ. Тѣсто должно бышъ такъ мягко и жидко, чтообъ шолько можно было хлѣбы въ печь посажаниъ. Воды въ шѣсто подбавляеиъся не много, пошому что въ картофеляхъ содержишъся много влажноти. Печь должна бышъ очень горяча.

Та-

Таковымъ образомъ можно получить очень хороший хлѣбъ.

Инымъ образомъ пекутъ хлѣбы изъ вареныхъ картофелей, съ коихъ кожу снимаютъ, давятъ или разтираютъ ихъ, замѣшивая съ пшеничною, полбенною или яшною мукою, валяютъ густое шѣсно, и сажаютъ оное въ самую горячую печь. Таковымъ образомъ въ печеніи хлѣбовъ пол-осмина картофелей замѣняетъ полосмину ржи.

а) Когда затрудненіе въ разшираніи или раздавливаніи картофелей уменьшено быть можетъ, выдешъ больше пользы отъ картофельныхъ хлѣбовъ. Въ разсужденіи варенія картофелей къ печенію хлѣбовъ выдешъ же будетъ для крестьянъ, когда будущъ они къ сему избирать роды картофелей, не твердое, но мучняное и рухлое ядро въ себѣ содержащихъ. По свареніи же употребляютъ къ толченію ихъ либо обыкновенныя сѣпугы, или просную машину, каковая описана будетъ при описаніи употребленія картофелей въ кормъ скотинѣ, и которую сдѣлашь очень легко.

б) Въ вышепоставленномъ предписаніи хопя ржаная мука означена худшею въ печеніе картофельныхъ хлѣбовъ, но когда она мягко смолота, можетъ оказывать шѣже услуги, какъ и прочіе роды муки. Если же ржаная мука смолота
хру-

хруско, должно оной класъ двѣ часпи на одну часъ картофелей.

Упоиребляя по нынѣ картофели всюду для пици, испышали наконецъ изъ оныхъ гнать и вино. Наспавленіе къ тому слѣдующее, по силѣ котораго картофели либо одни, или съ прибавкою хлѣба заширающся.

- а) Когда зашираются картофели *одни*, берутъ оныя не пророслыя, или когда они только въ четверть вершка роспки пуспашъ, въсомъ фунтовъ 30 или 35, обмывающъ и проширающъ на шерку съ кожею, или толкутъ оныя. Въ заторную кадку вливающъ 160 фунтовъ кипящей воды, дающъ оной спояшъ, пока рука въ ней шерпѣшь можешъ,сыпающъ тогда шерпыя или толченныя картофели, вымѣшивающъ гораздо, и дающъ спояшъ до шѣхъ поръ, когда сдѣлается какъ парное молоко; подливающъ тогда хорошихъ бѣлыхъ пивныхъ дрождей, вымѣшивающъ веселкою еще больше прежняго, накрывающъ кадку крышкою, и шовъ замазываютъ глиною. Посматривающъ ежедневно, и когда окажется (почти въ четвертой день это бываетъ), что заторъ осѣлъ, и всюду на немъ есть пузырьки, яко знакъ совершившагося броженія, тогда не медливъ наливающъ сію барду въ кошелъ и гоняшъ. Въ ракъ, изъ того выходящей, крѣпости почти не бывашъ, но спиршоватой или

или винной запахъ носится по всей винокурнѣ. Во впоричное же перегоняніе выходитъ изъ сего заплору вина $\frac{4}{5}$ массы Виршембергской (или равно шпофъ съ чешвертью Россійской), сполькожъ крѣпкаго, какъ изо ржи или инаго хлѣба. Естли во впоричное двоеніе подложитъ анису, вино эшо не будетъ имѣть никакого пропивнаго вкуса. Вмѣсто анису можно употребитъ шминъ или кудрявую мяшу.

- 6) Когда же гнать вино изъ картофеля съ прибавкою хлѣба, должно поступитъ слѣдующимъ образомъ: взявъ около 24 фунтовъ картофелей, перемишь и сперешъ ихъ сырые, и 15 фунтовъ овсянки, крупно смолошой. Овсянку положишь въ заплорную кадку, влишь на оную ведро или съ небольшимъ кипятку, и вымѣшаешь. Потомъ положишь шерпые или шолченые картофели, и посредствомъ вымѣшиванія соединишь эшо все между собою; чрезъ два часа подлишь шуда же два или три ведра холодной воды, и опянь вымѣшиваешь, чпобъ все совершенно соединилось. Послѣ влишь бушылку добрыхъ свѣжихъ пивныхъ дрождей, замѣшаешь еще, накрывъ кадку и замазавъ, и даешь ей стоять 3 или 4 дни въ теплой избѣ, и какъ скоро броженіе осядетъ и появляшя пущырки, гнать безъ замедленія. Въ казанѣ или кубѣ, пока еще не вскипитъ, должно

жно взмѣшашъ раза два или при палкою, и варишь на угольномъ жару, опасаясь отъ загорѣнія, кошорое на пламенномъ огнѣ легко воспослѣдовать можешъ. Кубъ съ высокою шейкою очень къ сему способенъ; также чѣтобъ сначала несиленъ огонь подпускашь. (У кого недостатокъ въ угольяхъ, способны вмѣсто оныхъ дубовыя дрова, хотябъ состояли оныя изъ спарыхъ колодъ и выкопанныхъ кореньевъ: пламень отъ нихъ не будешъ бишь высоко, и полыхашъ, но горишъ всегда равнымъ низкимъ огнемъ, чрезъ чѣто выходъ вина очень прибавляется.) Изъ вышеписаннаго затору выходишь раки девять шпофовъ, а изъ оной около трехъ шпофовъ добраго вина (*). Когда вычесишь за овсянку одну бушылку вина, то выдешъ изъ 24 фунцовъ картофелей около пяти бушылокъ вина. Такимъ же образомъ поступають, прибавляя въ заторъ ржаной муки. Г. Профессоръ. Майеръ варилъ 72 фунта картофелей, располокъ мягко, подмѣшалъ 60 фунцовъ крупно смолотой ржи, 10 ведръ воды, и бушылку добрыхъ бѣлыхъ пивныхъ

(*) Слѣдственно изъ четверти овсянки, которая рѣдко содержитъ въ себѣ въсомъ болѣе трехъ пудъ 8 фунтовъ, и 4 пудъ 32 фунтовъ картофеля, выходитъ вина три ведра Россійскихъ. Въ годы, когда овесъ бываетъ дешевле, и у кого много картофеля, гнаніе такого вина очень прибыльно быть можешь.

ныхъ дрождей въ запорѣ, и выгналъ изъ того слишкомъ ведро очень вкуснаго вина, или $7\frac{1}{2}$ такихъ мѣрокъ, въ которыхъ входилъ воды 4 фунта. Барда, въ коплѣ осмѣиваясь, годна въ кормъ свиньямъ и рогатому скоту. Свиньямъ даютъ оную одну, а рогатой скотинѣ замѣшивая съ хабомъемъ, или подбалшывая по немногу въ пойло.

в) Изъ сѣменныхъ яблокъ, кои бывають на верху шравы картофелей, также гоняють вино слѣдующимъ образомъ: собравъ сихъ яблокъ, кладутъ ихъ на полу подъ кровлю, разровнявъ тонкимъ слоемъ, и храняють, пока всѣ яблоки съ картофельной шравы соберутся; или набирають оныхъ вдругъ съ шравы, если много посѣяно картофелей въ полѣ, толкутъ въ ступѣ, кладутъ въ кадку, и даютъ онымъ закиснуть въ теплой извѣ или иномъ способномъ мѣстѣ. Это совершается въ мѣсяцъ или полтора. Потомъ поступаютъ по обыкновенію, какъ гоняють вино. Г. Профессоръ. Майеръ получилъ изъ 40 Виршенбергскихъ массовъ (изъ 50 шпофовъ) таковыхъ толченыхъ сѣмянныхъ яблокъ полпоры массы Виршенбергскихъ (около двухъ шпофовъ) добраго вина. Барда, въ казанѣ осмѣиваясь, составляешъ въ замѣсъ съ соломенною рѣзкою очень пріятной и здоровой кормъ рогатому скоту.

г) Вышеписанное взято изъ экономическаго календаря славнаго Профессора. Спренгера, и къ объясненію Виршенбергской массы, которая равняется мѣркѣ, въ которую входилъ 4 фунта колодезной воды, должно присовокупить, что бушылка или шопекъ составляетъ четвертую долю Виршенбергской массы, или равна мѣркѣ, въ которую входилъ 1 фунтъ воды. 100 Берлинскихъ фунтовъ содержатъ въ себѣ 110 фунтовъ Ниренбергскихъ, съ которыми сходствуешь и Лейпцигской торговой вѣсѣ; во 100 фунтахъ же Берлинскихъ Россійскихъ фунтовъ 114²/₁₇.

д) Въ прошломъ году обнадеживалъ меня одинъ Хозяинъ, у котораго родится много рябины, что онъ шолокъ сію, бралъ этой шолчи и равнымъ вѣсомъ противъ нее шолченыхъ же картофелей, и осьмую долю крупно смолотой ржи, заширалъ брагу, и получилъ изъ шого очень вкусное вино. Въ другое время обило у него вѣшромъ много незрѣлыхъ садовыхъ плодовъ; онъ далъ загнишъ этой падалищѣ, шолокъ оную, и смѣшавъ съ шолчеными картофелями и хруско смолотою рожью въ вышеписанномъ размѣрѣ, дѣлалъ зашоръ, и перегнавъ получилъ равномѣрно очень прѣшное вкусомъ вино.

ББ. Употребленіе картофелей въ кормленіе скотовъ.

Въ главѣ о кормныхъ шравахъ обѣщаль я, что нѣкошорыя огородныя расшѣнїя, кои опчаспи и въ полѣ сѣются, въ своемъ мѣспѣ показаны будутъ, яко подсобный кормъ для скотоводства; а пошому касаюсь сего пункта, кошорой чпшашелямъ шѣмъ прїяшнѣ бытъ долженъ, что не всюду еще знакомо, какъ должно въ кормленїи этомъ поступашь.

Какъ скоро начали садить картофели многимъ количествомъ, обнародоваль я въ публичныхъ изданїяхъ, что я вареные шолченые картофели, смѣшавъ пополамъ или съ шрепшею долею крупной ячменной муки, нашель очень выгодными въ кормленїи свиней, а сырое употребленїе къ шому каршофелей не сполько хорошимъ; послѣ чего вышеписаннымъ образомъ опкармливанїе свиней опъ многихъ Хозяевъ заслужило одобренїе. За чепыре года предъ симъ одинъ ниже-Саксонской сельской жпшель, а именно очень славный Г. Бергенъ, возвѣспилъ собственнаго его изобрѣшенїя полезнымъ найденное средство къ кормленїю скотовъ квашеными каршофелями, кошорое бывъ удачно, и пошому что избавляетъ шруда варить каршофели, весьма заслуживаетъ одобренїе, и шѣмъ больше достойное обнародованїя, что квашенные каршофели находимы бывають здоровѣйшими, а именно: дѣлаль онъ опытъ опкармливашь на убой 18 свиней, раздѣливъ на-

на двое по шести свиней, и одну шрепъ ихъ кормилъ ячменными дробинами, а другую картофелемъ съ одного времени, чшобы изобрѣспъ содержаніе мѣры и дѣйствія, пошому чшо всѣ при раздѣла свиней въ величинѣ и шягосши въсу сколько можно были уравнены. Однако шрепъ свиней получила на каждую свинью, въ продолженіи 14-недѣльнаго кормленія, съ половины Сентября по Рождество, по 12 четвериковъ крупно смолотыхъ ячменю пополамъ съ горошкомъ, а другая шрепъ на каждую свинью по 6 четвериковъ шой же смѣси, и по 12 четвериковъ картофелю; а шрепъ отдѣлъ на каждую свинью по 3 четверши картофелей; всѣмъ онымъ равно придавали капустныхъ листьевъ и шому подобнаго, всѣ равно хорошо содержались, и хорошо бѣли, ибо онѣ по обыкновенію задавалъ имъ корму по немногу, но часто.

Въ кормленыхъ однимъ чиснымъ зерномъ было во всѣхъ въсу 28 пудъ 9 фунтовъ; въ шѣхъ, кои кормлены пополамъ зерномъ съ картофелемъ, во всѣхъ 28 пудъ 6 фунтовъ, а въ кормленыхъ однимъ картофелемъ 28 пудъ 17 фунтовъ. Въ пошрохахъ мало было различія, кромѣ шого, чшо отъ кормленыхъ картофелемъ казались пожелтѣе; равно какъ и копченая вещьина отъ нихъ была мягче, отъ половиннаго же корму съ зерномъ выходила оная столькожъ доброшна, какъ отъ чиснаго зерноваго корму. —

Изъ такового опыта выходитъ у него, что картофели хлѣбу, когда количество нѣсколько побольше половины положено будешь, поспавляютъ равновѣсіе. Въ кормленіи у него одними картофелями вышло больше мяса и сала, нежели въ кормленіи однимъ хлѣбомъ; но меньше, нежели въ кормленіи пополамъ картофеля съ зерномъ. Однако различіе во всѣхъ свиньяхъ было очень мало, и содержалось больше, какъ онъ говоришь, въ самыхъ свиньяхъ и выборъ оныхъ въ кормъ, нежели имѣло основаніе въ образѣ ихъ пищи. Потомъ продолжаетъ Г. Бергенъ сей опытъ обращать къ рогатому скоту таковымъ образомъ: когда полоснины картофелей въ кормленіи свиней оказывающіе почти поже дѣйствіе, какъ полоснины зерноваго хлѣба; когда далѣе, чему ни одинъ знающій Хозяинъ не попрошиворечитъ, полоснины зерноваго хлѣба рогатой скотинѣ больше питанія и силы даетъ, нежели 4 пуда съ половиною самаго лучшаго сѣна; выходитъ, что чешыре четверика картофелей поже производятъ, и рогатому скоту столькожъ питанія и силы сообщать должны. По сему гарнецъ картофелей равно дѣйствуетъ 5 фунтамъ; два четверика равно 80 фунтамъ; а обыкновенной сборъ картофелей съ четверши десятины тридцати четвертей равно 87 центнерамъ или 260 пудамъ, или чешыремъ фунтамъ сѣна, возимымъ четвернею. Какъ полторы

пторы или двѣ десятины обыкновеннаго лугу не могутъ дать столько сѣна, то картофельная пашня содержишь къ лугу, какъ 1 къ 6 или 8; или сборъ картофелей съ четверти десятины въ кормленіи столько замѣняешь, какъ сборъ сѣна съ полторыхъ или двухъ десятинъ. И такъ ко, говоришь онъ далѣе, даешь своей рогатой скотинѣ ежедневно на каждую по 10 фунтовъ, слѣдственно въ семь зимнихъ мѣсяцовъ, а именно съ половины Октября до половины Мая, долженъ употребить 60 пудъ на каждую, но можетъ быть одинъ изъ тысячи Хозяевъ столько счастливъ, чтобъ на каждую корову могъ увеличить столько сѣна. Но ни одинъ изъ тысячи Хозяевъ не будетъ имѣть невозможности саживъ картофель, давая каждой коровѣ въ день по два гарнца, и запасти на оную на 7 зимнихъ мѣсяцовъ 6 четвертей съ половиною. — Къ тому же и великое различіе въ урожаѣ съ земли, пошому что четверть десятины лугу приноситъ сѣна едва ли достаточно для одной коровы; а четверть десятины, засаженная картофелемъ, принесетъ оныхъ довольно для пяти коровъ.

Наконецъ, по предложенію сего писателя, долженъ Хозяинъ по таковому изчисленію опредѣлять пространство земли подъ картофельное саженіе. У кого десять рогатыхъ скотинъ, тому потребно саживъ картофелю полдесятины; у кого

15, тому безъ четверти десятину. Кто же кормленіе свое хочетъ умножить, и на примѣрѣ ежедневно на каждую скотину прибавить по гарнцу, долженъ по расчету прибавить и земли подъ картофель, или на каждую четверть десятины полагать только 3 скотины, а поному на 6 скотинъ садить полдесятины, на 9 безъ четверти десятину, а на 12 скотинъ цѣлую десятину, и шакъ далѣе. По этому счисленію, какъ и какимъ образомъ кормить, и сколько ежедневно кто давать хочетъ и можетъ, дабы сего корму съ начала по исходъ до зеленаго корму спало, чрезмѣрно многое зависитъ; ибо въ недоспашкѣ картофелей не такъ уже легко скотину пріучить къ какому нибудь сухому корму, шакъ что она и съ сѣномъ безъ картофелей будетъ голодна, исхудаетъ и молока лишится. —

Поелику при образѣ сего кормленія картофелями дѣло доходитъ до давленія или молотія оныхъ сырыхъ, то при семъ Г. Бергенъ описываетъ своего изобрѣшенія просную машину, и копорую очень легко сдѣлать таковымъ образомъ: онъ называетъ ее жерновъ корышной, и уподобляется оная совсѣмъ свиному корыту, кромѣ того, что оное кривое, и описываетъ изгибомъ своимъ часть круга, имѣющаго поперечникъ въ сажень. Собственно должно оное быть длиною отъ трехъ до четырехъ аршинъ, въ 6 или 7 вершковъ
глу-

глубиною и въ 4 вершка глубиною выдолблено. Потомъ потребенъ жерновъ ошъ полутора аршина до двухъ въ поперечникъ и въ 3 вершка толщиной, въ кошоромъ по срединѣ утврждается деревянное гнѣздо съ четверугольною скважиною, въ оную вставляея ось или вершено въ сажень длиною, такъ что съ одной стороны высавливается онаго вершена безъ мала на два аршина, а съ другой только вершковъ на 12 или 13. Длинной конецъ вершена утврждается въ сѣбну, или на вкопанномъ столбѣ съ проушинами опирается, но такъ, чтобъ свободно ходить или поворачиваться могъ. Когда въ корыто, поставленное на высокихъ подкладкахъ, вставишь жерновъ, и за корешкой конецъ вершена по корыту взадъ и впередъ качать, то жерновъ будетъ ходить и давить все, что въ корыто положено. Одинъ человекъ можетъ эту работу отправлять, и безъ труда раздроблять камни, а не только картофели. Машина сѣя не дорога, и всякъ легко оную сдѣлать можетъ. Кривое дерево на корыто, которое впрочемъ ни на что кромѣ дровъ не годишся, и къ чему дубовое безъ сомнѣнїя лучше сосноваго или эловаго, сыскать можно всюду. Каждой смоловшійся жерновъ, и къ мѣльничному своему употребленію негодный, естли только не треснулъ, къ сему способенъ. А естли бы онаго доспать не можно было, не очень

дорого стоитъ купишь и новой. Не большая часишь желѣзной работы, какъ-то скобка и гвоздь къ ушверженію верешена, и два клинка, засовываемыхъ по обѣ стороны въ верешено, чтобъ жерновъ не передвигался, кои также и деревянные бышь могутъ, спожушь бездѣлки, а на верешено годна всякая половинка отъ сломанной лѣстницы, когда еще пряма и не сгнила.

Осталось теперь сказать о *приготовленіи* картофельнаго корму, и *кормленіи* онымъ. Картофелями кормятъ не сухими, такъ какъ они свѣжѣе раздавлены бывающъ, но разводятъ на водѣ, и дають закиснуть; для того что самая эта кислая вода скошамъ такъ пріятна и привлекательна, что они самую негодную соломенную рѣзку, ею смоченную, ѣдятъ охотно. Зависитъ отъ изчисленія, по сколько въ день давать въ кормъ сего шѣста. Прибавка воды зависитъ по размѣру ежедневной дачи; число сихъ дачъ основывается на сѣнномъ запасѣ, естли оной или нѣтъ, а именно: картофельная гуща сія присовокупляется къ гуменному корешковому корму. Дають сего мѣсива больше или меньше участковъ, въ разсужденіи того, больше или меньше сѣна придавать можно. Когда скошина получаетъ предъ полуднемъ и послѣ полдень прежде поенія, также на ночь задачи сѣна, то довольно будетъ шести участковъ. Въ противномъ

же случаѣ потребно 8 и 9 участковъ, чѣмобѣ совсѣмѣ безѣ сѣна обойтись. Если ли взять послѣдній, и можеть быть обыкновеннѣйшій случай, то на каждой участкѣ или порцію рѣзки для большой скопины, чѣмобѣ оную всю довольно смочить, потребно около шпофа на 9 порцій, слѣдственно на день для каждой скопины девять шпофовъ воды. Чрезъ сушки слѣдуетъ надлежащее заквашеніе картофельной гущи сѣ водою, къ чему по числу скопинъ потребна кадка такой мѣры, чѣмобѣ умѣстилось въ нее по 9 шпофовъ воды на каждую скопину въ сушки. Молодымѣ скошамъ противу старыхъ участковъ полагается вполы. Но какъ изъ одной кадки кормѣ спрашится, и къ заквашенію онаго потребны сушки, то видимо легко, что надобно имѣть двѣ таковыхъ кадки, чѣмобѣ изъ сушекъ въ сушки смѣнялись, одна бы спрашилась, а другая наполнялась. Впрочемъ лучше, чѣмобѣ были онѣ больше широки, нежели глубоки. Въ нихъ скорѣе закисаетъ, да и куски раздавленныхъ картофелей, на дно упдающіе, легче будетъ въ ведро захватывать.

Можно, слѣдуя вышеписанному разчисленію, полагать на каждую скопину по два или по три гарнца картофелей; воды на оныя берется не больше и не меньше вышеписаннаго; только растворъ будетъ жиже или гуще. Картофели прежде давленія должно обмыть, и отъ земли очистить.

спить. Это производится въ особливо малой кадочкѣ, въ достаточномъ количествѣ наливой въ нее воды, голикомъ болшая и ворочая. Въ этой кадочкѣ долженъ быть внизу спусшникъ, въ кошорой мушная вода съ землею по вынушїи запычки спешаетъ; крупныя часпицы земли оседають на дно, и чистыя картофели ложатся сверхъ оныхъ. (Можно обмывать картофели въ лукошкѣ, сплѣтленномъ изъ ивовыхъ прутьевъ, окуная оное до нѣсколька разъ въ воду, и шакже перетирая въникомъ голикомъ, то земля начисто съ нихъ обмоемъ.) Два чело-вѣка въ часъ могутъ перемолоть или лучше сказать передавить картофелей четвериковъ 6 или четверть. Все равно, картофельную ли гущу класъ въ воду, или воду на нее наливашъ, нужно лишь взмѣшашъ, къ чему способно весло, употребляемое на винокурняхъ. Расшворъ этотъ въ томъ же часъ вспѣнится и зачнетъ бродить, какъ пиво. Но чтобъ въ большїе морозы расшворъ этотъ не былъ очень спуденъ, или бы не замерзалъ, должно кадку обволочь кругомъ и накрыть соломой. Употребляя же въ кормъ, должно всегда въ кадкѣ взмѣшашъ, потому что картофельная гуща упадетъ на дно, а черпать шакowymъ черпаломъ или ведеркою, на рожнѣ насаженною, каковыя употребляють на водопояхъ.

Легко можетъ случиться, что скопится на корму сего обѣспя, когда наскоро сбѣсшъ онаго съ излишествомъ; ибо, хо-

пш

мя двухъ или трехъ гарнцовъ, и даже чешырехъ, на день для одной скопины не много, но когда мѣсиво задаешь участками, и шири или чешыре участка на такое же число скопинъ вдругъ изъ кадки захватывается, и въ ушатѣ ставишь на землю, то между шѣмъ гуща оседать начнетъ, и очень легко, при раздѣлѣ участковъ, въ одну порцію можешь попастъ больше жижи сверху, а въ другую больше гущи снизу; почему и участки раздѣляя должно вымѣшивашъ, и смотрѣшь того, чшобъ каждой скопинѣ доспалось поровну и одинакой доброты. Естли же въ этомъ случится небреженіе, произойдетъ не малой вредъ, пошому что обѣвшаяся скопина дни два или шири за кормъ не примѣтся. Въ такомъ случаѣ очень хорошо мѣсиво солишь. —

Въ кормленіи свиней поступають шакowymъ же образомъ, только воды берутъ меньше и растворъ разводятъ гуще. Каршофели по обмышїи давятъ, подливаютъ въ нихъ воды, квасной гущи, или сыворошки, и шому подобнаго, и давъ простоять сушки, и закиснуть, задавашъ въ кормъ по благоусмотренію. Свиньи, не на убой опкармливаемыя, получаютъ участокъ свой уменьшенной мѣрою. —

Также овцы и бараны, на убой назначаемые, очень хорошо и шолько опкармли-

мливаются симъ кормомъ, какъ бы и другимъ какимъ нибудь. Кормленіе производится подобно первому. Ошъ полушора гарница на день на каждого взрослого барана полагая, ошбѣдается онъ въ 8 или 10 недѣль жиренъ; слѣдственно къ опкормленію барана или овцы потребно вообще картофелей десяць или двенадцать чешвериковъ. Когда баранъ худой стоилъ рубль, то за опкормленного дадутъ два рубля, слѣдственно картофели въ оборотъ придутъ въ хорошую цѣну предъ тою, за каковую бы можно ихъ продать. Солома же и сѣно могутъ обращены быть къ запасенію лучшаго навозу. (Многіе Хозяева, кои чешверикъ картофелей могутъ продавать по 6 Прусскихъ грошей, возражаятъ прошиву сего кормленія, оными барановъ, и найдутъ лучше разсчетомъ свои въ продажѣ картофелей. Но по моему мнѣнію полезнѣе ихъ употреблять въ кормленіе въ половинѣ зимы, и продавать тогда жирныхъ барановъ дорогою цѣною, для того что въ это время жирные бараны и овцы очень рѣдки.)

26) *Артишоки, обыкновенные садовые артишоки.*

Сего плода имѣемъ мы разныя отродія, почему ошъ садовниковъ оныя различно и называются.

Англинскіе садовые артишоки; сїи имѣютъ не токмо головыцы больше, но и лучше вкусомъ, а потому заслуживаютъ преимущественно сажденіе.

Обычно-

Обыкновенные гладкіе артишоки; имѣютъ лисы безъ иглъ, а чешуйки въ чашкѣ своей съ оными.

Обыкновенные колючіе артишоки; это самые худшіе, имѣютъ темновашия колючіе лисы и чешуйки, на которыхъ кожа тверда и суроваго вкуса.

Должны быть очень теплыя, всегда равной погоды лѣта, чѣмъ сѣмена сихъ растѣній выпѣли. Почему выписываютъ оныя изъ Италіи, избирая за лучшія малыя, короткія и толстыя, потому что острова и шонкія обыкновенно не годятся. По показанію Г. Людερса сѣмена прочны лежатъ 6 лѣтъ, а настоящая пора къ сажению оныхъ концы Апрѣля и въ Маѣ. Однакожъ лучше сѣменные зерна сажать въ Маршѣ въ парникахъ между другихъ растѣній, на полвершка глубиною и на 9 вершковъ разстояніемъ между собою, и островашымъ концомъ къверху; послѣ чего оныя, а особливо когда намочены будутъ, въ парникахъ всходятъ чрезъ 6 и 8, и на открытомъ воздухѣ чрезъ 10 дней. Чѣмъ старѣе сѣмена, тѣмъ позднѣе всходятъ. Моченіе производится въ водѣ 12 часовъ; но отъ многихъ садовниковъ въ мокрыхъ древесныхъ опилкахъ, или въ навозной водѣ. Молодыя растѣнія въ послѣдствіи пересаживаются на жирную, рыхлую и влажную землю, на аршинъ съ четвертью разстояніемъ между собою; чѣмъ ранѣе въ году пересадка произведена
быть

быть можетъ (а именно, когда растѣнія будутъ довольно велики и толсты), шѣмъ больше споспѣшествуется ихъ совершенству.

Кромѣ воспитанія плода сего отъ сѣменъ, разводяшъ оной и опдираніемъ побочныхъ опроснковъ отъ старыхъ кустовъ, что шѣмъ предпочтительнѣе, что отъ добрыхъ кустовъ опять выдуть добрые арпишоки, отъ сѣменъ же входяшъ и худые и добрые вмѣстѣ. Размноженіе это легчайшимъ образомъ производится, когда весною землю около старыхъ кустовъ нѣсколько огрестъ, молодые опросники оставивъ только при самыхъ лучшихъ опнямъ; это же самое повторить еще лѣтомъ, чтобъ старой кустъ побочными опросками не былъ обезсиленъ. Но если главной стволъ толстъ, можно оставить молодые опроски расти при ономъ, для того что когда первые цвѣты въ Іюль или Августѣ срѣзаны будутъ, молодые опроски будутъ продолжать свой ростъ, и осенью принесутъ цвѣты. Молодые опроски должно съ опорожностію опдѣлять ножемъ, чтобъ осталось при нихъ нѣсколько корневыхъ жилокъ; ихъ можно во все лѣто опсаживать.

Когда посадишь нѣсколько кустовъ зимою въ погребѣ, къ намѣщенію оставленныхъ на мѣстахъ въ огородѣ, и кои зимою выпастъ могутъ, должно наблюдать при семъ слѣдующую уловку: во первыхъ

кон-

концы листовъ на три вершка опустивъ отъ корня обрѣзать, и осматриваясь, чтобъ главнаго корня, которой длиненъ и прямо морковью въ землю идетъ, не прирывать, также и не загнуть, высаживая оной въ Апрѣлѣ опять на грядѣ. Молодые опросники не имѣютъ длинныхъ и прямо въ землю простирающихся корней, почему таковой предосторожности не требуютъ.

Мѣсто подъ арпишоки лучшее, когда расположено на полдни и освѣщается полнымъ солнцемъ: тѣнь и сырость древесъ росу ихъ очень противны.

Англинскіе и обыкновенные гладкіе арпишоки имѣютъ листы головки, составляющіе подобіе чешуи, другъ на другъ лежащіе, имѣютъ и стволы выше и толще, изъ которыхъ на землѣ пирамидальной выходятъ по 4 и по 5 головицъ. Сперва выходящія головки бываютъ самыя крупныя, потомъ оныя часу меньше. Когда первыя головки будутъ срѣзаны, не достигнувши полного своего роста, тогда и всѣ головки вырастаютъ крупныя, а впрочемъ и тѣ. У ширшаго обыкновеннаго колючаго рода, которой садовники называютъ упрямой арпишокъ, чешуйчатые листы не прилегаютъ другъ ко другу, но съ самаго начала роснутъ врознь. Но за то сѣи арпишоки меньше землю истощаютъ, нежели выписанные роды, и хотя на стволѣ рѣдко бываетъ больше двухъ и трехъ головицъ, но за то оныя вдвое крупнѣе,

Часть IV. Отдѣл. 2. К неже-

нежели на первыхъ родахъ. Старые желтые лисы можно осипывать и опдавать въ кормъ коровамъ. Должно также во все лѣто кусты опъ поспороннихъ травъ опалывать и въ случаѣ нужды поливать. Когда же цвѣточныя головки будутъ срѣзаны въ кушанье, должно сиволы погнушь на всѣ стороны, чпобъ они у земли приломились; впрочемъ опнимушь они у другихъ пипаніе, и оппускаясь малыя въпви съ головницами, но копорыя къ употребленію не годятся.

Послику «сіе расшѣніе происходитъ изъ теплаго климата, и холоду нашей зимы выдерживать не можетъ, но пошребна всевозможная предосторожность къ убеженію оныхъ. Обыкновенно каждой кустъ зысыпается землею подобіемъ кропковой кочки и накрывается связанною соломою. Верхнихъ листовъ должно нѣсколько изъ земли выставить, чпобъ растѣнія не задохнулись. Послѣ сего совѣмъ закрываютъ ихъ навозомъ, и въ сильные морозы еще сверху землею засыпають, вынутые же кусты сажаютъ въ погребъ въ сухомъ пескѣ. Нѣкошорые предъ наступающими морозами аршишоки совѣмъ вокругъ опкапываютъ, корни почпи до половины обнажаютъ, и такъ опкрыты опавляютъ на двѣ недѣли. Когда же довольно заяянутъ, обрѣзываютъ траву по самыя корневые лисы, корни же обсыпають высѣянными льяными обмялемъ, употреб-

ляя

дая оныхъ на каждой по 3 горсти, и сверху засыпающъ землю. Нѣкоторыя употребляющъ къ сему листья грецкихъ орѣховъ, пошому что оныя спужу и насѣкомыхъ удерживающъ. Съ перевозимья и начала морозовъ обвязываютъ ихъ соломой, укрѣпляемою ко вбишюму колышку, въ послѣдствѣ же закрываютъ длиннымъ конскимъ навозомъ.

Г. Рейххартъ слѣдующій способъ къ сохраненію аршишюковъ чрезъ зиму предлагаетъ за лучшій: съ кустовъ по наступленіи морозовъ листья такъ обрѣзать, чтобъ осталось оныхъ на вершокъ или полвершка у корня сверхъ земли, вокругъ землю взрыть, и пригребая оную кустъ засыпать кучкою; послѣ на каждую кучку наложитъ по лукошку свѣжаго и легкаго конскаго навозу. Весною, когда морозы кончатся, должно навозъ опчаси снятъ, а по времени, когда погода сдѣлается теплѣе, снятъ и оспальной соломистой навозъ, дробной же навозъ вкопанъ въ землю между кустовъ, но такъ, чтобъ лопаткою не шронуть кустовъ. Молодые растѣнія должно осенью изъ земли вынуть, хранишь въ погребѣ въ сухомъ пескѣ, и весною, когда не будетъ опасенія отъ морозовъ, опять высадить. Или выкопать осенью яму въ саду, вынуть молодые растѣнія изъ земли, листья обрѣзать, оставивъ оныхъ только на полтора вершка, сажать кустъ по кусту въ ямѣ,

закрывая землю такъ, чѣмъ она между корней всюду насыпалась и оныхъ касалась. Когда, какъ выше упомянуто, дробной навозъ, отъ зимней покрывши осмѣвающейся, въ землю вкапываютъ, то если она хороша, нѣтъ нужды въ дальнѣйшемъ унавоживаніи. Къ зимнему прикрыванію тяжелый, согнившій и мокрый навозъ вреденъ: какъ оной подобно землѣ замерзаетъ, растѣнія подъ нимъ неминуемо погибаютъ. Головицы обыкновенныхъ колючихъ аршишковыхъ солятъ или сушатъ, и зимою въ кушанье употребляють. Когда головицы довольно будутъ велики, но не переспѣютъ, снимаютъ оныя, и въ водѣ слегка обвариваютъ. Когда наступитъ холодъ, снимаютъ съ головицъ всѣ листья, очищаютъ мучняное вещество, одинъ же головицы или самое ядро кладутъ на чистую доску, переворачиваютъ щетельно, и когда совсѣмъ засохнутъ, складываютъ въ коробочки до употребленія по желанію.

27) Карловой аршишкѣ, Кардъ или Кардонъ.

Этотъ плодъ можетъ быть; какъ упоминаетъ Баухиній, произошелъ отъ предшешаго, но имѣетъ цвѣточную головицу гораздо меньше, и темносиніе цвѣты. Въ разсужденіи же употребленія оныхъ въ пищу сѣ различіе, что у обыкновенныхъ садовыхъ аршишковыхъ нижнія части чешуистыхъ листовъ и внутренній сѣржень съ чашкою сочны, мясисты и употреб-

пребляются въ пищу, а у кардовъ не самой плодъ, но только среднее толстое ребро листовъ ѣсть можно.

Кардовые аршишоки равномѣрно не отъ сѣмянъ, шесть лѣтъ пребывающихъ вкожими, разводятся лучше, но отъ побѣговыхъ отростковъ; содержащя оныя подобно садовымъ аршишокамъ. Листы же къ употребленію въ пищу особливымъ образомъ приготовляются, или по-садовнически говоря подоблаиваются. Производится это связываніемъ листовъ или всего куста не шуго соломой, и обсыпаніемъ сѣвѣла землею, сколько возможно. Сверху накладываютъ теплаго конского навозу, высыпая концы верхніе листовъ. Когда чрезъ 3 или 4 недѣли ребра листовыя поблѣютъ, навозъ и земля отгребаются, листы снимаются, и въ кушанье шиковымъ образомъ приготовляются: скупивъ наизво наружную кожицу, обнаженные ребра положишь на часъ времени въ холодную колодезную воду, и попомъ приговоришь въ спаржномъ или аршишковымъ взварѣ. На зиму сажаютъ кусты въ погребъ, засыпая по самымъ листы пескомъ, отъ чего оныя равномѣрно и еще лучше блѣютъ. Можно и сѣволы подобно ребрамъ листовъ приговаривать, выскребая внутренній стержень, и ѣсть.

Карды, какъ пишетъ Линней, уринъ вонючій запахъ сообщаютъ, напрошивъ вонь изъ рта отворачаютъ, не меньше же и

скверной запахъ отъ плечъ, который чело-
вѣка козлу уподобляетъ, прогоняютъ.

Считаютъ карды и арпишоки за ве-
сьма пишашельную пищу, которая даже
къ роскоши побужденіе дѣлаетъ. Цвѣты,
а особливо послѣдняго рода, на солнцѣ
сушеные, употребляютъ Французскіе и
Испанскіе крестьяне къ подправленію оны-
ми молока. Арпишоковое вино, которое
въ *Neuen Sammlung auferlesener Wahrnehmungen*,
VIII Band, 68 S. за сильное и достовѣрное
средство отъ водяной болѣзни похваляе-
ся, пріуготовляется таковымъ образомъ:
обираютъ листья съ сиволовъ арпишоко-
выхъ, толкутъ оные не обмывъ прежде въ
иготѣ, выжимаютъ сокъ, и мѣшаютъ по
равной долѣ сѣмадерою или инымъ виноград-
нымъ виномъ. Чпо же оба рода, карды и садо-
вые арпишоки, содержатъ изводишельную
силу, обьясняется по по сильному запаху
урины послѣ употребленія оныхъ; послѣ
арпишоковъ запахъ этотъ сходствуетъ
на фіалковой.

28) Бѣлая рѣпа.

Можно рѣпу, въ огородахъ и въ полѣ
сѣемую, раздѣлять вообще на бѣлую,
желтую и сѣрую, а по таковому различію
сихъ корней, различныя названія онымъ,
которыя онымъ въ разныхъ странахъ да-
ютъ, опредѣлишь, чпо здѣсь и будетъ
учинено.

Мы здѣсь въ Маркѣ Брандебургскомъ (*), и не рѣдко въ одномъ мѣстѣ, имѣемъ вообще смѣшанные роды *малыхъ рѣпъ* и *большихъ водяныхъ рѣпъ*, изъ коихъ первой у иностранцевъ извѣстенъ подъ названіемъ *морской рѣпы*. Называютъ оную въ особливости морскою рѣпою, потому что оную во многихъ Нѣмецкихъ обласняхъ либо не сѣютъ, или не получаютъ она тамъ такого прянаго вкуса, каковымъ въ Маркѣ родящаяся отличаетъ. Большую рѣпу съ ея опродіями называютъ въ Маркѣ *водяною рѣпою*, потому что она очень сочна, и шѣмъ еще сочнѣе бываетъ, чѣмъ влажнѣе пашня, на которой она родилась. Малая же морская рѣпа больше суха, нежели сочна внутри; поему земледѣльцы у насъ и называютъ оную сухою рѣпою; послѣдняя, когда у насъ посѣяна будетъ настоящими Телтавскими сѣменами, въ первой годъ уже выходитъ водяна и невкусна, хотя бы посѣяна была на возвышенно лежащихъ, не теплыхъ, песчаныхъ пашняхъ; развѣ только случится лѣто очень сухое и жаркое. Въ такомъ случаѣ выходитъ и у насъ малая рѣпа дробнѣе, суше и вкуснѣе.

АА. Малая Маркская рѣпа или Телтавская.

Малой въ двухъ миляхъ отъ Берлина лежащій городокъ Телтау имѣетъ

К 4 луч-

(*) Въ прошедшую войну сѣмена тамошнихъ рѣпъ вывезены въ Россію, и во многихъ мѣстахъ роды оныхъ ведутся.

лучшую по оному прозванную рѣпу. Но и въ самомъ Телшавскомъ округѣ, на нѣскольکو миль пространствомъ, по разнымъ мѣстамъ таже рѣпа выходитъ не одинакова добротою: иногда бываетъ рѣпа сія всюду, какъ преимущественно съюстъ оную въ среднемъ Маркѣ Бранденбургскомъ, равномерно доброта вкусомъ, а именно, когда лѣшю случится не влажно и не холодно. У насъ за извѣстное считающъ, что чѣмъ рѣпа дробнѣе, бѣлѣе и чище снаружи, а по срединѣ и снизу не имѣетъ многихъ волошисныхъ корней, тѣмъ меньше она подвержена червоточинѣ, и тѣмъ больше подходитъ добротою вкуса къ настоящей Телшавской рѣпѣ. Пошва земли около Телшау состоитъ не изъ одного песку, но болѣе съ глиною смѣшана. Чѣмъ больше земля своимъ отъ Телшавской разнится, тѣмъ больше отходитъ и рѣпа вкусомъ. При томъ же нужно сѣмена брать изъ Телшавской округи, потому что въ другихъ мѣстахъ оныя уже въ другомъ поколѣніи выражаются. Ежегодно отсылающъ изъ Берлина великіе грузы Телшавской рѣпы не только въ другія Нѣмецкія сѣраны, но и за море въ Англію и Голландію; въ послѣднемъ мѣстѣ подающъ оную сырую по ушру къ заѣдкѣ водки.

Есть въ Маркѣ и другія мѣста, гдѣ рѣпа сія выходитъ отменно доброты. Въ сѣаромъ Маркѣ есть деревня Шварц-дозенъ,

лозенъ, въ которой родится лучшая рѣпа; также въ Иригвицѣ въ деревнѣ Френенсшайнѣ, и въ новомъ Маркѣ въ Амшѣ Карбскомъ. Карбская рѣпа вся красновата, которой цвѣтъ получаетъ она отъ краснаго песку, въ коемъ родится. Родится же шаковая въ Биршенбергскомъ Геттингенѣ, по чему и называется *Геттингскою*.

Пашню подъ сѣю рѣпу отчасти вновь унавоживаютъ, частью же сѣютъ безъ навозу, но землю вспахиваютъ столько разъ, сколько гдѣ обыкновенно пахутъ подъ сѣвъ ржи. Сѣютъ оную густо; попому что чѣмъ гуще будетъ оная росши, тѣмъ будетъ меньше и вкуснѣе. Сѣмена разсѣиваютъ по вспаханному и заскоряживающъ легкою бороною.

У насъ въ Маркѣ есть сего рода *лѣтняя* и *осенняя рѣпа*. Первую сѣютъ въ концѣ Апрѣля или въ началѣ Мая мѣсяца, и около Иванова дни (24 Юня) выкапываютъ. Оная долго лежать не можетъ, должно оную скорѣе издерживать; оная составляя первый года плодъ, продается дороже осенней рѣпы. Но еслили лѣпо будетъ мочливо и холодно, выходящъ оная червива и тверда и не разваривается, что случается съ нею обыкновенно и въ тѣхъ мѣстахъ, въ коихъ пошва земли отъ Телпавской различна.

Осеннюю рѣпу сѣютъ съ 14 Юля, обыкновенно же еще въ Августѣ въ паровомъ клину; оная поспѣваетъ въ концѣ

Сентября, и при сухой погодѣ малою лошапкою выкапывается, послѣ чего на зпомѣ рѣпищѣ сѣютъ рожь. Когда Сентябрь будетъ больше сухъ, нежели мокры, рѣпа сѣя выходишъ прочнѣе въ лежанье; но шѣмъ скорѣе загниваетъ, чѣмъ мокрые былъ Сентябрь.

Желающій рѣпу сѣю посѣять въ огородѣ, долженъ избирать подъ нее мѣсто высокое, теплое и песчаное; естли мѣсто глинисто, должно подмѣшивать песку. Когда же мѣсто изъ голаго песку соспоишъ, можно навозишъ на оное глины. Пошомъ взявъ сѣменъ изъ шѣхъ мѣстъ, въ копорыхъ лучшая рѣпа родится. Я видалъ, что нѣкоторые съ самой весны сѣютъ рѣпу на грядахъ. пошомъ на оныхъ же сажаютъ скороспѣлой горохъ, съ копорого снявъ зеленые спручки для повареннаго употребленія, гороховины выдергивающъ, чшобъ дать просторъ рѣпѣ, копорая послѣ того очень хорошо урожается; но предполагая, что мѣсто не неизменно, и погода была не очень мочлива.

Рѣпу, употребляемую для высадковъ къ собиранію сѣменъ, должно во всѣхъ оныхъ родахъ выбирать самую чиспую; т. е. шаковую, у копорой съ боковъ не вырастаютъ мочки или тонкихъ корешковъ, хранишъ въ погребѣ, обрѣзавъ праву вплошь по самой корень, шолько чшобы не захвапшъ шѣла и не повредить рѣпы. Оные въ удобномъ мѣстѣ, когда начнутъ

окан-

оканчивашься весенніе морозы, высаживающѣ рядами на вершокъ между собою разстояніемъ, и съ обѣихъ сторонъ, каждый рядъ обкладывается жердочками на сошкахъ, чѣмъ сѣменные вѣшви къверху поддерживающѣ, и поваливаю оныхъ на землю препящивовающѣ. Какъ скоро сѣменные головки пожелѣютъ, выдерживающѣ шебли, пока малыя пички головицѣ не разклевали, и привѣшиваютъ въ безопасномъ прохладномъ мѣстѣ, гдѣ бы совѣмъ высохнуть могли. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кресьяне ищутъ весною оставшихся на рѣпицѣ рѣпѣ; и кои пускающѣ ростки травныя, шѣ вынувъ пересаживающѣ въ огородъ, чѣмъ принесли сѣмена. Таковой поступокъ по доброму основанію не заслуживаетъ похвалы, ибо въ этомъ случаѣ не лзя бытъ удостовѣрену въ добромъ родѣ сѣменѣ, и можно будетъ воспитывающѣ добрыя и худыя сѣмена вмѣстѣ.

Чѣмъ рѣпу уберечь во всю зиму свѣжею для пищи, обрѣзываютъ оную, т. е. очищающѣ ножомъ боковыя корни влопъ къ рѣпѣ, также и нижній прямой корень почти весь, и праву сверху, чѣмъ воспрепятствовать проростанію. Если сего не учинить, и проростанія шѣмъ не удержатъ, то со временемъ потеряетъ она совѣмъ вкусъ и сдѣлается шру-плява.

Обрѣзанную вышеписаннымъ образомъ рѣпу должно подержать нѣсколько недѣль

дѣль въ сухомѣ мѣстѣ, рассыпавъ тонкимѣ слоемѣ, дашь ей нѣсколько завянуть, и пригошовишь песку, которой чѣмѣ бѣлѣе выбранъ будешъ тѣмѣ лучше, насыпашъ тонкимѣ же слоемѣ и насухо высушишь. Попомѣ класиъ рѣпу въ кадку, и по слоямѣ пересыпашъ пескомѣ, и кадку сію поставишь въ чуланѣ или погребѣ, гдѣ бы не мерзло. Когда же чуланѣ и погребѣ противу сильныхъ морозовъ не безопасны, то хранимыя кадки должно во время сильныхъ морозовъ либо вносишь въ теплую избу, или обкладывашъ оныя снизу доверху длиннымѣ конскимѣ навозомѣ, чѣмѣ рѣпа не замерзла; ибо въ случаѣ сего не шокмо доброй вкусѣ оной пропадаетъ, но и распаявъ начнешъ она гнишь. Можно ошчаси возвратишь вкусѣ, когда замерзшую рѣпу положишь въ холодную воду, чѣмѣ мерзлосиъ вышянуло. Это производяшъ мало по малу, вынимая мерзлой рѣпы, сколько нужно, для употребленія.

Въ которомѣ мѣстѣ не можно досипашъ песку, употребляющъ вмѣсто онаго соломенную рѣзку. Но къ сему годна одна шолько ржаная солома чистая; когда же естъ въ ней травы, переходитъ изъ нихъ песторонней вкусѣ тотчасъ въ рѣпу, что даже ошъ песку нечисаго случаетъся, и пріемлетъ она въ немѣ такъ называемой земляной вкусѣ, которой въ нѣкошорыхъ душныхъ потребахъ и не

не выходитъ. Когда рѣпа положена въ чисшую соломенную рѣзку, отвращаетъ она хорошо дѣйствіе мороза, есѣли только отъ краю дерева между рѣпою заложена будетъ. Когда же рѣпы непосредственно къ дереву прилегаютъ, морозъ входитъ въ крайнія рѣпы, а изъ перевозамерзшихъ сообщается онъ и всѣмъ.

Когда за вышеприведенными причинами не лѣзя надѣяться, чтобы рѣпа долго улежала прочною, должно оную по нѣсколькихъ мѣсяцахъ выбрать, гнилыя выкинуть, а цѣлыя въ теплой избѣ гораздо обвялить, и опять слоями покладъ, пересыпать сухимъ пескомъ или сухою рѣзкою. Съ нею одинакое обстоятельство, какъ и съ садовыми плодами: отъ одного загниваго плода заражающія скоро и здоровые, къ нему примыкающіе.

Не должно думать, что рѣпа, хотя бы и не загнила, могла въ своихъ хранилищахъ удержатъ долго весною свой добрый вкусъ. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда движеніе растѣнія въ полѣ и огородахъ усилился, начнетъ лишаться она своего вкуса, и чѣмъ долѣе, пріемлетъ она тѣмъ больше не только прѣвратной вкусъ, но и разварить ее будетъ не можно. Не разваривающаяся же въ это время года рѣпа составляетъ самую бѣдную пищу. Погребъ очень холодные еще могутъ упадку вкуса рѣпнаго воспрепятствовать; почему кадки съ рѣпою изъ теплыхъ мѣстъ должно

жно въ таковыя погреба переносить въ Февралѣ мѣсяцѣ, чтобы рѣпу тѣмъ долѣе сберечь годною въ пищу.

Кромѣ сего образа храненія умѣяи въ Маркѣ совѣмъ неизвѣстнымъ способомъ сушишь или вялишь рѣпу, копорая не шокмо во все лѣто, но и цѣлой годъ остаешся доброю, очень здоровою, и оиѣ знашюковѣ за прѣяшнѣйшую счишаемую пищу. Оибираюиѣ самыя малыя рѣпки, обрѣзываюиѣ шраву и корѣшки, кладуиѣ въ застѣни шонкимъ слоемъ, и граблями по часпу переворачивая сушаиѣ. Естѣли рѣпа на полу въ застѣни не просохнешѣ, переносиѣ оную мало по малу на доскахъ въ теплую избу, или спавяиѣ въ нѣсколько оспывшую хлѣбную печь, совѣмъ досушиваюиѣ, и разсыпавъ въ мѣшки храняиѣ въ сухомъ мѣстѣ. Должно наблюдаиѣ, чшобѣ рѣпа совершенно высохла, дабы оиѣ входящей сырости не заплѣсневѣла послѣ. Въ такія времена года, когда и свѣжая рѣпа къ разваренію бываешѣ за швердоснѣю неудобна, шогда о сушеніи таковомъ рѣпы помышляиѣ не должно; пошому чшо таковая жесіпкая рѣпа по засушеніи еще больше неудобна будешѣ къ мягкому развариванію, и соспавиѣиѣ шогда очень невкусную пищу. Но чшобѣ въ Хозяйствѣ не шерпѣиѣ сего недосшатка, насушиваюиѣ въ урожайныя на рѣпу годы столько оной, чшобѣ на два года было довольно, и чшобѣ эшотѣ запасѣ въ неурожайной годѣ сдѣлаѣ замѣну.

Слав-

Славный Фридрихъ Гофманнъ предписываетъ эту сушеную рѣпу шѣмъ, кои страдаютъ грудными припадками. Полезна же она и имѣющимъ шугу животъ, ибо умѣренно отверзаетъ чрево безъ всякаго опягощенія, а особливо естли при томъ употреблять сыропъ. Какъ же сушеную рѣпу варить и къ какому мясу соопавляетъ она приправу, о томъ общопельно писано будеть въ первой Часши Хозяйки.

ВВ. Большая бѣлая рѣпа.

Выше упомянушо, что малая рѣпа раздѣляется на лѣтнюю и осеннюю. Большая рѣпа также. Во многихъ здѣшнихъ мѣстахъ употребляютъ одинакия оной сѣмена. Лѣтнюю рѣпу сѣютъ въ два разныхъ времена года, а пошому и называютъ раннюю и среднюю. Естли погода будеть благопоспѣшна, можно оную чрезъ шесть недѣль по высѣвъ употребить въ пищу; естли же созрѣвшую такую рѣпу продержатъ нѣсколько въ землѣ, легко учиняется она жестка и шрупява. Осенняя же рѣпа, которую съ половины Юля сѣютъ, можетъ оставлена бытъ въ землѣ даже до половины Ноября и позднѣе, когда погода осенняя позволитъ. Въ овощникахъ и другихъ огороженныхъ мѣстахъ оставляютъ оную въ землѣ до способнаго случая къ продажѣ, или къ кормленію скошины, пока она ошъ морозовъ можетъ бытъ безопасна.

ВВ.

ВВ. *Майская рѣпа, Тарелочная рѣпа.*

Тарелочною рѣпу сію называюшъ по-тому, что она больше широка, нежели толща, и подобна тарелкѣ: у ней одинъ хвостикъ бываетъ по срединѣ. Сѣюшъ оную по состоянію погоды ранѣе Мая, еще въ Апрѣлѣ, и больше въ огородахъ, нежели на поляхъ.

ГГ. *Длинная круглая бѣлая рѣпа, выглядная рѣпа.*

Эта рѣпа только видомъ отъ тарелочной рѣпы различествуешъ; выглядною же называюшъ оную въ нѣкоторыхъ странахъ потому, что изъ земли растешъ выспавившись, и какъ бы выглядываешъ, а прочіе роды рѣпъ всѣ въ землѣ скрываются. Послѣднія должно изъ земли выкапывать, а сію легко руками можно выпащивать.

Поскольку у меня въ полѣ сѣеся одна только осенняя рѣпа, замѣтилъ я, что сѣмена тарелочной рѣпы, когда оныя изъ другихъ мѣсѣвъ взяны, и въ половинѣ Іюля въ полѣ посѣяны будутъ, произведишъ больше длинную, нежели круглую рѣпу; когда посѣяны будутъ въ Апрѣлѣ или Маѣ въ огородѣ, производяшъ въ первомъ поколѣніи тарелочную рѣпу, а изъ сѣменъ, отъ нее полученныхъ, выходишъ длинно-круглая или выглядная рѣпа, хотябъ въ Маѣ или Апрѣлѣ посѣяна была, съ тѣмъ только различіемъ, что въ послѣдствѣ отъ собранныхъ со втораго поколѣнія сѣменъ рѣпа выходила отъ часу больше изъ земли выпавляющаяся.

Больш-

Большую рѣпу называющѣ и жнивенною рѣпою, пошому что по снятіи ржи жнивѣ пошчасѣ пашущѣ взмешомѣ, и разсѣявѣ рѣпу сію, шолько заскораживающѣ. Иные называющѣ сію паровою рѣпою, однакожѣ паровою называется ша, кошорую сѣющѣ въ паровомѣ клину, а именно на шомѣ, кошорое въ глубокую осень рожью и пшеницею засѣяно бытѣ имѣетѣ. Сія въ здѣшнихѣ мѣстахѣ единственнѣ употребляется, и пашня подѣ нее у насѣ изобильно унавоживается, шрижды и чепырежды вспахивается, и шолькожѣ разѣкѣ изшребленію собачины шравы заскораживается, а сѣмена разсѣвающѣ послѣ послѣдняго вспаханія и шолько забораниваются.

Мы не можемѣ въ разсужденіи нашей паровой или осенней рѣпы жаловашѣся на земляныхѣ блохѣ, чтобѣ онѣ обѣѣдали молодыя растѣнія. Чаше это случается сѣ Майскою рѣпою, кошорую вредяшѣ дождевые черви шолькожѣ, какѣ и земляныя блохи. Ошѣ первыхѣ защищаемѣ мы разсѣваніемѣ по рѣпищу золы, а ошѣ вшорыхѣ чашымѣ поливаніемѣ. Г. Бергенѣ пишешѣ, что жнивенная рѣпа ошѣ земляныхѣ блохѣ, пошому что оныя на ржаномѣ жнивѣ, шолько однажды подѣ рѣпу вспахиваемомѣ, болѣе вогнѣзжающѣ, болѣе обѣѣдаема бываетѣ, нежели на паровомѣ полѣ; пошому что шущѣ земля разашри и больше послѣ зимы ворочается паханіемѣ, и шолько же бороненіемѣ, а по-

Часть IV. Отдѣл. 2. Л шому

тому онымъ къ вогиѣженію не даютъ покою, или еще больше, что онѣ шумѣ не находяишъ себѣ питанія. Но онѣ присовокупляетъ, что единственное доселѣ испытанное имъ къ прогонянію ихъ средство есть типсѣ, кошорой по рѣпищу разсѣвать должно такимъ же образомъ, какъ по дяшловинѣ и спручковымъ плодамъ. Для шѣхъ же, пишешъ онѣ далѣе, кои типу досташъ дешево не могушъ, нѣтъ иного способа, какъ землю еще разѣ вспахашъ и обсѣяишъ, а всего меньше держашся жнивенной рѣпы. Изъ шрехъ разѣ едва ли однажды могушъ они получить хорошей оной урожай, и при томъ онѣ медвяной и мучиной росы, обыкновенно въ это время упадающей, кошорая еще больше земляныхъ блохъ привлекаетъ, всегда будуще находишься въ опасности. —

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ сію рѣпу на таковой землѣ, кошорая предѣ шѣмъ уважена была овечьимъ пригономъ; шумѣ она очень хорошо урожаешся. Г. Профессоръ *Майеръ* сѣетъ рѣпу сію между картофелей, а именно: когда сіи въ борозды будуще положены, рѣпу разсѣваюшъ у него въ умѣренномъ количествѣ по всему загоу. Рѣпа выходишъ тогда, какъ картофельная шрава будетъ вершка въ три вышиною. Когда картофели обкапываюшъ и обсыпаютъ землю, тогда рѣпа обнажешся, и шѣмъ очень ускоряешся ростъ ея. Къ 24 Іюня къ употребленію

ленію въ пищу поспѣетъ, и до половины
Іюля издерживается на поварию или въ
кормъ скопамъ.

Наша большая водяная рѣпа не иное
что, какъ въ наши дни сполько выхвален-
ной *турнипсѣ* Англинской, и послѣ того,
какъ въ верхней Нѣмецкой землѣ чрезъ
долгое время считали за оной Бургонд-
скую рѣпу, или бѣлую свеклу, да и самъ
я сѣмена получилъ прежде сего подъ озна-
ченнымъ названіемъ, но наконецъ спара-
ніемъ одного пріятеля присланы ко мнѣ
были изъ Англіи сѣмена шурнипсовъ, и я
нашелъ, что шурнипсѣ не иное, какъ боль-
шая водяная рѣпа, кошую одинъ изъ
моихъ предшественниковъ еще въ исходѣ
прошедшаго столѣтія привезъ изъ своего
пушешествія, и ввелъ въ здѣшней про-
винціи.

Есть по мѣстамъ спрогѣе подражае-
ли какъ въ другихъ вещахъ, такъ и въ
этомъ образѣ Англинскаго Хозяйства, что
они рѣпу сію рядами сажаютъ, раза два
и при обкапываютъ, пошому что она
сидишь разспояніемъ между собою верш-
ковъ на девять и болѣе, дабы чрезъ то
рѣпу сію довести до неслыханной у насъ
величины, что таковымъ способомъ и
произходишь, и чтобъ послѣ выпрае-
ивать оную овцами, а оспапокъ дать до-
ѣсть свиньямъ. Однакожъ эшопъ шрудъ
не къ мѣсту, ибо въ Англіи зимы боль-
шею часью бываютъ сполько умѣренны,
А 2 что

что овецъ на рѣпищѣ въ полѣ держатъ въ загородкахъ, и могутъ всю зиму продовольствоваться рѣпою. Послѣ рѣпы сѣютъ ячмень. Но когда послѣдуетъ необычайно холодная зима, рѣпа замерзаетъ, и весною отъ гнилья своего распросыранетъ неносную вонь.

Лучшій образъ обхожденія съ нею, по замѣчанію. Г. Бергена, когда рѣпу сѣю, давъ ей нѣсколько опросни и получишь шесть или восемь листовъ, вершка на четыре или съ небольшимъ, между собою прорываешь, и припомъ отъ порослонныхъ нравъ очистишь. Упомянутой писателъ говоритъ: въ половинѣ Августа рѣпа съ перваго Іюля посѣянная, бываетъ уже въ большой палецъ пощину или больше. Послѣ того, когда она густо расстетъ, выдергиваешь оной ежедневно по нѣсколько, чрезъ что оставшейся даютъ больше простору; по мѣрѣ выростанія рѣпы, продолжаешь выдергивать оную, прорѣживая мало по малу, и всегда начиная съ одного конца и достигая до другаго, пока пашня совсѣмъ опорожнилась и можетъ обсеяна быть озимымъ хлѣбомъ, что на супескахъ можно производить отъ Воздвиженья, спуская недѣли двѣ, четыре и даже шесть. Выдергиваемая ежедневно рѣпа вся опвозится домой, и какъ сначала корень бываетъ еще малъ, отдають оной вмѣстѣ съ правою скошамъ. Попомъ обрѣзываютъ правую одну и даютъ, а рѣпу мало по малу искармливаютъ или хра-

хранящъ. Съ одной четверти десятины съ небольшимъ содержащъ въ довольствѣ чрезъ 5 или 6 недѣль ченырехъ рогатыхъ скотинъ, или въ случаѣ придачи инаго корма, содержащъ на рѣпѣ множайшее число скотинъ, и совсѣмъ тѣмъ наконецъ вынимающъ четвертей 50 рѣпы. Остальное выкапываніе рѣпы производитъ равномерно мало по малу, ибо ежедневно не больше оной вынимающъ, сколько домашняя скотина справы съ ней сбѣсть можетъ.

Однажды испыталъ я, упоминающъ помянутый писатель, рѣпу эту по Англинскому обыкновенію два раза обкопать, но при семъ опытѣ и осмался: ибо предшесивующее выниманіе молодыхъ рѣпъ съ правую въ кормъ скопамъ совсѣмъ пропало; для того что выдергиваны уже были изрѣдка кой-гдѣ осмалшіяся распѣнія, но цѣлый сборъ въ величинѣ плодовъ хоня много превосходилъ, но мѣрою очень мало: съ четверти десятины не выше семи четвертей съ половиною. Это пріобрѣтеніе противу урону не составляетъ равновѣсія, а еще и того меньше можетъ заплащивъ издержки, когда обкапываніе производитъ наймомъ. —

Вся доброта этой рѣпы состоитъ въ томъ, что когда у насъ въ сѣверной Нѣмецкой землѣ начнетъ оказываться въ свѣжихъ кормныхъ травахъ недоспащокъ, а именно съ начала Сентября, можно тогда

рѣпы эшой (ежедневно понѣскольку выдерживашь, а что вынуто будетъ, замѣняешся лучшимъ опроспаніемъ осшавшейся, слѣдственно сполькожъ онэй получишь можно, какъ бы и прогана она не была; почему рѣпу сію должно счишашь между опличнѣйшихъ нашихъ кормныхъ правѣ. Хотя же въ это время поспѣвають и ранніе картофели, можно же имѣшь и другія въ кормѣ упопреляемые распѣнія; однако за первые въ Сенсіябрѣ изъ доброй воли еще не принимающся; не рѣдко же мѣшашь тому прибираніе хлѣба; а правы бывающъ опчасни не въ довольномъ количествѣ, частью же недоспашочной доброты. — Впрочемъ достовѣрно, что коровы водяную рѣпу ѣдятъ очень охотно, и есшли осшавишь имъ на выборѣ, то при оной за картофели не примущся.

Когда по сему образу кормишь рѣпою, и часть оной еще въ позднее время сбережена бышь можетъ, осшатку должно дашь совершенно выпѣшь, что можно узнать по краснѣющей правѣ. Случается это съ половины Октябрю, почему въ прокъ осшавленную рѣпу надлежитъ вынимашь не съ половины Сенсіябрю, но въ показанное время ея зрѣлости; ибо впрочемъ она долго не пролежитъ и загниваетъ. По вынущіи оной изъ земли, должно оную обрѣзашь такъ, какъ предписано о малой рѣпѣ, и въ заспѣни разсыпавъ тонкимъ слоемъ, дашь наружной кожѣ ея засохнуть.

Послѣ

Послѣ того на высокомѣ мѣстѣ, куда вода дослупать не можешъ, сдѣлашъ ямы паковыя же, какъ выше описаны для карпифелей, но закрывашъ ихъ не соломою, или льнянымъ обмалемъ (кашрика), или длиннымъ легкимъ сухимъ конскимъ навозомъ; ибо рѣпа эпа подѣ теплою покрышею очень скоро разгорячается, отъ чего вся сгниваетъ; къ тому же въ навозъ очень легко влажность вбирается, мало помалу каплями собираешь и на рѣпу капать можешъ, и шѣмъ споспѣшествовать ея сгниванію. Довольно засыпашъ оную пещомъ или землею столько, чѣтобъ морозъ не дошелъ, ибо она легко промерзаетъ. Такимъ образомъ прозимовавшая рѣпа весною оказывается несравненно свѣжѣе и вкуснѣе, нежели другая, въ погребѣ хранившаяся, чѣто равномерно примѣчено съ морковью и карпифелями. Въ погребахъ влажныхъ рѣпу сію держашъ не хорошо, для того чѣто оная либо легко сгниваетъ, или скоро прорастаетъ, шрупляветъ и теряетъ свою силу. Кому угодно рѣпу уберечь еще долѣе, долженъ шотѣ по прошествіи зимы оную изъ ямъ вынуть, и перенести въ сухое мѣсто.

Содержаніе рѣпы къ другимъ родамъ кормовъ рогатаго скота опредѣляетъ Г. Бергенъ таковымъ образомъ: въ разсужденіи пишашельной силы содержишся рѣпа къ каршофелямъ, какъ 3 къ 2 или $2\frac{1}{2}$; а какъ сѣи содержишся къ хлѣбу, какъ 2 или $2\frac{1}{2}$

кѢ 1; то и содержаніе рѣпы противъ хлѣба должно полагать какъ 3 или $3\frac{3}{4}$ кѢ 1, а это значить 3 или $3\frac{3}{4}$ шефеля или 6 чешвериковъ или семь чешвериковъ съ половиною рѣпы дають скошинъ столькожъ питанія, какъ 4 или 5 чешвериковъ картофелей, или 2 чешверика хлѣба. Для рогатаго скота рѣпа сія удобнѣе, и предъ зерновымъ хлѣбомъ имѣетъ то преимущество, что въ кормленіи оною сѣно и солома не нужны, и могутъ быть сбережены на другое. Кію по сему опредѣленному числу скошинъ на 16 недѣль запасаетъ около 90 чешвериковъ рѣпы, лучше успѣваетъ, нежели бы опредѣлилъ онымъ въ кормъ 6 или 7 чешвершей хлѣба; ибо припомъ надлежало бы употребить ему фуры двѣ сѣна. Дѣйстви́те же оиъ множайшаго количества въ кормленіи на убой осмаетъ равно іному, когда въ меньшемъ количествѣ только кормить, а не опкармливать. Выше сѣ опышовъ доказалъ я, что гарнецъ картофелей въ кормленіи равенъ пяти фунтамъ сѣна; но полшора гарнца рѣпы равны гарнцу картофелей; припомъ же полшора гарнца рѣпы равны и питательностию. Послику чешвертая доля десятины, не считая выдерживаемой неспѣлою, приноситъ 50 чешвершей рѣпы, то сіе рѣпное количество уподобляется 435 пудамъ сѣна, или 24 возамъ сѣна. А какъ таковое количество сѣна обыкновенно получается съ двухъ десятины съ половиною, то чешвершъ

вершъ десятины, засѣянная рѣпою, приносишь снолькожъ корму, какъ двѣ сѣ половиною десятины сѣна. Положивъ ежедневно на вола или корову 4 гарнца рѣпы, сѣ одной четверти десятины чрезъ всю зиму, считая сѣ половины Сентября до половины Мая, и слѣдственно чрезъ 8 мѣсяцовъ, прокормишь три скотины снолькожъ хорошо, или еще лучше, нежели бы каждая изъ нихъ получала сѣна ежедневно по 12 или по 15 фунтовъ. —

Что же цѣлые округа, а именно имѣющіе не самую лучшую пошву земли, и другими кормными правами не очень пробавившись могущіе, могутъ сею рѣпою скотину свою содержать жирну, и имѣть немалой себѣ доходъ составишь, оное доказываетъ помянутый писатель между прочимъ о Люнебургскомъ Хейдѣ, когда говорилъ сіе: въ большей части Курфирсва Ганноверскаго, въ самой бесплодной Хейдѣ или полѣсье Люнебургскомъ, находилъ я большую половину паровыхъ клиновъ, засѣянныхъ эшою рѣпою. Сѣютъ оную на овечьихъ пригонахъ и по навозу, плаггенъ называемому (эшо снятая поверхность земли или первой слой въ лѣсныхъ мѣстахъ, копорую употребляютъ вмѣсто навозу), приготавливая оной зимою; отсѣявъ же яровой хлѣбъ вывозяишь, и смѣшавъ сѣ песчаную землю двукратнымъ паханіемъ около половины Іюля, и опкармливаютъ осенью воловъ на убой и къ продажѣ; ибо всѣ кре-

спьяне, нѣсколько заживочные, убиваютъ здѣсь про свой расходъ вола, корову или быка; свиньи здѣсь рѣдки; а копорые побогашѣ, шѣ и продаютъ свержь того. Я знаю прикащиковъ, которые откармливаютъ на убой рѣпою воловъ пудъ въ шридашъ и слишкомъ въсомъ; послѣ же продаютъ онымъ по немногу пересыпки изъ азадковъ, и продаютъ шаковыхъ воловъ въ Гамбургъ шалеровъ по 90 и по сту.

Что же самой эшотъ писатель объ означенномъ округѣ утверждаетъ, что по рѣпищамъ сѣмая рожь бываетъ длиннѣе соломою, умолоннѣе и шяжеловѣснѣе, слѣдственно и мучнянѣе, сего я о здѣшнихъ мѣстахъ утверждать не могу; ибо здѣсь пашни низменны и приномъ правяны, въ копорыхъ собачина и другія малыя шрудныя къ испребленію правы чрезъ 4 мѣсяца, пока рѣпа пашни сіи занимаетъ, оную заглушаютъ, а отъ того по рѣпѣ слѣдующая рожь рѣдко бываетъ самая лучшая. На пашняхъ же инаго состоянія рожь по рѣпищамъ очень хорошо родится. По сему Г. Бергенъ сѣвъ рѣпы по паринѣ сѣву оной по жнивью предпочишаетъ, и прибытокъ паринной рѣпы самой по себѣ предъшою опредѣляетъ тако: паринной рѣпы съ десятины сходитъ четвершей 120, и даже 150, а жнивенной рѣпы не больше, какъ 50 и 60 четвершей; слѣдственно содержаніе ихъ между собою, какъ 3 къ 1. Кто же прежде сѣвалъ рѣпу на паровомъ полѣ

полѣ, и хочешъ оной шже число получить со жнивья, долженъ вмѣсто одной десятины засѣвать три. Кто же въ прошивномъ случаѣ сѣвалъ рѣпу по жнивью, то переноса сѣвъ на парину, можешъ засѣвать вмѣсто трехъ десятинъ одну, и получишь рѣпы столькожъ. —

Какъ рѣпа свиньямъ собственно не очень полезна, должно содержанъ на оной шолько овецъ и рогатой скотины. Желаящему откормить оною овецъ, должно сполочь ее мягко и давать смѣшавъ съ рѣзкою. Каждой овицѣ на недѣлю довольно двухъ четвериковъ рѣпы, пока отжирѣетъ она на убой.

Рогатой скотины одной даютъ на день отъ 4 до 6 гарнцовъ. Эта дача къ откормленію на убой достаточна, когда скопина средспвеннаго роста и вѣса; для того что въ откармливаніи рѣпою, равно какъ и другимъ кормомъ, должно брать въ разсмотрѣніе ростъ скопины и рязмѣрять дачу сообразно ея тѣлу. По сейпо причинѣ, что, безъ разсмотрѣнія въ кормленіи бываетъ, одна скопина лучше другой отпѣдается. Кто даетъ корму меньше четырехъ гарнцовъ, меньше получишь и прибыли. Сѣчкою, имѣющею остріе изображеніемъ буквы S, а въ иныхъ мѣстахъ крестомъ, до тѣхъ поръ рѣпу рубящъ въ просторныхъ корытахъ, пока не останетъ куска крупнѣе грецкого орѣха средней величины. Потомъ въ лаханяхъ,
въ

въ которыхъ даютъ кормъ, къ каждой задачѣ рѣзки по столько подмѣшивается рѣснаго крошева, сколько опредѣляется на день, и смачивается по положеніи въ ясли малымъ количествомъ воды, коюрой должно быть въ запасѣ. Кшо, на примѣрѣ, опредѣляетъ даванъ въ день 3 гарнца рѣпы на 6, или 4 гарнца рѣпы на 8 порцій рѣзки, кладетъ на всякую порцію рѣзки по полугарнцу рѣпы. Четыре гарнца рѣпы на 6 порцій соснавляютъ на каждую двѣ шреши, а 3 гарнца на 8 порцій меньше полугарнца. Шеснъ же гарнцовъ, чего очень довольно къ откормленію, должно задаванъ чаще, а не въ каждую по двѣ шреши гарнца раздѣляя.

Что же Г. Бергенъ выше упомянулъ, что рѣпа въ кормленіи имѣетъ преимущество предъ самымъ хлѣбомъ, ибо шѣмъ сберегаются солома и сѣно, разумѣетъ онъ чрезъ это, что больше рѣпою, нежели хлѣбомъ кормить можно, не приключая скошамъ вреда. При всякомъ сухомъ кормленіи солома или сѣно сберегаются, когда придаванъ скошамъ какихъ нибудь питательныхъ вещей. Дѣло относится лишь до количества; и въ этомъ случаѣ всѣ шѣ придачи имѣютъ преимущество, кои съ равнаго пространства земли больше питания скошамъ сообщаютъ, въ кормленіи же большимъ количествомъ исходятъ могутъ. Такъ на прим. десятина земли приноситъ около 200 чепвершей рѣпы, и
сдва

едва 8 четвертей ячменю. Четверть рѣпы столько же въ себѣ питательной силы содержитъ, сколько въ 2 четверикахъ ячменю, а по сему сравненію дославитъ рѣпа въшестеро больше питанія скошамъ. Какъ далѣе пропиту двухъ четвериковъ ячменю четверть рѣпы, или обоего вмѣстѣ ежедневно перваго одинъ, а послѣдней 4 гарнца давашь можно; такъ и рѣзки, когда класъ одну рѣпу прошивъ соломы, 3 гарнца собственно, естли же доброту корма полагаешь, шестью гарнцами меньше потребно; а потому не вычитая въ самой точности, сбережеться шретья доля соломы. Когда же за ничто пропадающую ячменную солому поставишь въ расчетъ уважительно, 5 крестцовъ полагая, и опредѣлишь, что оною одну скошину, давая на день по два снопа, 36 дней рѣзкою продовольствовашь можно съ причею иныхъ вещей; шю эшо время помножь шремя, и сравни съ вышеписаннымъ кормленіемъ рѣпою. Въ первомъ на 108 дней, по 2 снопа на день полагая, изойдешъ всего 216 сноповъ. Въ кормленіи же рѣпою шретьею долею меньше, а именно только 144 снопа; слѣдственно 72 снопа заляжешъ, и меньшей ужинъ ячменю замѣнишь. Теперь положимъ, что 50 четвертей рѣпы, сколько получается оной съ четвертой доли десятины, въ сѣи 108 дней могутъ прокормить 8 крупныхъ скошинъ, полагая на каждую равномѣрно по 4 гарнца. Когда
коли-

количество соломы для одной скопины прочій убытокъ замѣняется, то шѣмъ больше выигрыша сдѣлается рѣпа въ разсужденіи семи скопинъ, и сосланинъ, полагая всегда яровую солому слишкомъ 8 копенъ, не считая въ шестъ разъ множайшаго числомъ сбору плодовъ. Почему при всегдашнемъ и обыкновенномъ кормленіи рѣзкою, зерновую пересыпку употребляя или не употребляя; но во всякомъ случаѣ въ кормленіи рѣпою много соломы и сѣна сбережено, а пришомъ навозу умножено будетъ. —

Могутъ случиться между рубленою рѣпою большіе куски, кои у скопины застрянутъ въ горлѣ, ошъ чего снел задохнуться можеть. Легко можно узнатьъ это по тому, что скопина сдѣлается беспокойна, станеть биться и корму не ѣсть. Удобно сему пособить, вливъ скопинѣ въ горло буылку чего нибудь жидкаго, задравъ ей морду вверхъ, чтобъ ничего не пролилось, а по горлу прижимая пальцами водишь внизъ, и шѣмъ застрявшій кусокъ пропхаетъ въ желудокъ. Въ Люнебургѣ къ шаковому промыванію берутъ прѣсное молоко; однакожъ не лзя сказать, чтобъ молоко въ этомъ случаѣ полезнѣе было воды. Впрочемъ и буылка молока ничего не значить. —

Когда овецъ и рогатыхъ скотовъ кормишь на убой этою водяною рѣпою, и желашъ, чтобъ мясо ихъ не имѣло ощути-
шель-

пельнаго на языкѣ рѣпнаго вкуса, то въ послѣднюю недѣлю по крайней мѣрѣ кормленіе перемѣнишь какою нибудь зеленью, какъ - то каршофелями, морковью или капустою, или въ недоспашкѣ оныхъ, рѣпы мало по малу въ задачу убавляя, придавать больше сѣна, или дробинъ, или барды, и шѣмъ кормленіе заключить.

Такъ въ нѣкоторыхъ домоводствахъ бѣлую или кочанную капусту квасящъ для скошова, и чрезъ то доспавляютъ онымъ пріятной и здоровой кормъ; шожъ можно дѣлать и съ эшою рѣпою. Должно оную скрошишь мѣлко сѣчкою, и накладывать въ кадку пересыпая солью, а попомъ по желанію давать въ кормъ, мѣшая съ соломенною рѣзкою. У кого же посуды не достанетъ, чщобъ весь зимній запасъ вдругъ прибрашь въ оную, шопъ можетъ изъ зимовыхъ ямъ по спольку вынимать рѣпы, сколько посуда помѣститъ. Тогда пріугошование таковое рѣпы полезнѣе, ибо она по прошествіи зимы доспигаетъ крайняго предѣла своей прочности. Когда лзя будетъ оную всю вынувъ перекрошишь и просолишь, доставится шѣмъ выгода, что можно будетъ до самой жашвы скошину кормить кислою рѣпою, кошорая до того времени пролежаъ бы не могла, естли бы ранѣе пріугошовлена была. Паспвенный скотъ получаетъ въ эшой квашеной рѣпѣ доброе предохранительное средство отъ заразительной болѣзни, когда оному
еже-

ежедневно по утру предъ выгоняніемъ въ полѣ давати оной по часику съ рѣзкою. Такъ поступая, въ разсужденіи столько позднаго пріугошовленія рѣпы, доснаваяюшъ себѣ лучшее средство, воспріятіи-спвованъ замерзанію посуды зимою; ибо во многихъ домахъ есль недоснашокъ въ выходахъ, въ кошорыхъ бы можно было уберечь зелень или пригошовленные изъ ней вещи отъ замерзанія. Когда останешся еще добрый запасъ каршофелей, можно часиъ оныхъ по прошесивіи зимы подмѣшиваиъ въ крошиво рѣпное, и чрезъ заквасу еще долѣе ихъ уберечь.

Когда въ разсужденіи всѣхъ полевыхъ и огородныхъ расіѣній нужно имѣиъ добрыя сѣмена въ самомъ лучшемъ ихъ качествѣ, то шѣмъ больше должно старашся о воспианіи рѣпныхъ сѣменъ, кои чрезъ три года могуиъ лежаиъ всхожи, дабы въ недоснапкѣ оныхъ, покупая, не получииъ негоднаго рода или старыхъ сѣменъ.

Должно посему вѣдати, что ранняго сѣву рѣпа не можетъ дати хорошихъ сѣменъ. Хотя оная пуспишъ сшволъ и будетъ цвѣспи, но осенью не доспанетъ времени, чтобъ сѣмена ея совершенно выспѣли.

Кто хочетъ отъ ранней или Майской рѣпы сѣмена получишъ, должно оной поздній сѣвъ произвешъ около половины Юля, въ концѣ Сеншября корни выкопати, и отобрать самые широкіе, имѣющіе ма-
лень-

ленькіе хвостики, зарыть въ землю, и по насущеніи большихъ морозовъ хранишь въ ямѣ до весны; а тогда, какъ морозы кончатся, высадишь вершковъ на 7 между собою, и нѣсколько глубоко, чтобъ тяжелые сѣменные сѣбли, кошорые изъ нихъ выросшущъ, не такъ удобно опрокидывало въшромъ или сильнымъ дождемъ. То же должно наблюдать и съ сѣменными высадками осенней рѣпы.

Есть еще иной путь къ полученію рѣпныхъ сѣменъ. Можно съ 28 Августа послѣ дождя рѣпу посѣять, молодые всходы прорывать, поспороннія sprawy изъ нихъ выпалывать, и такъ оставишь въ зиму. Весною рѣпа пойдетъ въ стволъ, и въ началѣ Іюля принесетъ спѣлыя сѣмена. Таковымъ образомъ полученныя сѣмена хотя можно въ обыкновенное время высѣвать, но кпо далѣе оными запасаться хочешь, долженъ сѣмена получать первымъ вышеописаннымъ способомъ: ибо послѣднимъ образомъ пріобрѣшаемыя навѣрное въ другой или третій годъ выраживающіяся, и по посѣвѣ пойдущъ въ стволы.

Хотя средство, густо распушую рѣпу мало по малу прорывая, упошреблять въ кормъ скотинѣ очень полезно; однако въ разсѣваніи сѣменъ не должно поступать неумѣренно: ибо, когда посѣять густо, прорываніемъ рѣпы управиться будетъ не можно, или много на это упошреблено будетъ времени, а корни осла-

Часть IV. Отдѣл. 2. М

нуш-

нуся понки, шакъ что и остающіяся рѣпы не могушъ достигнуть надлежащаго совершенства. Почему опнюдъ не должно рѣпу шакъ густо сѣять, какъ рѣпное сѣмя или рапсъ. Въ здѣшнихъ мѣстахъ сѣвъ располагается шакъ, что на возѣ навозу считается споловая ложка сѣменъ. Чѣмъ шяжелѣ возы навьючиваются, шѣмъ полнѣ кладуся и ложки. Это значить, что на мѣсто, которое однимъ возомъ навозу угобзить можно, высѣвается сѣменъ ложка. Почему на пространствѣ земли, унавоживаемое шриццанью возами, потребно сѣменъ 30 ложекъ. Есѣли рѣпу намѣрено прорывать, можно на каждую споловую ложку прибавить по чайной ложечкѣ; или можно шакъ мѣру опредѣлить, что на укро земли во 180 квадратныхъ рушъ (тѣ Россійской десятины) потребно сѣменъ 8 фуншовъ (или на десятину 25 фуншовъ).

Нѣкоторые Хозяева у насъ начинаютъ съ паринною рѣпою сѣять горошекъ, и шаковымъ образомъ, что въ послѣднее паханіе горошекъ разсѣявъ мѣлко запаиваютъ, рѣпу же разсѣваютъ сверьху, и легкою бороною заскораживаютъ. Когда горошекъ достигнетъ половины своего роста, или начнетъ цвѣсти, выдерживаютъ оной и употребляютъ въ кормъ; или въ скудныхъ мѣстахъ на сѣно свозятъ въ удобное мѣсто и засушиваютъ. Нѣкоторые въ равномъ намѣреніи скашиваютъ го-
ро-

рошекъ, сушатъ въ сѣно, а опрасающій уже выдергивающъ мало по малу къ употребленію въ кормъ зеленую. Но въ этомъ случаѣ предполагается, что пашня не поща, но хорошо унавожена, и можетъ быть ранѣе обыкновеннаго обсеяна, чтобы рѣпа корнямъ горошковымъ, въ толщину не растущимъ, не помѣшала, и успѣли бы оныя ростъ свой кончить. Видимо, что въ этомъ образѣ сѣянія сорныя травы не могутъ слишкомъ вырастать, выросшія же будучъ отчаспи скошены съ горошкомъ, а потомъ выдерганы. Выдергиваніе же постороннихъ травъ изъ рѣпы и тамъ нужно, гдѣ она одна посеяна. Что же сурѣпица, которая изъ всѣхъ сорныхъ травъ болѣе всего на рѣпищахъ выходитъ, въ здѣшнихъ мѣстахъ въ образѣ зеленого навозу на возвышенныхъ песчаныхъ пашняхъ подъ сѣвѣ ржи съ великою употребляется пользою, о томъ прежде въ своемъ мѣстѣ замѣчено. А какъ это здѣшніе крестьяне въ первыхъ числахъ Сентября совершаютъ, примѣчаютъ, что рѣпа по вырваніи сурѣпицы, за которою часто и листовъ ея видно не бываетъ, въ ростѣ своемъ основанья не имѣла, и сколько густо сурѣпица по рѣпищу ни росла, рѣпѣ не мѣшала. Изъ того объясняется, что съ рѣпою высѣваемый горошекъ, оной, хотя бы выдернуть его и въ половинѣ Сентября, совсѣмъ вредить не можетъ, а потому, хотя сіе еще и не испытано, очень

вѣроятно, что выдергиваніе горошку, въ-
порочно опросшающаго, совсѣмъ не нужно, а
можно оной косить: ибо шрешіе опросша-
ніе горошку и сурѣпицы, когда она естъ,
въ половинѣ Сентября уже бываетъ сла-
бое, и рѣпа лисы свои можетъ выбивъ раз-
пространить, и всѣ постороннія расшѣнія
заглушить. Когда же случатся теплыя
осеннія ночи, и не выдернутый горошекъ
въ шрешій разъ опроситъ, то и въ
этомъ случаѣ можно скорѣе отъ онаго
рѣпище освободить косою, нежели выдер-
гиваніемъ. Естлижъ послѣдующъ холод-
ныя ночи и морозы, горошекъ пошчасъ
оштанетъ, а рѣпа возьметъ верхъ.

Еще въ разсужденіи сѣву рѣпы замѣ-
титъ должно, когда по высѣвѣ оной слу-
чится сильной дождь, можетъ землю такъ
убить, что естли оная по свойству сво-
ему не рыхла или не песчана, то сѣмена
совсѣмъ взойти не могутъ и весь сѣвъ
пропадетъ. Въ отвращеніе сего надле-
житъ таковую землю проскородить лег-
кою бороною и учинить шѣмъ опять рых-
лою. Въ огородахъ же употребляющъ вмѣ-
сто бороны грабли, коими удобно гряду
взрыхлить.

Что пашня, на которой рѣпа подъ со-
ху сѣется, должна быть пахана глубоко,
само по себѣ разумѣется: ибо впрочемъ
идущіе въ глубину корни прорахъ не
могутъ, и въ ростъ своемъ задержаны бу-
дутъ. Въ здѣшнихъ мѣстахъ подъ па-
рин-

ринную рѣпу прѣуготовляютъ шаковымъ образомъ: въ началѣ Іюня возятъ навозъ, разравниваютъ и запахиваютъ; по нѣсколькихъ недѣляхъ землю двоятъ и скородятъ, чѣмъ шѣмъ выворотить корни собачины и другихъ травъ. Когда запахиваніе навозу происходило мѣлко и шакъ, что навозъ, кошорой долженъ быть дробенъ и не соломистъ, хорошо покрытъ землю; тогда при двоемъ сошникъ пускаютъ глубже, чѣмъ навозъ не обнажитъ, но опять бы онъ землю закрытъ лежалъ. По нѣсколькихъ недѣляхъ слѣдуетъ шестое паханіе, еще глубже производимое. Наконецъ четвертое подъ сѣвъ, которое производится мѣлко, развѣ только предшестія были не довольно глубоки. Сѣвъ происходитъ вскорѣ послѣ половины Іюля въ сухое время; и естли земля очень суха, то послѣ дождя. У кошораго же крепьянина земля не хороша, шаковой пашетъ пять разъ и шестъ, дабы шѣмъ сколько возможно оную умягчить и очистишь. По состоянію погоды, а именно, когда она шепла и мокра, вырастаетъ со всѣмъ шѣмъ на здѣшнихъ травянистыхъ пашняхъ много сорныхъ травъ, какъ-то сурѣпицы, крапивы, блошной травы и прочихъ; почему многія сѣленія не шаково уже прилѣжатъ къ сѣву рѣпы, пошому что жатвенныя работы, а особливо гдѣ сѣютъ много льну, рѣпу выпалывать не допускаютъ, и начинаютъ прилѣжать къ

сажденію каршофелей, ибо послѣ жашвы могутъ имѣть время оныя обкапывать, и шѣмъ ошѣ постороннихъ шравъ совсѣмъ освобождашь.

29) *Морковь.*

Есть разные оной роды, кои главнѣйше цвѣтомъ корней между собою различествуютъ: 1) обыкновенная желтая морковь; 2) бѣлая морковь; 3) золошожелтая морковь; 4) красная морковь. Желтая лимоннаго цвѣту больше уважается, нежели золошожелтая; пошому что сія скоро загниваетъ и зимою поршится. Однакожъ и золошожелтая за вкусъ красной предпочитается, пошому что послѣдняя часто выходитъ шверда, и не такова прѣшна вкусомъ.

Сверхъ того опшичаютъ родъ *ранней моркови*, которая инако называется *Голландская морковь* или *кароттѣ*, и по состоянію земли лучше большой Нѣмецкой бываетъ вкусомъ, шакже ранѣе поспѣваетъ. Однакожъ она не велика, и рѣдко бываетъ больше шести вершковъ длиною. Сѣютъ оную единшвенно для господскаго стола; Нѣмецкая же лучше наполняетъ горшокъ для служителей. Голландскую морковь не рѣдко сѣютъ въ глубокую осень, ибо молодыя расшвнїя не очень морозу бояшся, и ештли снѣгу нѣтъ, то въ самомъ Декабрѣ всходятъ, а въ веснѣ поспѣваютъ въ кушанье двумя недѣлями ранѣе сѣмыхъ весною. Ештли морковь поспѣяшь

яшь рано осенью, шо въ МаѢ пускаетъ шаковая сѣменные сѣволы. Г. Хагедорнъ пишеть, что въ большихъ городахъ нѣкоторыя садовники разумѣють искусство, сѣмена Голландской моркови высѣвають около половины Сентября, и шаковую морковъ въ слѣдующую весну выдавать за раннюю изъ парниковъ, а пошому продавать дорого. Однакожъ шаковую можно узнать по находящимся на ней обручкамъ, и не покупатьъ.

Обыкновеннымъ же образомъ сѣють морковъ очень рано на паровыхъ грядкахъ, или въ недоспавкѣ оныхъ, на приготовленныхъ съ осени унавоженныхъ грядкахъ, сѣють еще въ Мартѣ, чтобы оную за новину, когда выростетъ въ гусиное перо толщиною, очень рано на столъ подаватьъ.

Не худо въ огородахъ поступать въ особливости по предписанію Экхартову, когда на одной грядѣ съ морковью сѣять крессъ, салашъ, капусту, спинашъ и редисъ; пошому что онѣ уже выдерганы бывъ могутъ, пока морковъ отпростетъ, и больше пространства потребуетъ.

Въ здѣшнемъ мѣстѣ вижу я ежегодно, что крестьяне между льномъ и просомъ сѣють вмѣстѣ морковъ, и очень крупныя корни ея выкапываютъ, въ чемъ и не могутъ имѣть неудачи; пошому что здѣсь подъ ленъ и просо землю не пашутъ, а копаютъ, и обыкновенно выпалываютъ;

послику же морковь въ Августѣ и Сентябрѣ роснетъ въ шолщину, а прежде того больше въ длину проспирается, шо какъ ленъ выбирающъ въ половинѣ Іюля, а просо жнутъ въ началѣ Августа, осипается моркови весь проспоръ на очищенной отъ всякихъ справъ пашнѣ толснѣть. Можно таковымъ образомъ сѣять оную съ сочевицею, горошкомъ и горохомъ.

За два года предъ симъ узналъ я одного крестьянина, очень склоннаго ко всякимъ новымъ опытамъ, коимъ онъ сказывалъ, что ему не однажды уже посчастливилось съ озимою рожью на возвышенномъ песчаномъ мѣстѣ морковь получать, а именно, участокъ земли, къ сему отъ него избранной, обсѣваетъ онъ недѣлечетыре или шесть спустя послѣ Воздвиженья таковымъ образомъ, что запахавъ рожь, однажды проходишь бороною, посѣваетъ морковь, и еще заскораживаетъ. Въ сухіе годы, говорилъ онъ, когда у его сосѣдей въ огородахъ моркови не бываетъ, у него отъ таковаго сѣву никогда въ ней недоспашку не случается; ибо ростъ ржи защищаетъ оную отъ солнца и засухи до пѣхъ поръ, какъ по сжатиі ржи столько уже она укрѣпится, что одна засухъ пропивишся въ состояніи бываетъ.

Я примѣръ сей, отличаящій простаго крестьянина, чишателямъ моимъ съ шѣмъ намѣреніемъ похваляю, чтобъ они ему послѣдовали. Естьли озимыя поля ихъ

ихъ подвергаются рано пасхвѣ скоша, по
оспаются у нихъ клины яровые, на копо-
рые скошину, уже выправивъ озимой клинъ
или жнивье, пускающъ. Если у нихъ не
сѣется въ этомъ клину ржи по жнивью,
яровой ржи или Маршовскаго овса, по мо-
жетъ быть сѣющъ они ранній ячмень на
неправянистыхъ пашняхъ, и на тако-
выхъ могушъ они ошважиться высѣявъ
полгарнца моркови, которой неудача для
опышу ничего не значить.

Сѣвъ моркови въ огородахъ и въ полѣ
можетъ происходить густо и рѣдко, по
мѣрѣ того, больше или меньше лѣномъ
на расходъ оной выдергивать должно. вы-
дергиваніе это такъ распорядиться должно,
чтобъ вырывать корни въ томъ мѣстѣ,
гдѣ оныя сидятъ часто, и чрезъ то бы
имѣющіе оспаться въ осень на мѣстѣ въ
началѣ Августа такъ прорѣдить, чтобъ
получили они между собою проспору вер-
шка на три и чешыре, и полному бы выра-
станію своему взаимно не препящивали.
Если подѣ морковь вывозится навозъ,
долженъ быть оной дробной, чтобъ корни
не раздѣлялись на нѣсколько хвостовъ. Не-
худо по сему при свѣжемъ унавоживаніи,
употребляя не очень дробной навозъ, зе-
млю копать съ осени, и сѣвъ произво-
дитъ съ половины Апрѣля.

Выкапываніе моркови изъ земли про-
исходитъ въ огородахъ обыкновенно по-
слѣ Воздвиженья. Морковь обрѣзываютъ,

праву отнимають, и хранятъ въ погребахъ, а того еще лучше въ ямахъ.

Ямы для сего копать лучше всего въ аршинъ. съ четвертью шириною, и во сколькоужъ глубиною; обрѣзанную морковь въ нихъ покласть, очисливъ съ нее одну только праву, а верхней часи корни не прихватывая. Траву эту очень охотно ѣдятъ коровы, когда оную мелко изрубивъ смѣшать съ рѣзкою. Когда моркови въ зиму прибирается много, располагають упрятываніе оной въ ямы повременно, чтобы успѣть изкормить ея траву, сколько пріятную и здоровую коровамъ и свиньямъ. Въ нѣкоторыхъ домахъ поступаютъ и шаковымъ образомъ, что праву еще съ сидящей въ землѣ, но ростъ свой кончившей моркови срѣзывая, въ кормъ скопинъ употребляютъ, укладывая же очищенную отъ правы морковь въ ямы, спараются верхній слой сколько возможно уравнишь глаже.

Наполняютъ шаковымъ образомъ яму, оставивъ на 4 вершка пусова мѣста вверху, насыпаютъ на морковь всю вынутую землю обратно, и чтобы морозъ не прешелъ, распростираютъ ворохъ земли на аршинъ мѣста шире ямы вокругъ. Понеже величина шаковыхъ ямъ можетъ быть произвольная, однакожъ дѣлають оную шакову, чтобы всю морковь вдругъ можно было вынуть, когда опрыывать яму для зимняго употребленія; и пакъ, у ко-

го моркови много, дѣлають нѣсколько
ямъ, и одну по одной опоражнивають.
Главное обшояшельство всѣхъ шаковыхъ
ямъ для всякихъ корневыхъ расшнѣй,
чтобъ они были на шаковомъ мѣстѣ, ку-
да бы вода подшекашъ не могла, ибо опъ
шого нижній слой шопчасъ загниваетъ.

Въ нѣкошорые годы, кои во время
цвѣшу сѣменныхъ высадковъ бывають мо-
кры и холодны, себирается мало, и при-
шомъ худыхъ сѣменъ; почему оныя быва-
ють шогда рѣдки и дороги. Но какъ мор-
ковныя сѣмена 6 и 7 лѣтъ могутъ ле-
жать всхожи, можно оныхъ въ добрые го-
ды столько запасать, чтобъ никогда въ
нихъ недоставку не было. Ошбирають кор-
ни желшполимоннаго цвѣша, одинакой до-
брошты, чисшы, неповрежденные и сре-
дней величины, хранить оные въ особли-
выхъ не такъ глубокихъ ямкахъ, каковы
прочія, и высаживать въ половинѣ Апрѣ-
ля на мѣстѣ, освѣщаемомъ полнымъ солн-
цемъ на копанныхъ мягкихъ грядахъ ря-
дами, по крайней мѣрѣ вершковъ на 7
одно опъ другаго разекуяніемъ, и такъ,
чтобъ шолько верхній ростокъ изъ зе-
мли видимъ былъ. Поспѣвшія сѣмена обы-
кновенно со стеблей обширають руками,
и къ удобности сѣву щепинки съ нихъ
опдѣляются, чтобъ сѣмена оными ни за-
что цѣпляться не могли. Въ холодную по-
году сѣмена долго не всходятъ. Когда же
высѣяны поздно весною при шеплой пого-
дѣ,

дѣ, всходятъ дней чрезъ 9 и 12. Должно беречь ихъ въ мѣшечкахъ въ сухомъ мѣсцѣ.

Въ моркови имѣемъ мы очень здоровую пищу для человѣковъ и скотовъ. Свѣжую морковь дають дѣтямъ ѣсть отъ глистовъ. Располченная свѣжая же морковь, прикладывая наружно, по испытанію новыхъ врачей, оказалась полезною въ нарывахъ, ракъ зараждающихъ и застарѣлыхъ.

Примѣчено, что никакое расквѣтіе, кромѣ хлѣбныхъ зеренъ, не можешь столько въ дойныхъ коровахъ молока умножить, и учинять оное вкуснѣйшимъ, какъ морковь; почему упоиребляютъ оную съ великою пользою въ кормленіе скотины. Въ особливо-сти же въ нѣкоторыхъ домахъ кормятъ оную воловъ и овецъ, кои отъ того получаютъ очень вкусное мясо и жиръ къ копченію и соленію, такъ что уподобился Гамбургской солонинѣ. Кормятъ же оною и гусей, отъ чего бываютъ они очень жирны и мясисты. Дають имъ оную шолченую, смѣшавъ съ крупнымъ пескомъ или располченнымъ мѣлко кирпичемъ. Но въ послѣднюю недѣлю, должно ихъ кормить однимъ овсомъ или чинымъ зерномъ, а впрочемъ жареное ихъ мясо будетъ называться морковью. Свины также любятъ морковь: кормятъ ихъ на убой шолченою или крошеною красною морковью, подбавляя четвертую долю ячменныхъ дробинъ. Свинина, равно какъ и говядина, если скоты опкармливаемы были морковью, опли-

опличается онъ гусятины пѣмъ, что не примѣнно въ нихъ бываетъ морковнаго вкусу. Предпринимая откармливаніе морковью всякихъ живошныхъ, должно того смотрѣшь, чтобъ моркови на весь кормъ доспало; ибо, когда оной не доспачетъ, будутъ презирашь они всякой кормъ, для того что кажется оной имъ не, шаковъ вкусенъ: въ этомъ случаѣ должно начинать кормленіе иными вещьми, а подъ конецъ уже давать морковь.

Лошади также очень любяшь морковь. Не безвизвѣспно, что въ случаѣ болѣзни ихъ, степницею или зобомъ называемой, кормяшь ихъ двѣ недѣли мѣлко искрошенною морковью, съ овсомъ смѣшавъ, и давая по ушру прежде всякаго корму. Еще лучше будетъ, когда въ продолженіи сего леченія не давать имъ никакого иного корму, oprичъ сего.

Одинъ Англинской Хозяинъ увѣдомляетъ, что онъ съ хорошимъ послѣдствомъ кормитъ лошадей своихъ вмѣсто овса морковью съ пересыпкою соли. Лошади сїи ежедневно получаютъ при задачи корму, и въ каждую по 8 фунтовъ моркови. Въ каждую же задачу подбавляють по 72 золошника гречишной муки (овсянка пожъ способна), и 12 золошниковъ поваренной соли. Однакожъ закладываетъ онъ лошади не вдругъ по 8 фунтовъ моркови, но раздѣляя дачу въ два и при раза, и между каждою дачею прида-

давая нѣсколько сѣна, — какъ вообще и всякое кормленіе лошадей располагашъ надлежитъ. Соль въ морковь кладутъ для того, чѣмъ лошади охотнѣе ѣли сѣно, а не столько бы пили, какъ то бываетъ отъ кормленія ихъ однимъ овсомъ. Лошадь отъ сего кормленія не имѣетъ одышки, и получаетъ крѣпость и силу; а при томъ кормъ этотъ въ половину дешевле овса. — При семъ долженъ я упомянуть, что соль въ деревянные ясли втирается, и привлекаетъ лошадей, когда кормъ изойдетъ, обкусывать дерево, отъ чего ясли со временемъ изглаживаютъ въ ямки и скважины. Я имѣлъ случай примѣтить это у одного Дворянина въ Маркѣ Брандбургскомъ, копорой всякую недѣлю ѣдалъ сельдей, и своимъ каретнымъ лошадямъ велѣлъ отдавать головки, хвосты и икру со внутренними, къ чему онѣ привыкнувъ съ великою охотою ѣли, но ясли отъ вобравшейся въ нихъ соли совсѣмъ изглодали. Чѣмъ такого глосанія ясель не происходило, лучше соль давать лошадямъ въ поилъ, разводя оную въ ведрахъ съ водою, или лошадей, такъ какъ въ конюшняхъ знатныхъ домовъ обычайно, когда онѣ кормъ свой сѣдаютъ, переворачивать, и привязывать за обротъ къ кольцамъ у столбовъ, гдѣ оныхъ чистятъ.

Морковной сиропъ или *сокъ морковной*, копорой увариваютъ до густоты прочнаго сиропа, служитъ во многихъ до-

домахъ вмѣсто меду и сахару; возятъ оной великимъ количесствомъ изъ Халберштадскихъ городовъ въ Берлинъ ежегодно на продажу. Это произведеніе нашихъ временъ, которое не токмо небогатые люди къ подслащиванію своего цикорнаго кофе вмѣсто сахару употребляютъ, но и средняго состоянія особы къ подслащиванію нѣкоторыхъ блюдъ въ поварнѣ (ибо отъ меду нѣкоторыя горячія бѣсвы получаютъ горечь, и только въ кислыхъ онѣ служить можеть) употребить могутъ. Пріуготовленіе сего сиропа описано въ Лейбцигскихъ собраніяхъ (*Leipz. Samml.*) на 1747 годъ, коюрой я внесу сюда:

1) Возми 7 коробовъ моркови, обмой оную чисто, изкроши сѣчкою мелко, положи въ кошелъ, и влей ведро или два воды.

2) Вари на умѣренномъ огнѣ до шѣхъ поръ, какъ совѣмъ разваришся, что происходитъ часа въ два.

3) Слей тогда въ чистую кадку, воду сцѣди, морковь клади въ холстинной мѣшокъ, и выжимай сокъ въ кошелъ на чисто.

4) Кошелъ съ выжатымъ сокомъ вари на умѣренномъ огнѣ до шѣхъ поръ, какъ сокъ сгустится.

5) Этошъ сгущенной сокъ разлей по горшкамъ, замажь на нихъ крышки, и поставь въ холодное мѣсто: оной можеть стоять не повредясь года два и больше.

6)

6) Можно эшотъ сокъ мѣшашъ съ другими сиропами, отъ чего будетъ онъ еще прочнѣе.

7) Эшотъ сокъ можно ѣсть съ хлѣбомъ: оной бываетъ вкуснѣе сахарнаго сиропу, ароматнѣе и прямо сахаристъ, но непрошивенъ.

8) Почему можно оной класъ вмѣсто сахару во всякія кушанья, въ большемъ и меньшемъ количествѣ въ разсужденіи того, какъ сладко кѣ подсласнитъ хочетъ; можно же употреблять его въ варенья и консервы.

9) Цвѣшотъ онъ черновато-шемень, и подобенъ сахарной пашакѣ, и отъ увариванія лишается своего морковнаго вкуса.

10) Кому угодно для печенія или просто въ кушань учинитъ его еще прѣшнѣйшимъ, можетъ подложить въ него по желанію пряныхъ зелѣй, и уваритъ еще гуще.

11) Выжимки морковныя, при вареніи соку остающіяся, составляютъ прекраснѣйшій кормъ всякимъ скошамъ, и могутъ для сего хранены бытъ.

12) Сливаемую воду можно наливать на свѣжее крошиво морковное къ варенію, отъ чего сокъ выйдетъ еще лучше; напосядокъ эша вода очень здорова коровамъ и свиньямъ.

13) Чѣмъ свѣжѣе морковь, тѣмъ способнѣе она къ вывариванію сего соку. (Полику моркови бываютъ разнаго рода, и
однѣ

однѣ слаще другихъ, какъ выше упомянуто, то должно отбирать желтолимоннаго цвѣту, яко сладчайшія всѣхъ.)

14) При вареніи не должно разкладывать большого огня, но такъ только, чтобъ вареніе непрестанно поддерживалось, а пошому дровъ на это пошребно не много.

15) Этотъ сиропъ составляетъ отъмѣнное лѣкарство отъ кашля и опягощеній груди, произходящихъ отъ клейкихъ мокротъ и оспрыхъ. Оной, бывъ употребляемъ за лѣкарство, слабитъ нѣсколько, но чрезвычайно умѣренно, услаждаетъ кровь, смягчитъ, очищаетъ и предохраняетъ отъ гнилости, и проч. —

Другіе въ пріугошовленіи сего сиропа поступающъ иначе, шѣмъ, что морковь оскребашъ сперва, потомъ испирающъ на теркѣ, и выжавшой изъ нее сокъ уваривающъ. Оскребаніе кажется мнѣ для того не хорошо, что лучшая сладость содержишя въ пошеръхности сихъ кореньевъ, и чрезъ это пропадаетъ. Нужно моркови только на ночь положить въ посуду, наполненную водою, отъ чего вся находящаяся на нихъ земля и грязь отмокнетъ. Послѣ скласъ морковь въ ивовыя плешушки, и до шѣхъ поръ обливашъ водою, пока оная начнетъ спекать чиста; при обливаніи плешушку съ морковью должно нѣсколько разъ потряхивашъ. Вся она въ этомъ случаѣ столькожъ чисто обмоется, какъ бы перетирана была по одной моркови.

Часть IV. Отдѣл. 2. Н Изши-

Изпираніе морковей на терку въ боль-
шомъ количествѣ требуетъ много време-
ни, почему выгоднѣе шлочь оную въ ма-
шинѣ; ибо работа шѣмъ очень сокращи-
ся. Можно же крошить оную сѣчкою, по-
добно какъ капусту, и потомъ сокъ вы-
жимать; положимъ, что въ этомъ случаѣ
сокъ не начисто выгнѣшенъ будетъ, но
оной не пропадетъ, потому что въ вы-
жимкахъ употребился въ пользу домашнихъ
скотовъ.

Что же въ выше приведенномъ пред-
писаніи упомянуто 7 коробовъ, то мѣра
здѣсь ничего не значить: ибо оную можно
соображать количеству сыропа, сколько
оного кпо выварить желаетъ. Больше
важно, чтобы по предписанію употреблять
свѣжую морковь: для того что чѣмъ
старѣе и лежалѣе морковь будетъ, тѣмъ
больше сообщается въ нее правяной вкусъ,
которой сыропъ учинить прошивнымъ.
Почему лучшее прѣуготовление сего сыропа
осенью, какъ скоро морковь изъ земли
выкопана будетъ.

Равномѣрно не должно пренебрегать
выбора родовъ моркови, какъ и выше за-
мѣчено. Посѣва земли, на которой морковь
родилась, также имѣетъ вліяніе на доброту
вкуса сыропнаго. Морковь, родившаяся на
высокомъ песчаномъ мѣстѣ, на прим. въ
виноградныхъ горахъ, бываетъ несравнен-
но вкуснѣе родившейся въ черноземѣ. Въ
послѣдней примѣшенъ правяной и земля-
ни-

нистой вкусъ, какъ-то я у себя замѣ-
тишь случай имѣлъ. Мой огородъ содер-
жишь влажной болошной черноземъ, въ
которомъ, естли лѣто будетъ неощмѣн-
но сухое, лучшія сѣмена выраживаются,
и морковь выходитъ не желтая или кра-
сная, но бѣловатая. Но хотя въ сухой
годъ и получишь желшину, однакожь не
имѣешь такового ароматическаго вкуса,
какъ морковь, сѣмая на здѣшнихъ возвы-
шенныхъ песчаныхъ пашняхъ въ полѣ.

Напоследокъ должно предложить срав-
неніе въ разсужденіи обоихъ прѣугошвленій
морковнаго сиропа, по которому можно
довести оный къ лучшему вкусу. Мнѣ
кажется, что первымъ способомъ полу-
чаемый сиропъ не таковъ можетъ быть
пріятенъ вкусомъ; однакожь это оставляю
я на рѣшеніе твоѣ, кои сиропъ обоими
способами пригошвишь и сравнишь мо-
гушь. Но мнѣ върояннѣйшимъ представ-
ляется, что выжатой изъ красной шол-
ченной моркови, и потомъ вареніемъ огу-
щенной сокъ можетъ быть лучше вку-
сомъ; а это заключаю я изъ того, что
нѣкогда нашелъ я у крестьянина напитокъ
морковной, сдѣланной холоднымъ пушемъ
(т. е. безъ огня или варенія) изъ шолче-
ной моркови, а именно: шолченную мор-
ковь налилъ онъ холодною водою, далъ
закиснуть и разлилъ по бутылкамъ. При
наливаніи этотъ напитокъ былъ такъ
чистъ, какъ вино, и пѣнился, а вкусъ имѣлъ

Н а острый

острой и пріятной, подобной самому лучшему бѣлому пиву. Напрошивъ вареная морковь, подаваемая на столъ, далеко не имѣетъ того ароматичнаго вкуса, каковъ въ сырой моркови, и копорой отъ варенія пропадаетъ. Вторымъ способомъ морковь только однажды въ сиропъ варится, и такъ по оному пригошвленнѣ сиропъ вкусомъ долженъ имѣть преимущество.

30) *Свекла, инако Бета и Манголтъ называемая.*

Въ старинныхъ справникахъ и садовническихъ книгахъ показаны различныя роды свеклы, которые *Линней* прежде считалъ за шпродія, и опредѣлялъ только одинъ родъ свеклы; но послѣ по замѣченнымъ особливымъ различіямъ принялъ оной три рода, какъ то:

1) *Двуцвѣточная морская свекла*, beta maritima, копорая на морскихъ берегахъ въ Англіи и Голландіи дикорастущая находишся, и отпличается отъ обоихъ слѣдующихъ родовъ тѣмъ, что въ первый годъ по посѣвѣ цвѣтетъ, имѣетъ навкосѣ учрежденные листы, носитъ два рядомъ стоящихъ цвѣта, и сосудцовой лиспокъ въ оныхъ безъ разрѣзу.

2) *Огородная бѣлая свекла*, или обыкновенной трехъ-цвѣточной манголтъ, beta cicla у *Линнея*, имѣетъ по *Линнееву* замѣчанію три рядомъ стоящихъ цвѣтка, и въ оныхъ цѣльные сосудцовые листки. *Г. Миллеръ* присовокупляетъ къ симъ признакамъ ошпроконечные корни, зплоть къ
сство-

стволу распуштіе лисы, и длинныя въ стороны наклоненныя цвѣточныя колоски.

3) *Красная свекла*, или обыкновенной многоцвѣтной манголтъ, *beta vulgaris*, носитъ спѣсненно между собою сидящіе цвѣтки съ сосудцовыми лисами, кои сзати разрѣзаны. Какъ въ первомъ родѣ спелющіеся по землѣ стебли еще въ спарину, какъ и нынѣ у Г. Миллера различіе соснавлиающъ, такъ этотъ третій родъ ошмѣняется своимъ прямо распуштимъ стволѣмъ. Естли принятъ въ сосудцовыхъ лисахъ различіе за вѣрное, то имѣемъ мы по крайней мѣрѣ два рода, для того что прочія части ошъ образа воздѣланія и другихъ обстоятельствъ перемѣняющъся могушъ.

Второй родъ, которой въ прошивоположеніе третъему называется бѣлая свекла, *Римская капуста*, а ошъ пѣкорыхъ садовниковъ просто манголтъ, имѣющъ тонкой, отчасти корешкой, волошистой корень; стволъ иногда больше зеленоващъ, а иногда больше бѣловащъ; лисы сплошно къ стволу сидящіе, продолговатыя и на копье схожіе; корневые же лисы толстые, сочныя, узкіе и широкіе, на толстыхъ стебляхъ. Подъ французскимъ названіемъ извѣстная *Бетте Кардъ* *Bette carde* естъ называемая у *Баухинія* *beta major fol. latissimis*, т. е. большая свекла широколиственная; бетте кардъ означашъ не иное что, какъ Пикардскую свеклу,

клу, пошому что въ этой странѣ она лучшая родится. Нижняя часть этой свеклы бываетъ иногда вершка въ полтора шириною и совсѣмъ бѣла. Есть этой бѣлой свеклы красное опродѣ, имѣющее корень хотя бѣлой, но съ красиною, также черноватокрасные лиспы. Этотъ родъ воляшъ въ огородахъ больше для лисновъ, нежели для кореньевъ, и рѣдко въ огородахъ обыкновенныхъ, хотя оной заслуживаетъ больше уваженія повсюду; для того что лиспы оного очень рано весною опраспываютъ велики, и въ вареньи мягче капустныхъ, шакъ и свекольных прешьяго рода: то для простаго народа очень полезно изъ нихъ варить первыя въ году зеленныя и неубыточныя щи; ибо оныя за мягкостию своею не требуютъ подбавки многого сала. Польза сихъ лисповъ проспирается чрезъ все лѣто. Когда ихъ срубить вмѣстѣ съ лиспами зеленой или синей капусты, то сѣя лучше и скорѣе разваривается, бываетъ мягче и вкуснѣе, а при томъ меньше требуетъ подкладки сала, елею или масла, каковыя жирности развариванію способствуютъ, и что подмѣсь сихъ лисповъ замѣняешь. Простолудинъ безъ всякаго искусства можетъ очень рано весною свеклу сѣю имѣть, когда корни, кои не очень бояшся морозовъ, и кои только листомъ или соломою прикрывъ слѣдуешь, посадить въ своемъ огородѣ, то въ самомъ началѣ Апрѣля пу-
стяшъ

спяшѣ они уже листьы свои, шѣ, кои остави-
лись маленькими еще съ осени, и кои
при уменьшеніи морозовъ очень скоро уве-
личивающіяся.

По таковому основанію можно све-
клу сію очень одобришь въ зеленой кормѣ
скопамѣ, такъ что въ нѣкоторомъ намѣ-
реніи большую свеклу, которую съ нѣкто-
раго времени начали множественно водить,
и о которой вскорѣ говорено будетъ,
если не оставишь совсѣмъ, то на ряду
съ нею посадишь должно; ибо не взирая
на то, что сія по употребленіи лѣшномъ ли-
стовъ предлагаешь больше свои корни
въ кормѣ скопинѣ; то свекла, о которой
рѣчь идетъ, замѣняетъ недоспѣшкѣ кор-
ней, множественными своими и рано по-
спѣвающими листьями, кои дають либо
толченныя, или крошенныя съ рѣзкою ско-
памѣ; ибо въ разсужденіи ранняго зеленого
корму въ году, должно только, какъ вы-
ше сказано, оставишь зимовать на мѣстѣ
корни, и получишь, какъ скоро кончатся
морозы, очень рано весною большіе листьы
и во множествѣ.

Можно эшотъ мангольшѣ на паровой
грядѣ рано посѣять, и послѣ расшѣнія
высадишь на добрую хорошо унавоженную
землю. Влажная земля ему не мѣшаетъ:
чѣмъ чаще съ него листьы обламываются,
тѣмъ лучшіе выходятъ листьы для пова-
реннаго употребленія. А чтобы корни силь-
нѣе оныя отращали, должно ихъ коровь-

имѣ навозомѣ въ концѣ весны обложишь, и землю обгрести.

Кромѣ вышесказаннаго о поваренномѣ употребленіи, и которое касается только листовѣ, съ него обламываемыхѣ, кои послѣ скошамѣ достаются, бдящѣ и корни со спарженнымѣ соусомѣ: опшваривающѣ оныя, и слупляющѣ съ нихѣ кожу. Свекла сія имѣетѣ оспрой вкусѣ, копорой однако у нее опшнимается неоднократнымѣ повпореніемѣ обвариванія.

Выше сказано, что на корни сего растѣнія не лзя надѣяться попому, что ростѣ ихѣ больше въ листы идетѣ. Осенью вынимающѣ ихѣ сполько, какѣ покажется излишнихѣ сверхѣ опшавляемыхѣ въ зиму, обмывающѣ оныя, крошашѣ мѣлко сѣчкою, и дающѣ свиньямѣ, мѣшая сѣ дробинами, или коровамѣ сѣ рѣзкою. Въ разсужденіи сѣменныхѣ высадковѣ наблюдается тоже, что сказано о претшемѣ родѣ свеклы.

Эпошѣ *третій родѣ* опшличается величиною и видомѣ корней, также и краскою опшчаспи, отѣ чего и получающѣ сполько различныхѣ названій, какѣ-то: *красной манголтѣ сѣ рѣвистымѣ корнемѣ*, *beta rubra radice* рае у Баухинія, *красная свекла*, *черной манголтѣ*, *огородная* и *столовая свекла*. Это обыкновенная наша и всюду водимая свекла, которую употребляющѣ въ холодной салатѣ, къ разнымѣ щеплымѣ и холоднымѣ мяснымѣ блюдамѣ,

а особливо зимою, когда другіе салашы рѣдки. Кладушъ темнокраснаго цвѣта корни на зиму въ шеплои выходѣ, по надобности разваривающъ или запекающъ мягко, рѣжущъ кружками, и кладушъ въ горшки съ хрѣномъ, въ мѣлкіе жеребейки изрѣзаннымъ, и пиномъ, а потомъ наливающъ уксусомъ. Это прѣготовленіе по временамъ повпоряется, такъ что въ нѣкоторыхъ странахъ и на службѣ сполъ подаютъ сію прѣготовленную свеклу. Чѣмъ краснѣе таковая свекла, тѣмъ составляеши лучшее украшеніе спола, и тѣмъ вкуснѣе бываеши. Въ моемъ огородѣ, сосѣднемъ изъ влажнаго чернозему, примѣчаю я, что тѣ корни, съ копорыхъ лѣтомъ листы обламывали, темнокрасной цвѣтшъ свой теряютъ, и тѣмъ больше блѣднѣютъ, чѣмъ больше обламываніе это происходило.

Понеже въ нѣкоторыхъ домахъ очень рано въ году желаютъ ѣсть свекольной салашъ, то сѣютъ оную на паровыхъ грядахъ и послѣ разсаживаютъ. Она требуетъ, подобно предшедшему роду, тучной и хорошо уработанной земли. Для сѣменныхъ высадковъ должно отбирать самыхъ красныхъ свеклы, потому что впрочемъ коренья сіи легко выраживаются. Сѣменные свеклы очень поздно осенью выкапываютъ, кладушъ въ погребѣ рядами въ песокъ, но не совсѣмъ засыпающъ, а головки выставляютъ: такимъ образомъ

легко ихъ убересть какъ для высадковъ, такъ и въ пищу. Сѣменные спволы не рѣдко вырастающъ въ человѣка вышиною, и пошому должно ихъ поддерживать жердками на сошкахъ. Сѣмена всхожи бывающъ 4 года, на открытомъ воздухѣ высѣвающся въ Апрѣлѣ, и загибаются на полвершка глубиною. Нѣкоторые сажаютъ сихъ сѣменъ зерна по 2 и по 3 въ одну ямочку, отъ чего они вырастающъ крупны; для того что ихъ не пересаживающъ, но прочія побочныя выдергивающъ, и только одну на мѣстѣ проросшно оставляющъ.

Большая манголтная рѣпа, толстая свекла, Бургондская свекла, Kunkelrübe, Kangerübe, Kangerz, Kaunfchen, beta sylvestris radice crassa, кажется бытъ вырождкомъ красной свеклы, о копорой выше говорено было, что она меньше сладостна бываетъ вкусомъ, чѣмъ больше отъ краснаго цвѣта отходитъ, или бѣлѣетъ. Сія Бургондская свекла за отпростою вкуса въ пищу человѣкамъ совсѣмъ не годится. Листы и корни опредѣляются единственнно скопамъ въ кормъ.

Ошибаются, когда думаютъ, чтобъ свекла сія въ числѣ кормныхъ нравъ въ верхней Нѣмецкой землѣ знакома была прежде нашего. Съ непамятныхъ временъ въ Брандбургіи и Саксоніи сѣютъ оную безъ всякаго шуму болѣе въ огородахъ, нежели въ поляхъ для корму скопамъ; а она недавно только въ публичныхъ изданияхъ

нїяхъ описана за полезное растѣнїе въ кормѣ
скошамъ.

1. Надвор. Совѣт. *Шубартъ* своимъ
землякамъ къ посѣву этой свеклы боль-
шимъ количествомъ преподаль слѣдую-
щїя правила:

Поле, на копоромъ сѣять сію пол-
сую свеклу, должно быть достаточнѣ
унавожено, и такъ мягко ухахано, какъ
бы подъ бѣлую капусту. Употребляющі
къ сему соху съ двойною полицею. Вспа-
хиваютъ землю такъ, чтобы всѣ борозды
сдѣлались возвышенными грядами, кои вы-
нушыя глубокїя борозды между собою оп-
дѣляютъ. Борозда опъ борозды должна
описывать на локопъ.

На ребрѣ произшедшихъ опъ того
грядъ сажать свеклу, разстоянїемъ вер-
шковъ на восемь или двенадцать между
собою.

Чѣмъ ранѣе можно посадить свеклу,
тѣмъ лучше. По сему не худо сажать све-
клу для высадковъ поранѣе на паровой
грядѣ, съ копорой, когда получишь она
четыре листа, высаживать безъ опасенїя
въ концѣ Апрѣля въ поле, хотя въ случаѣ
нужды не поздно высаживанїе и въ началѣ
Іюня быть можеть.

Впрочемъ сажать сїи высадки, подоб-
но обыкновенной красной свеклѣ, по самую
праву въ землю. (Нѣкоторые домоводства
учители опредѣляютъ сажать эту свеклу
такъ, чтобы съ самага начала корень ея
нѣ-

нѣсколько изъ земли обнаженъ былъ. Но на сухомъ мѣстѣ и въ сухменное лѣто, а особливо по вышеписанному правилу на ребрѣ грядъ, лучше сажать по самую праву въ землю.)

Когда свекла будетъ толщиною въ мизинецъ, или нѣсколько толще, должно оную обрыть мошккою, и землю отъ корней отгрести столько, чѣмъ половина оныхъ осталась наружи. Собственно обкапываютъ ихъ только однажды; но гдѣ одолѣваетъ права, должно это повторять.

Сажениемъ этой свеклы на ребрѣ грядъ производится то, что влажность собирается въ углубленіе бороздъ; а чрезъ обкапываніе производится какъ бы поперечныя борозды, коими глубина первымъ засыпается, и отъ того нужная влага достигаетъ ко всѣмъ корнямъ, которыхъ ростъ чрезъ это несказанно побуждается и ускоряется, а загниванію листовъ и стержня воспрепятствуется. Листы мало по малу обламываются, и составляютъ тучной и вкусной кормъ скотамъ. —

Г. Майеръ, Паспоръ въ Купферцеллѣ, сажаетъ Бургондскую свеклу между бѣлой капустою и картофелемъ. Какъ капусту и картофели обыкновеннымъ образомъ обгрѣбаютъ или обсыпаютъ землею, освобождается при томъ отъ оной свекла, что ей собственно и нужно, чѣмъ была она обнажена; ибо примѣчено, въ разсужденіи корней особливо, что они отъ такого обна-

обнаженія полстѣютъ: они шерпятъ это только, что до половины могутъ изъ земли шорчашъ.

Писатели верхней Нѣмецкой земли показываютъ урожай листовъ ея такъ, что оныхъ съ десятины сходитъ вдвое больше, нежели травы съ десятины луга; кореньевъ же съ десятины до сорока возовъ.

Однако это въ разсужденіи листовъ не много сказано, когда только съ ними умѣшь обходиться. Сниманіе листовъ производится такъ, что вдругъ всѣ оныя обламываются и оставляются только стержневые листы. Можно оныхъ въ шестеро или восьмеро больше собрать, когда чрезъ каждыя двѣ недѣли обламывать листы снизу до половины. Во время плодотворной погоды можно это производить чрезъ каждые 8 дней. Начинаютъ обламываніе, когда молодые растѣнія шестъ листовъ опустятъ, тогда два нижнихъ опламываютъ, чрезъ двѣ недѣли опять, и опчасу больше до шѣхъ поръ, какъ по сказанному начнутъ обламывать по цѣлой половинѣ оныхъ: ибо, когда всѣ крупные листы вдругъ обломать, опростаніе оныхъ задержится и ослабится, пошому что растѣнія посредствомъ листовъ не меньше, какъ и корни изъ земли, втяги-ваютъ питательныя частицы изъ воздуха, росы и дождя. Чѣмъ больше листовъ, и чѣмъ крупнѣе оныя, тѣмъ естественнымъ образомъ производишь сильнѣе и опростаніе ихъ.

Спо-

Способъ сажать Бургондскую свеклу между бѣлою капустною очень хорошъ; ибо случаются годы, въ которые капуста не всюду урожаешся, и земля доходу не приноситъ. Когда же будетъ съ капустною свекла, то упадокъ первой награждается. Я замѣтилъ въ годы, когда капустныя гусеницы одолѣвають, что бабочки (*) меньше кладутъ своихъ яицъ на капусту, ели сѣ ею перемѣшана Бургондская свекла. Извѣстно, что никакой родъ свеклы обѣданію гусеницъ не подверженъ: чайтельно, что непаренія листоевъ бабочкамъ прошивны, поему онѣ на смежную капусту яицъ своихъ и не кладутъ.

Самое это извѣстіе Бургондской свеклы отъ поврежденія гусеницъ должно сію кормную траву Хозяевамъ столько одобряшь, чтобъ не только снабжать себя изобиліемъ корму, но и капусту свою приводить шѣмъ въ безопасность; для того что гусеницы въ нѣкоторые годы урожай капусты крайнѣ убавляютъ. А что къ сей свеклѣ ихъ еще болѣе привлекать должно, состоитъ въ томъ, что кромѣ брюквы и нѣкоторыхъ корневыхъ растѣній, нѣтъ ни одного, которое бы онѣ могъ съ корнемъ и правую шакъ въ кормъ скопировать. Изъ всѣхъ капустныхъ родовъ должно корни съ нижними твердыми

(*) Именно большаго рода, дневныя, бѣлыя, съ черными пятами на концахъ переднихъ крыльевъ.

ми частыми кочерыгъ, яко бесполезныя, въ кормъ скопинъ бросають.

По обламываніи листовъ съ этой свеклы до глубокой осени, выкапываютъ оную изъ земли, и хранятъ въ пескѣ въ погребѣхъ для зимняго корму.

Сколько я въ печеніи многихъ лѣтъ замѣнилъ могъ, свиньи охотнѣе ѣдятъ всякія корневыя растѣнія, нежели Бургондскую свеклу; почему полезнѣе оную опредѣлять въ кормъ рогатой скопинѣ. Оную, подобно бѣлой рѣпѣ, крошатъ мелко, даютъ смѣшавъ съ рѣзкою, или когда опкармливаютъ на убой и желаютъ опкормить скорѣе, то мѣшаютъ съ дробинами и зерномъ.

Можно же и сію свеклу, такъ какъ прежде о бѣлой рѣпѣ сказано, для скопины квасить крошивомъ, и особливо по тому, что безъ сего по прошествіи зимы прочность ея оканчивается. Она предъ бѣлою рѣпою, такъ какъ и предъ капустою, имѣетъ то преимущество, что скорѣе заквашивается: это безъ сомнѣнія отъ того происходитъ, что свекла въ свѣжемъ состояніи при своей остротѣ больше сладости, нежели показанныя растѣнія имѣетъ. По сему не худо, когда сію Бургондскую рѣпу для скорѣйшаго заквашиванія класть въ капусту и въ помянутое рѣпное крошиво.

Примѣч. Переводч. Кромѣ извѣстнаго квашенія свеклы для зимняго употребленія

пробленія въ человѣческую пищу, которое въ Россіи извѣстно подѣ названіемъ *бураковъ*, вываривающъ изъ стекла сыропъ и сахаръ, о чемъ подробное наставленіе можно чипать въ недавно напечатанномъ въ Типографіи Типографической Компаніи Коммерческомъ Словарѣ, въ спашѣ *Сахаръ*.

31). *Пастарнакъ или пастинакъ*.

Распѣніе эшо обыкновеннѣе называется *пустарнакъ*, и воспитаніе корней его одинакое съ морковью. Назначаютъ подѣ нихъ спучную, больше влажную, нежели сухую землю, и сѣютъ либо съ осени, пошому что сѣмена его не вымерзаютъ и въ слѣдующую весну ранѣе пророспаютъ, или весною. Кшо желаетъ имѣть оныя рано въ пищу, долженъ сѣять съ осени, и покупными сѣменами чаще, пошому что обыкновенно между оными много бываетъ пустыхъ. Сѣмена сѣи бываютъ всхожи два года.

Паспарнаку два рода, а именно толстой длинной, и круглой корешкой. Одинъ счищаютъ лучшимъ для поварни, а другой въ кормъ скотовъ. Хоща послѣдній родъ больше сладости въ себѣ имѣетъ, но въ хозяйствѣ первой предпочитаютъ, пошому что онъ спорѣе въ служнихъ горшкахъ.

Обыкновенная вещь, что корни самыя молодыя пустарнаку, смѣшанные съ молододою морковью, весною соспаваютъ блю-

до на сполѣ особѣ средняго состоянїя; но чѣмъ болѣе сшарѣютъ оба рола сихъ корней, тѣмъ меньше уважаются.

Ни съ какимъ корнемъ повары и поварихи не должны имѣть сполько оспороженности, какъ съ пуссарнакомъ, чшобѣ не попался вмѣсто онаго корень водяной цикушы или болиголовы; пошому чшо онѣ запахомъ съ пуссарнакомъ сходенъ. Въ нѣкоторомъ большомъ городѣ за два года предъ симъ померло цѣлое сбмѣйство ошѣ пуспорнаковаго блюда, пошому чшо ключница на торгу купила вмѣсто пуссарнака связку корнейвъ обыкновенной песпрѣ болиголовы. Причиною сего были женщины, кои выпалывая на огородѣ травы, болиголову съ пуссарнаковыхъ грядѣ не выдергали. Не знающіе же люди или шоропливые, выдергивая пуссарнакъ на продажу, ввязали вмѣстѣ въ связки корнивъ и болиголову.

Должно молодыя расшѣнїя пуссарначныя, шакъ какъ прежде писано о моркови, какъ ошѣ постороннихъ травѣ опалывать, шакъ и гусшо распушїя продерживать, чшобѣ оныя другѣ другу роспи не мѣшали. Понеже корни сїа мороза не боящся, можно ихъ оставлять зимовать на грядѣ, гдѣ оныя лучшїй вкусъ удерживаютъ, нежели въ погребѣ. Въ этомъ же намѣренїи лучше хранишь ихъ въ песчаныхъ ямахъ, нежели въ выходахъ.

Къ принесенію сѣменъ отбирающъ лучшіе корни, и осматриваютъ ихъ сидѣтъ ли бо на мѣстѣ, или высаживаютъ въ Апрѣлѣ на хорошо вскопанную гряду, на шесть вершковъ разстояніемъ между собою. Когда выпѣвающія ихъ въ Августѣ сѣмена не вдругъ спѣютъ, должно ихъ надсматривать. Первыя созрѣвающія въ сѣменномъ вѣнчикѣ сѣмена бывающъ по срединѣ, и оныя самыя лучшія. Если дашь сѣменамъ переспѣть, легко оныя выбьютъ въ промѣ.

Англичане утверждаютъ, что перестарѣлые пуссарнаковы корни бѣшенство приключаютъ, что подтверждается опытами и другихъ.

Корни сіи составляютъ преизящный кормъ для овецъ и рогатого скота, и спорятъ съ морковью о преимуществѣ: есть Хозяева, утверждающіе съ опытовъ, что коровы отъ пуссарнаку получаютъ больше еще молока, нежели отъ моркови. Г. Шреберъ говоритъ, что пуссарначную траву никакой скотъ не трогаетъ, но это должно разумѣть лишь объ однихъ листьяхъ, острой вкусъ имѣющихъ; однакожь скошы бѣжатъ и ихъ въ недостаткѣ другой зелени. Въ малой Россіи молодые листья пуссарнаковы варятъ въ похлѣбкахъ.

Врачи похваляютъ пуссарнаковы корни отъ нѣкопорохъ припадковъ. Бюргавъ предписываетъ оныя въ молоко вареные

ча-

чахошливымъ, а *Лоббъ* спраждающимъ ка-
менною болѣзнью.

32) *Петрушка.*

Не взирая на то, что хотя не должно
послѣдовашъ *Г. Гротжану*, чтобъ *травя-*
ная и *коренчатая петрушка* имѣла раз-
личіе въ разсужденіи сѣменъ, ибо зависишь
это отъ воли, права ли или корни на-
добны, а потому одни сѣмена туше или
рѣже посѣять должно; однакожъ я здѣсь
поставлю это раздѣленіе, потому что
оное принято у садовниковъ въ обыкно-
веніе.

АА. *Травяная петрушка.*

Хотя въ сѣменныхъ спискахъ садовни-
ковъ насавлено бываешь много родовъ
петрушки, какъ-то Берлинская, Браун-
швейгская, Франкфуртская, Голландская, и
проч. но выдѣль все одна, хотя различіе
земель и пріуготовленіе оныхъ могутъ
сдѣлать нѣкую отпѣну. Предъ посѣвомъ
сѣмена сперва мочатъ сушки, а попомъ
нѣсколько осушивъ густо разсѣваютъ. Это
можешь производишь на грядахъ какъ пѣ-
нисныхъ, такъ и солнцемъ освѣщаемыхъ.
Петрушку сѣютъ во всякое время года, и
сѣмена ея въ холодное время нѣсколько
недѣль въ землѣ лежатъ. Морозъ ей ни-
какого вреда не дѣлаетъ, почему сѣютъ
оную въ самую глубокую осень, чтобъ ве-
сною пѣмъ ранѣе имѣшь зелень ея. Ес-
ли же осенью будетъ она посѣяна такъ
рано, что взойдетъ еще до наспупленія

зимы, по подмостивъ съ боковъ гряды жердочки, накрывающъ праву ея гороховинами или длиннымъ конскимъ навозомъ шаковымъ образомъ, чшобъ покрышка правы не касалась. Когда же сѣвъ произведенъ будетъ лѣшомъ въ половинѣ Іюля, права продолжается даже въ зиму, и можно оную къ употребленію изъ подъ снѣга выкапывать, или снѣгъ мешлою сместъ и оную сыскашь.

Въ разсужденіи присмотру за этою правою необходимо нужно, чшобъ въ надлежащую пору была она опалывана: ибо впрочемъ когда правы одолѣющъ, пепрушка при полошье очень опустошается. Въ сухмень пребудетъ она рачительной поливки, а къ употребленію не срываешь оную, но всегда ножемъ срѣзывать должно, чшобъ корней не шронуть, и правѣ ошрасшать не воспрепятствовать. Сволъ выходитъ на другой годъ, и приносишь сѣбля сѣмена въ Августѣ, кои доброту свою чрезъ 3 года удерживающъ.

Травяная пепрушка имѣетъ листы либо *кудрявые* или *гладкіе*, и послѣдніе больше уважаются поварами, къ укладыванію или украшенію оными блюдъ. Въ разсужденіи кудрявой пепрушки въ Новомъ Зрѣлищѣ Природы написано слѣдующее: корневыя листы у кудрявой пепрушки очень красивы, но это уменьшается, когда она въ стволъ пойдетъ. Такъ называемая *Англинская* пепрушка растетъ очень

вы-

высоко въ стволъ, и оказываетъ крупнѣйшіе листы, но оную должно счищать шокмо за опродіе. О кудрявой, копорую садовники совсѣмъ неправильно *махровою* называющъ, замѣтимъ мы еще, что оную Г. Миллеръ принялъ за особый родъ, потому что по прилѣжномъ раздробленіи сѣменъ никакой ошмѣны замѣпить не могъ. У насъ отъ сѣменъ кудрявой чрезъ нѣсколько лѣтъ сряду опять кудрявая же пепрушка выходитъ. Но навсегда ли она таковою останешся, того не утверждаю. Между тѣмъ желаемъ мы, чтобъ посѣвъ этой кудрявой мясы производилъ множественнѣе, нежели по нынѣ; потому что сію пепрушку отъ ядовитаго *склизу* легко и прежде зацвѣтанія еще отличать можно. Особливая оболочка цвѣточной булавки у склизу, копорая навислая на наружную спорону, и обыкновенно прехлещиная бывающъ, составляющъ лучшій опличительный знакъ. Но какъ пепрушку собирающъ и употребляющъ, пока она еще въ стволъ не поидетъ, и потому проспой ея родъ, а не кудрявой, легко съ листьями склизу за одно смѣшать: и къ предупрежденію сего вреда должно кудрявую пепрушку преимущественно сѣять и употреблять. —

Какъ сего склизу въ нѣкоторыхъ огородахъ совсѣмъ испребишь не можно, ибо при вымалываніи естля хощя малой корешекъ его въ землѣ останешся, всегда опять

отраспаетъ, и листы его отъ незнающихъ легко съ пепрушкою нарваны бытъ, и въ пищу попасть могутъ; почему опличительные оныхъ признаки, какъ повареннымъ служителямъ, такъ и рвущимъ пепрушку въ огородъ, должно щательно июлковать. Склизъ цвѣтетъ между пепрушечной травы, когда оной еще нѣтъ году, и поному въ спволъ нейдетъ, и поному еспли между таковою кустъ окажется высокой и съ цвѣтомъ, легко опличить и вырвать его вонъ должно. Бѣлой склизовъ корень почти къ пепрушечному сходенъ, только короче и безъ запаху; но когда оной потереть, оказыввается духъ къ чесночному сходный. Однакожъ не должно въ этомъ испытаніи обтирать прежде пепрушкины корни, для того что рука пепрушечной запахъ склизовымъ кореньямъ легко сообщаетъ. Вѣрнѣйшій же опличительный знакъ лоскъ листовъ, которой они и съ нижней споронны имѣютъ, отъ чего расптѣе это и прозваніе склизъ носятъ. Употребленіе оныхъ можетъ приключить корчи, лишеніе разума и самую смертъ. Расптѣе это имѣетъ Лапинское названіе *cicuta petroselino similis*, т. е. болиголова пепрушкѣ подобная, да и отъ простыхъ людей называется болиголовомъ. Однакожъ настоящія болиголовы сухопутная и водяная, хоща названіе цикушы носятъ, но отъ склизу совсѣмъ опличны. Кто же отъ послѣ названныхъ ядовитыхъ

справъ

справъ склизъ еще короче ошличить желаетъ, долженъ примѣчаніе обратить на слѣдующій Ботаническій признакъ: кругловатой полосатой сѣменной стволъ склизу бываетъ вышиною отъ 6 до 12 вершковъ, усаженъ помянутыми къ пепрушечнымъ сходными листьями, и раздѣляется на вѣтви. Сѣи оканчиваются шаковымъ хохломъ, въ главномъ котораго отдѣленіи нѣтъ обвершки, въ отдѣленныхъ же хохлахъ есть по 3 и по пяши нишкъ подобныхъ листковъ, кои сидятъ съ наружной стороны прямо внизъ наклонены, и какъ бы бороду представляющъ. Это совсѣмъ ошмѣнный признакъ, по которому растѣніе сѣе отъ всѣхъ сходныхъ къ нему легко ошличить можно.

ББ. *Коренчатая петрушка.*

Прежде сказано уже, что одни сѣмена могутъ производить большіе листовъ или большіе толстыхъ корней, поелику гуще или рѣже посѣяны будутъ; почему шѣ сѣмена, отъ которыхъ корни получатъ намѣрено, должно очень рѣдко высѣвать, да и по всходѣ оныхъ густыя мѣста прорывать, чтобъ корни имѣвъ больше простору и питанія, крупнѣе выросли. Крестьяне здѣшняго мѣста, очень прилѣжающіе къ вожденію луку, обыкновенно мѣшаютъ пепрушечныя и луковыя сѣмена вмѣстѣ, ибо пепрушечныя корни получаютъ довольно простору, когда луковицы, и безъ того не глубоко въ землю идущія, лѣтомъ на

расходъ будущъ повыдерганы; оказывае-
ся, что въ этой смѣси петрушка круп-
нѣе, нежели въ иныхъ мѣстахъ родилась.
Сѣвъ этой бываетъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ.

Корни петрушки бываютъ тверже и
мягче. Последнiе у садовниковъ называютъ
сахарною петрушкою, или цуккарат-
нымъ кореньемъ, или просто цуккара-
томъ.

Хотя швердой родъ петрушечныхъ
корней зимою не замерзаетъ, и охотно на
мѣстѣ зимовать осмѣливается, чтобы ра-
но весною травы для поварни было доволь-
но; но съ нѣжными цуккаранными корня-
ми сего учинить нельзя, потому что они
легко вымерзаютъ. Почему лучше оныя
выкопавъ, хранить въ выходахъ, или
слоями кавъ закладывать глубоко въ зем-
лю, а приномъ въ жестокіе морозы
накрывать гороховыми и шому подоб-
нымъ. Для сѣменныхъ высадковъ отбира-
ютъ корни лучшіе и ровные, т. е. тако-
вые, кои не раздѣляются на побочные оп-
роски, обрѣзываютъ съ нихъ осенью
праву, оставляя оной только пальца на
два, хранятъ ихъ въ погребѣ, и весною
высаживаютъ на 6 вершковъ между собою
разстояніемъ въ грядѣ, хорошо вскопан-
ную и освѣщаемую солнцемъ.

На посѣвающихъ сѣмена еще въ Іюлѣ
должно обращать вниманіе, и какъ скоро
сѣмлозеленой цвѣтъ зеренъ превратится
въ шемнозеленой, должно сѣменные хохлы
мало

мало помалу, ибо не всё вдругъ созрѣва-
ющѣ, срѣзывать, въ прохладномъ мѣсѣ
на полошениѣ совсѣмъ досушить и хра-
нить, елики только кѣ избѣжанію
околичностей не захочетъ всё хохлы спѣ-
лые и недоспѣлые вдругъ срѣзать, но
дашь онымъ посюзять нѣсколько съспе-
блями, чрезъ что и неспѣлая сѣмена до-
ходящѣ.

Врачи присвояющѣ корнямъ, сѣменамъ
и лиснамъ пепрушки лѣкарственную си-
лу. Сѣмена умножающѣ варивельныя си-
лы желудка, отвращающѣ палмѣе, го-
нящѣ урину, и вообще разводятъ густыя
и клейкія мокроты и соки. Нежное упо-
требленіе оныхъ извѣстно оное вѣн, къ
каковому намѣренію Г. фонъ Розелстель
прѣупотребляющѣ мазь изъ корьяго маса
съ пепрушечными сѣменами. Лисны ока-
зываютъ свое раздѣлятельное и разпуска-
тельное дѣйствіе различнымъ образомъ.
Камни, вынутые изъ уриннаго пузыря,
Лаббъ клалъ въ напитокъ, изъ листовъ
пепрушечныхъ соснавленной, и нашелъ
онѣ размягчившимися и кропкими. Пред-
писывающѣ пошому сей напитокъ шѣмъ,
коимъ нужно умножить исхожденіе урины.
Свѣжая разшолченая шрава, приложенная
къ грудямъ, разводитъ стусившееся мо-
локо; Г. *Ланге* похваляющѣ оные, когда
изрѣзавъ ихъ опварить въ уринѣ, опъ
зашвердѣлыхъ желѣзъ, а особливо въ на-
чинающемся ракѣ на груди, и обнадежи-
О 5 ваетъ,

ваетъ, что это средство сильное дѣй-
ствие оказываетъ послѣ того, какъ болиго-
лова трава и ртуть щещино были упо-
треблены. Свѣжіе, сочные, сладковашые,
съ малою оспрошою соединенные корни,
оказываютъ всеобщее дѣйствіе пепрушки
въ побужденіи и умноженіи изщеченія ури-
ны, всегда навѣрное; а какъ оныя мень-
ше надмѣваютъ, нежели многіе другіе по-
варенные корни, то употребленіе оныхъ
прилично опредѣляютъ въ пищу, или вы-
жатой изъ нихъ сокъ, или прѣготовлен-
ной изъ нихъ напитокъ, одержимымъ во-
дяною болѣзнію, и каменною въ почкахъ
и пузырь. Отъ запору мѣсячныхъ кровей
употребленіе оныхъ меньше полезно. Г.
Миллеръ совѣдуетъ сѣять пепрушку въ
полѣ для овецъ; ибо оная предохраняетъ
ихъ отъ всякой заразы, естли бдятъ
онѣ оную дважды въ недѣлю.

33) Селлеря.

Садовники имѣютъ нѣсколько разбо-
ровъ сего повареннаго корня, и толсто-
коренчатую селлерю называютъ *була-
вистая селлеря* или *кольрабная селле-
ря*; ибо корни ея не рѣдко бываютъ
такъ велики, какъ булавъ кольраби, или
посверхъ земной брюквы. Такъ называ-
емая *селлеріакъ* отъ сего сорта совсѣмъ
отлична. *Кустоватая селлеря* напро-
тивъ есть та, которой корень обсаженъ
многими глазками или ростками, и кото-
рая по разрѣзаніи внутри бѣла. Искусныя
садов-

садовники однако утверждаютъ, что шакковыя опличія производящъ единственно отъ образа пересадки корней. По оному выходитъ булависная селлеря отъ того, когда молодые корни при пересадкѣ въ половину прирваны будуще, и отъ побочныхъ корешковъ освобождены, а именно: надобно взявъ лѣвою рукою за конецъ корня, чтобъ шрава повисла внизъ, и пальцами правой руки осмыгнувъ всѣ побочные корешки отъ конца до шравы начиспо, освободивъ же главной корень, опщипнуть половину онаго по срединѣ ногтями прочь, и тогда посадить въ землю.

Сѣвъ селлерейныхъ сѣменъ производится обыкновенно еще въ Мартѣ въ парникахъ, чтобъ растѣнія ранѣе въ пересадку вышли. Если же оныя, какъ легко случается, начнутъ подъ стеклами ростъ тучно или бошѣть, выходятъ изъ того худые корни. Если же посѣять селлерю весною на открьшомъ воздухѣ, долго не поспѣетъ она въ пересадку; потому что сѣмена недѣли 4 въ землѣ лежатъ до всходу, шакъ что рѣдко въ пересадкѣ отъ нее корни совершенства достигаютъ. Почему нѣкошорые, не имѣющіе парниковъ, сѣютъ нѣсколько сѣменъ осенью на мѣстѣ, зашщипу отъ сѣверныхъ вѣтровъ имѣющемъ, кои многокрашно лучше парниковыхъ удаются.

Къ пересадкѣ, или лучше сказать для высадковъ, избираютъ больше влажную, нежели

жели сухую землю, но тучно унавоженную и глубоко вскопанную: проводяшъ по грядѣ концомъ грабель бороздки, и по онымъ разсаживаютъ высадки. Производишъ это, когда справа у высадковъ отспрастешъ вершка въ два, и по срединѣ сердечной или спержневой листъ окажется, а главной корень будетъ шолциною около гусинаго пера. Впервыхъ обрѣзываютъ верхъ справа ножемъ, что производяшъ и надъ корнемъ, кто по вышеписанному не захочетъ ошипывать рукою; высадки должны имѣть между собою вершковъ 6 или 12 разстоянія. Въ сухмень тщательно ихъ поливаютъ, и землю къ нимъ пригребаютъ: чѣмъ чаще послѣднее случается, тѣмъ вкуснѣе выходятъ корни.

Нѣкопорые ославляютъ корни въ землѣ зимовать, и отъ холода прикрываютъ ихъ шолько гороховинами, а по прошествіи большихъ морозовъ соломѣ сию снимаютъ. Миѣ это ни однажды не удалось; ибо хотя спужа корней и не вредила, но водяныя мыши ихъ начисто сѣдали. Почему лучше корни въ Ноябрь при сухой погодѣ выкапывать, праву по самой желтой кружокъ обрѣзывать, и въ выходѣ сажать въ песокъ. Кладутъ ихъ рядами, корни обративъ къ стѣнѣ, а правую прочь, и каждой слой засыпаютъ пескомъ такъ, чтобъ зимою слой по слою вынимаешь на расходъ. Въ этомъ случаѣ можно и роспки правы зимою выходящей, мало по

ма-

малу съ нихъ обламывать, кои зимою въ супахъ составляютъ рѣдкость. Кто же селлерю за лучшее сочтетъ хранить въ ямахъ, долженъ оныя копать глубиною въ три четверти аршина, и очищенные отъ правы корни въ нихъ класъ, но землю ямы засыпать не погдажъ, но когда морозы увеличатся. Сѣмена ея воспиты-
ваютъ подобно пепрушечнымъ, и оныя бываютъ всхожи 3 года.

Въ разсужденіи употребленія въ пищу и врачебныхъ силъ селлеря во всемъ подобна пепрушкѣ; въ особливости дѣйствуетъ она уриннымъ каналомъ, и изтеченіе побуждаетъ. Лаббъ предписываетъ многое употребленіе ея одержимымъ каменною болѣзнію. Сокомъ, выжатымъ изъ корня, Хомель излѣлялъ перемежную лихорадку, давая оной пить въ началѣ зноба, послѣ чего слѣдуетъ сильной потъ.

34) Сахарной корень.

Изъ всѣхъ поваренныхъ корней эшотъ самой сладкой. Сѣютъ его сѣмена точно такъ, какъ селлерю. Оныя равномерно лежатъ 4 недѣли въ землѣ до всходу, почему лучше ихъ сѣять съ осени, нежели весною. Еслили распѣнія взойдутъ густо, должно лишнія вынуть и пересадить на другую копанную гряду, имѣющую влажную и мягкую землю, на 6 вершковъ другъ отъ друга разстояніемъ; въ послѣдствіе же однажды огребаютъ и обсыпаютъ землею.

Кромѣ

Кромѣ сего размноженія опѣ сѣменѣ, разводящѣ ихѣ корневыми опросниками. Оныя опѣ корня опрѣзываются, но шакѣ, чѣшобѣ главнаго корня сѣ глазомѣ на осьмую долю вершка. Сїи опросники чрезѣ зимѣ хранящѣ вѣ выходѣ, а весною высаживающѣ на шестѣ вершковѣ разстоянїемѣ, и на вершокѣ глубиною вѣ грядѣ. На зимѣ кусы вынимающѣ, роски сѣ корней обрѣзываются, и вѣ выходѣ кладущѣ на зимѣ вѣ свѣжемѣ пескѣ, кѣ высаживанїю оныхѣ рано весною на грядѣ. Эшо размноженїе опросниками вѣрнѣе развода сѣменами, пошому чѣо ни одинѣ глазокѣ не пропадешѣ. Однакожѣ корни опѣ шакowychѣ не столько бывающѣ прїяшны вкусомѣ, и внушри шруплывѣ выросшшихѣ опѣ сѣменѣ.

Хопя можно корни сїи оставлать зимовать вѣ землѣ, прикрывѣ опѣ холоду длиннымѣ легкимѣ конскимѣ навозомѣ, однакожѣ опасно, чѣо шущѣ сѣбдѣящѣ ихѣ мыши; почему безопаснѣе на зимѣ ихѣ выкапывать, и подобно селлерѣе хранитѣ вѣ выходахѣ.

Эшопѣ столько прїяшнаго вкуса и питательный корень употреблющѣ вѣ супахѣ и соусахѣ разнымѣ прїугошовленїемѣ. Нѣкоторые находятѣ его вкуснѣе, когда по опшваренїи вѣ водѣ будешѣ онѣ обвалянѣ вѣ мукѣ и поджаренѣ вѣ коровьемѣ маслѣ. *Кордусѣ* счишаешѣ корни сїи здоровѣйшими изѣ всѣхѣ, и употребленїе оныхѣ

онихъ въ продолжительныхъ болѣзняхъ , а особливо изощанїи, можетъ быть шѣмъ полезнѣе, что они легко варимы.

35) Овсяной корень.

Этотъ явсвенной корень въ образѣ развода довольно сходствуетъ къ скорсонероу или съ чернымъ овсянымъ корнемъ , и извѣстенъ приномъ подѣ иными названїями *сальзафи* и *артифи*. Сѣютъ сѣмена его въ мягкую , съ пескомъ смѣшанную землю въ концѣ Марша мѣсяца; но сѣвъ должно производить не густо, или взшедшія растѣнїя такъ прорывать, чтобъ оныя оспались на 3 вершка между собою. Когда сѣвъ произведетъ около 10 Іюня, можно будетъ корни отъ онаго имѣть еще зимою. Обыкновенно же рано весною посѣянные корни къ зимѣ выкапываютъ , и хранятъ въ сыромъ пескѣ въ выходахъ. Лучшіе изъ нихъ къ веснѣ отбираются на высадки, и высаживаются. Въ особливости корни сїи полезны чахотнымъ и изощеннымъ шѣламъ, и поправляютъ недосшатки груди, кашель и тяжелое дыханїе. Похваляютъ же ихъ въ запорахъ и отвердѣлостяхъ внутреннихъ, равномерно къ раздѣленїю густыхъ мокротъ и поправленїю острыхъ соковъ. —

36) Хрѣнъ.

Хотя хрѣнъ находишь и дикорастущій въ огородахъ , но отъ сажденїя онаго выходящъ корни гораздо толще и вкуснѣе. Попробна къ сему черная, довольно влажная

ная и низменная земля, которая разоли-
 рованіемъ, или глубокимъ копаніемъ, бы-
 ла бы довольно умягчена, шакже довольно
 тучно унавожена. Разводяиъ у насъ хрѣнъ
 не опъ сѣменъ, но корнями, двоякимъ спо-
 собомъ: либо изрѣзавъ корни въ куски
 вершка въ два съ половиною, сажаютъ
 оные по снурку, аршина на полшора ме-
 жду собою разстояніемъ; или опъ спа-
 рыхъ корней опрѣзываютъ малыя побоч-
 ныя опрасли, или шакъ называемые хво-
 шики, раздѣляютъ оные въ куски въ па-
 лецъ величиною, и кладутъ изкошено
 или прямо, вершковъ на шестъ разстоя-
 ніемъ въ унавоженную и копаную землю.
 Можно производить это равно весной,
 какъ и осенью. Но какъ подъ хрѣнъ лучше
 избираютъ глубокую влажную землю, то
 осеннее время къ сему лучше; для того
 что шаковаго рода земли къ веснѣ не только
 бываютъ мягки, но больше вязки и
 глубокаши, шакъ что въ нихъ осенью по-
 саженный хрѣнъ скорѣе весенняго прора-
 скаетъ. Сажаютъ же и опрѣзанные ба-
 товья правы съ ихъ вѣнчикомъ. Оныхъ
 подобно корнямъ изкошено не сажаютъ,
 для того что въ этомъ случаѣ опускаютъ
 они много побочныхъ корней, а опъ
 того главной корень выходитъ слабъ и
 шенокъ. Идетъ оной въ землю на аршинъ
 съ четвертью и полшора, и шрудно оной
 выкапываютъ; почему лучше сажая класъ
 оной плашмя. Корень шаковаго сажения,
 когда

когда лисшы съ него лѣтомъ не будутъ обрѣзываемы, бываетъ обыкновенно какъ внушри, такъ снаружности жиловашъ нѣсколько, и не шаковъ гладокъ, какъ выращенный опѣ посадки малыхъ кусковъ. Какъ же это обрѣзываніе производися, вскорѣ будетъ сказано. Еслили опасно, что земля осенью неудобна будетъ къ воздѣланію, можно сажденіе производить еще въ Августѣ. Травы должно щадельно выпалывать. Кому надобны толстые корни, а особливо на продажу, долженъ шомъ оставить ихъ сидѣть въ грядѣ два года, и на зиму прикрывать дробнымъ навозомъ, а пошому ежегодно заводить новую гряду, чтобы въ хрѣнѣ не было недосапка (*).

Г. Рейххартъ къ разводу хрѣна предписалъ слѣдующій способъ: отрѣзать опѣ

Часть IV. Отлѣл. 2 П тол-

- (*) Сколько я замѣшилъ, хрѣнѣ, единожды посаженной, растетъ навсегда въ шомъ мѣстѣ, еслили только для употребленія вырывать и отрѣзывать часть корня не болѣе 12 вершковъ длиною. Можетъ быть не во всѣхъ мѣстахъ это быть можетъ; но въ селѣ моемъ Темрянѣ и многихъ иныхъ мѣстахъ Бѣлевской округи, хрѣну нигдѣ не сажаютъ, но копають изстари, гдѣ оный растетъ, на однихъ мѣстахъ. Въ прошедшее генеральное земель размежеваніе случилось копать межевую яму на залиномъ мѣстѣ, пришелъ на ономъ кустъ хрѣну, и по вынушіи земли на три аршина много еще корня въ землѣ осталось. Грундѣ въ Темрянѣ состоить изъ известнаго камня съ сѣрымъ суглинкомъ, и ошчисти съ желѣзною рудою.

толстыхъ корней часть съ вѣнчикомъ, изъ кошораго права выходитъ на вершокъ, и положишь оныя поздно осенью или весною, на полшора аршина разстоянїемъ, и вершковъ на 12 глубиною въ землю, послѣ чего оныя въ Іюнѣ или Іюлѣ опрощаютъ большіе лисы кустами. На другой годъ корни можно выкапывать, но низъ оныхъ въ землѣ оставляя; у каждаго куста оставишь по 3 или чепыре боковыхъ корня, прочіе обрѣзать, и всегда выкапывая для употребленія, брать оипъ куста по одному, по два и не больше шрехъ корней. Образъ сего саженія очень полезенъ, ибо голову сѣ вѣнчикомъ, изъ кошораго права выходитъ, и безъ того должно обрѣзывать, когда корни хранишь къ зимнему употребленію. Когда это пропустишь, то корни прораспунѣ, и чрезъ то лишашся своего вкуса; сохраняешь корни въ полѣ въ ямахъ лучше, нежели въ выходахъ, для того что въ ямахъ долѣе удерживающъ они доброту свою.

Не давно случилось мнѣ припши къ садовнику, кошорой снималъ землѣ сѣ хрѣна, кошорой надлежало еще осенью выкапывать, обрѣзалъ у онаго всѣ боковые корешки, также и на низу всѣ маленькіе корешки отнявъ, оставлялъ оныхъ у главнаго корня только по одному или по два. Сему дѣйствію показывалъ онъ ту причину, что отъ того главной корень въ толщину прибываетъ, лучше кажешся гла-
замъ

замѣ покупщиковъ, нежели таковой, у котораго обрѣзаваютъ боковые корешки при выкапываніи самаго корня. Осенью, для того что въ первомъ случаѣ лозины зарастаютъ, и внутри оной не бываетъ жилотанъ, но дѣлается мягкѣ, а пошому лучше прешся въ поваренномъ употребленіи, и за шѣмъ у него хрѣнъ охотнѣе, нежели у другихъ покупаютъ.

Одинъ изъ пріятелей моихъ, въ домоводствѣ котораго великой расходъ на хрѣнъ, а особливо для лошадей, обращаетъ самое низкое мѣсто своего огорода, которое осенью и весною покрывается водою, подъ садку хрѣна. Еще въ Августѣ въ сухое время гряду ражолитовавъ, или глубоко вскопавъ и довольно унавозивъ, дѣлаетъ на оной въ приличномъ разстояніи вдоль валики, или какъ бы малыя грядки. Въ оныхъ сажаетъ онъ ошъ главныхъ корней обрѣзанные молодые корневые длинныя ошроски, напыкавъ палкою скважины больше прямо, нежели вкось, и шакъ, чтобъ верхніе концы шакowychъ корней немножко изъ земли высавились, и угнѣтаетъ пошомъ нѣсколько землю, чтобъ она отовсюду къ корнямъ прилегла. Хожденіе пошомъ за хрѣномъ у него обыкновенное, и корни выходятъ очень хороши, для того что во время покой воды верхи оныхъ посверхъ воды шорчатъ.

Многіе опасаются хрѣнъ садить, для того что онъ засоряетъ землю: ибо и

малыя части корни, въ землѣ остающіяся, опять разрастаются. Однако нѣшѣ ничего легче, какъ въ одно лѣто землю опѣ него совсѣмъ очистишь: должно лишь лѣтомъ, когда права опрасненѣ ладони на двѣ, всегда выдергивать оную. Еслили произвесѣ это за лѣто нѣсколько разъ, кусты сами собою пропадутъ, и не будутъ нужды корни изъ земли выкапывать. Хотя же на другой годъ нѣсколько кустовъ и выдетъ, но будутъ оныя очень слабы, и въ повтореніи вырванія травы совсѣмъ погибнутъ.

Выше мимоходомъ сказано объ одномъ Хозяинѣ, что водить оной хрѣнъ и для лошадей своихъ. Это производится для лѣкарства онымъ, а именно: когда у лошадей бывають желваки на шѣе или зобы, должно хрѣну изрубить мелко, и давать онаго повсякое утро лошадямъ въ овсѣ. Лошади привыкнувъ къ хрѣну ежедневно, ѣдятъ уже оной и безъ овса. Дается же оной лошадямъ не шокмо въ лѣкарство, но и къ предохраненію отъ болѣзней.

Корни сіи содержатъ въ себѣ много дѣйствительныхъ, лепучихъ и острыхъ непрѣмныхъ частицъ, и поспавляются средствомъ отверзающимъ, раздѣлятельнымъ, разпускательнымъ и возбуждающимъ въ разныхъ человѣческихъ болѣзняхъ. Вареніе убавляетъ примѣшнымъ образомъ сію силу хрѣна. Желудокъ тогда
мень-

меньше отъ онаго стрекочетъ, и позывъ къ Ёдѣ не только возбуждается. И такъ, естли хрѣну служишь лѣкарствомъ, а не приправою, лучше напирать сырыхъ корней на шерку, и либо сокъ изъ нихъ выжимаешь, или наливаешь винограднымъ виномъ, или иными образами употребляешь. Выжатой сокъ самъ по себѣ оспрѣ, и возбуждаетъ одинъ рвоту; а пошому должно оной подслащивать либо сахаромъ, или морковнымъ сиропомъ, и шѣмъ учиняешь вкуснѣе. Въ этомъ случаѣ, равно какъ и винная напойка, въ особливости полезны для одержимыхъ водяною болѣзнію; ибо по опытамъ славнаго Доктора *Бемера* изводима шѣмъ множественно урина, и водяная опухоль совсѣмъ разводится. Служишь же хрѣну и отъ скорбуша или цынгошной болѣзни и иной нечистоты соковъ, отъ простуднаго кашля и другихъ флюсовъ. *Бюргавъ* предписываетъ къ сему выжатой сокъ изъ корней, смѣшавъ съ медомъ, употребляя оной поутру на пощей животъ и запивая рюмкою молочной сыворотки. Сокъ, смѣшанной съ уксусомъ, похваляется отъ глистовъ. Отъ болѣзненныхъ флюсовъ похваляетъ *Г. Райгеръ* напишокъ, изъ хрѣну съ молокомъ прѣугоповленной. Можно же хрѣну и наружно употреблять, составляя изъ корней съ уксусомъ мазь, и напирая оною поврежденные или болящіе члены. Къ обратному новыхъ припадковъ судорожныхъ

ныхъ *Сгортъ* предписываетъ особое рвошное: должно хрѣновой корень изрѣзашъ въ дробные кусочки, на фуншѣ оныхъ налишъ полшора фунша воды, посшавишъ въ теплое мѣсто, процѣдишъ, и какъ остынешъ, выпишъ сколько возможно скорѣе.

37) Р ѣ д ѣ к а.

Въ нижней Нѣмецкой землѣ, да и повсюду нѣшъ ни одного изъ корневыхъ расцѣннѣй, котораго бы столько много и охотно ѣли сыраго, какъ рѣдку. Простолудины, и больше въ городахъ, нежели по деревнямъ, не рѣдко составляющъ весь ужинъ свой изъ одной рѣдки съ хлѣбомъ и масломъ, такъ чшо чѣмъ крупнѣе и горчѣе рѣдка, шѣмъ охотнѣе оную покупающъ. Почему всякой огородникъ навѣрное можешъ полагашъ, чшо на рѣдку его купцы сыщутся, ешъли будешъ оную сажашъ, и урожай свой мало помалу ошвозишъ въ городъ на продажу, избирая время, когда оной не привозяшъ изъ мѣстѣ, почаепо весьма опдаленныхъ. Иѣкоторые Хозяева имѣющъ самую способную для рѣдки землю, и недосажашъ онымъ лишь знанію, къ вожденію сего прибыльнаго произведенія.

Различнымъ способомъ можешъ выходить различная рѣдка, какъ то *лѣтняя*, *осенняя* и *зимняя*, по мѣрѣ шого, какъ она будешъ сѣема въ различное время года и поснѣвашъ въ пищу. Наружной цвѣтъ ея
опять

опять составляет различіе; потому что бываетъ оная иногда черная, частью же бѣлая или красноватая, но внутри всѣ они бѣлы. Черная рѣдка всюду въ лучшемъ уваженіи.

Черная, влажная, тучная и мягкая земля кажется бытъ для сего корневаго расшѣнія способнѣйшею, и чѣмъбъ оное выросло крупнѣе, должно сѣмена сажать глубиною на полвершка въ землю, и вершковъ на шесть или на 12 разстоянїемъ. Въ каждую ямку кладутъ обыкновенно по два сѣмечка, и когда оба взойдутъ, одно растѣніе выдергиваютъ, производимся это для безопасности, что когда одно зерно пропадетъ, возшло бы другое. Нѣкоторые мочатъ сѣмена въ разсолѣ, и утверждаютъ, что корни оныхъ не подвергаются червопочинѣ.

Въ нѣкоторыхъ средственнаго состоянія домахъ подаютъ сырую рѣдку къ заѣдкѣ водки, и чѣмъ крупнѣе рѣдка, тѣмъ лучшее украшеніе стола оная составляетъ. Почему огородники весьма прилѣжатель доводятъ рѣдку въ большой ростъ, и употребляютъ къ сему разныя искусства. Г. Хагедорнъ въ своемъ *Landwirtschaftlichen Haus-Halter* одобряетъ къ сему слѣдующее средство, говоря: кто желаетъ вырастить самую крупную рѣдку, проверни по срединѣ довольно величины достигшей рѣдки скважину, около пальца длиною, вложи въ оную свѣжее рѣдеч-

ное сѣмечко, и сгнѣшая сожми опять скважину: эпо сѣмечко выгонитѣ рѣдку до невѣрояшнаго роста. Другіе утверждаютъ, что рѣдка вырастаетъ очень велика, когда праву ея, сломивъ до самого сердца, обнаженное мѣсто засыпашъ сухою землею. Когда растущая рѣдка изъ земли вылезитѣ и обнажится, должно оную засыпашъ землею, а безъ того будетѣ оная трупьява и червива.

Въ Эрфуртѣ поднесъ родится самая крупная рѣдка, всюду развозится на продажу, и много денегъ за оную выручается. Нѣкоторые огородники доставляютъ своей рѣдкѣ у насъ великой расходъ, когда отсылаютъ оную въ разные мѣста на продажу подъ именемъ Эрфуртской. Самъ Г. Рейххартъ въ Эрфуртѣ водилъ много рѣдки, а пошому въ своей книгѣ *Sand-und Garten-Schatz* оставилъ намъ вѣриѣйшее наставленіе къ сему, котораго главное содержаніе состоитъ въ слѣдующемъ:

Сѣмена зимовой рѣдки можно сѣять съ Троицина дни по Ивановъ день (24 Іюня), когда на канунъ шелъ дождь, въ землю, хорошо копаніемъ умягченную, плодоносную, но не вновь унавоженную. Въ землѣ, свѣже унавоженной, корни получаютъ отросстки, червошочину и непріятной вкусъ. Если же рѣдку посѣять рано, идетъ она въ спволъ, а особливо когда часто будутъ упадать теплые дожди.

Сѣвъ

Сѣвъ производишь шаковымъ образомъ: малою лопашкою, или полотвенымъ крюкомъ, или палкою, дѣлаюся на грядѣ по снурку ямки, въ полвершка глубиною, и на 12 вершковъ разстояніемъ между собою въ квадрашѣ; въ каждую ямку положишь по столько сѣменъ, сколько можно захвашишь щепотью двухъ пальцевъ, и засыпашь землею. Когда сѣмена взойдутъ, и листы оныхъ вырастутъ вершка въ полшора, слабыя растѣнія выдернуть вонъ, и оставишь одно лучшее. Но прежде того гряду выполошь начиспо, и эшо чрезъ все лѣто повшоряшь почасту. Есѣли во время посадки сѣменъ дождя не будетъ, должно ямочки полны наливать водою, и какъ скоро она впитается, класъ сѣмена, и шотчасъ закрывашь вынутаю землею.

Есѣли надобно имѣшь самую крупную рѣдку, должно сажашь сѣмена скорѣ послѣ Троицина дни, на аршинъ сѣ четвертью между собою разстояніемъ, и во время засухи и теплой погоды поливашь иногда. Есѣли корни въ растѣніи своемъ изъ земли выставляются, должно оные обвалишь землею и полить. Но шаковыя крупныя рѣдки надлежитъ осенью заблаговременно употребляшь въ расходъ; ибо, полежавъ долго, онѣ шруплявѣютъ. Прорастающъ иногда онѣ въ сѣменные стволы, но шаковыя бывающъ негодны.

Воспитаніе хорошихъ рѣдечныхъ сѣменъ требуетъ сѣянія, впрочемъ произойдешъ, что рѣдка выродинъ, и корни оныхъ таковыхъ недобрыхъ сѣменъ перемѣняшъ вкусъ и цвѣтъ свой. Къ полученію хорошихъ сѣменъ, выросшіе лѣпшомъ корни должно на зиму выкопавъ хранить въ выходѣ, или въ ямѣ въ огородѣ, весною же въ концѣ Марта или въ началѣ Апрѣля высадить на грядѣ вершковъ на шесть разстояніемъ въ квадратъ, и до шѣхъ поръ, какъ выходящіе спволы свободно пойдутъ въ ростъ, оныхъ посѣвонныхъ шравъ опалывашъ. Каждый родъ рѣдки должно сажашъ между собою въ отдаленіи, дабы во время цвѣту сѣменная пыль оныхъ не смѣшалась и не произошло оныхъ шого выродинъ. Когда на рѣдкѣ цвѣты развернутся, вползаютъ въ нихъ земляныя блохи, и зародыши плодъ выѣдають. Къ отпращенію сего должно ежедневно по однажды и дважды, пока продолжается цвѣтѣ, кусты спрыскивашъ водою; а когда сѣменные спручки начнутъ поспѣвашъ, отгоняшъ пшци, кои спручки разклеываютъ и сѣмена выѣдають.

Когда спручки сдѣлаются желты и поспѣють, спволы съ оными должно срѣзавъ посѣявшъ въ засѣвни споймя и спручками вверхъ. Когда поспѣють оныя нѣсколько дней, и въ спручкахъ и спволахъ оказывается еще нѣсколько сырости, перевертывашъ оныя съ боку на бокъ,

бокѣ, пока совсѣмъ засохнутъ, стручки будутъ между пальцевъ раздробляться и сѣмена свободно выпадаютъ.

Въ холодную погоду сѣмена не свободно вылуциваются; хотя бы стручки разломилъ или силюцилъ, но все еще зерна въ оныхъ будутъ оставаться. Нѣкоторые вымолачиваютъ рѣдечныя сѣмена, шакъ какъ хлѣбъ, цѣпами; но Г. Рейххартъ предписываетъ стручки разпачывать въ кадкѣ ногами босыми, и сѣмена очищать спалываніемъ.

Когда за недѣлю или за двѣ до Покрова сѣменную рѣдку для высадковъ выкопать должно, отбираешь къ сему надлежитъ самую лучшую и гладкую, безъ опросковъ, а припомъ у черныхъ рѣдекъ тщательно осматривать хвосты, чѣмъ не было на оныхъ бѣлыхъ или сѣрыхъ пшенишекъ, ибо шаковыя легко перераживаются въ бѣлую. Съ шаковыхъ выкопанныхъ корней обрѣзываютъ листья, но шакъ, чѣмъ сердца не повредишь; если же листья не обрѣзашь, произведутъ они въ корняхъ во время лежанія въ выходахъ или ямахъ гниль. Сѣмена, въ первой годъ опъ посѣянія сѣмечекъ рѣдечныхъ выходящія, что очень легко случается, когда сѣвъ произведенъ будетъ рано въ Апрѣлѣ, не годятся; ибо, хотя оныя и взойдутъ, но корни оныхъ въ то же лѣто пойдутъ въ стволъ, да и корни въ кушанье не удобны.

На-

Настоящая *ранняя* или *лѣтняя* рѣдка соспавляетъ особливой родъ, которой инако называется *твердая* рѣдка. Въ разсужденіи земледѣлія сходствуемъ она съ зимовою рѣдкою, но сѣмена оной должно сажать въ исходѣ Апрѣля мѣсяца, чтобъ она заблаговременно разполстѣла, но не столько выросла длинна и велика, какъ зимовая, и когда сію только сѣяшь начинающъ, она поспѣваетъ уже къ употребленію. Но хотя эшотъ родъ сѣющъ ранѣе, и доспигаетъ онъ своего совершенства, но никогда оной въ первое лѣто въ стволъ неидетъ, такъ какъ выше замѣчено объ озимой рѣдкѣ, и корни эшой рѣдки должно равномерно выкапывать, въ зиму сберечь отъ замерзанія, а весною опять высадить къ полученію сѣменъ.

Чтобы рѣдка выросла очень велика, введено прививаніе, а именно всѣиваніе просянаго зерна. Г. *Рейххартъ* производилъ сему опыты, и нашелъ, что эшо неправда. Когда рѣдка произходитъ отъ добрыхъ сѣменъ, довольно мѣста имѣетъ, и случится мочливая съ переменною солнечнаго сіянія погода, вырастаетъ она на хорошей землѣ до шаковой оптѣнной величины, что въ каждой бываетъ въсомъ по полупуду и выше.

Когда есть способъ много продать зимовой рѣдки, но мало по малу, на примѣръ еженедѣльно, то выдетъ очень затруднительно; когда въ выходѣ для большаго

шаго количества оной нѣтъ мѣста, земляныя ямы къ сему почасту ошкрывать, и вынимать на продажу изъ оныхъ по части, умалчивая о томъ, что въ большіе морозы это и неудобно. Почему Г. Фонъ *Экхартъ* предлагаетъ слѣдующій, очень легко сдѣлать удобный земляной погребъ или выходъ. Должно въ огородѣ, или по близости внѣ онаго, выкопать яму аршина въ два глубиною, аршинъ пяти шириною и сажень двенадцати длиною. Яму сію накрыть поперегъ жердями, сверху оныхъ хорошею длиною соломой, а на соломѣ насыпать на локошъ толщиною земли. Съ каждаго конца ямы сдѣлать сходъ въ нее съ дверьми, а сверху ошдушину въ три вершка величиною. Въ одномъ шаковомъ погребѣ, копорой не великаго труда и убытку стоить, можно уберечь великое множество разнаго зеленого огороднаго шовару. По срединѣ во всю длину оставляется маперикъ земли для ходьбы, по обѣимъ же сторонамъ насыпается на четверть аршина песку, смѣшаннаго съ землею, и уравнивается граблями.

Легко догадаться можно, что шаковой погребъ слѣдуетъ располагать на горѣ, или возвышенномъ мѣстѣ, гдѣ вода зайти не можетъ. Когда же въ шаковой удобности недоспадокъ, и по низменности положенія погребъ осенью отъ напеканія воды не можетъ быть безопасенъ,

мож-

можно оной сдѣлать посверхъ земли, а именно: около основанія погреба должно выкопать широкіе и глубокіе рвы, чѣмъ изъ вынутой изъ нихъ земли вывесити аршина въ два или три толщиною, и аршина полчетверша вышиною земляныя стѣны, на кошорыхъ могла бы опереться вышеписаннаго рода кровля. Эта кровля должна къ срединѣ имѣть небольшое возвышеніе или ребро, чѣмъ бы дождевая и снѣговая вода имѣла скатъ къ снѣжанію. Кому неудобно дѣлать рвы около погреба, то стѣны должно выводить изъ земли, привозимой изъ инаго мѣста. Но въ послѣднемъ случаѣ можно обойтись и безъ земли, а употребить глину, буде оную имѣть можно, кошорая по связности своей возлагаемое на нее бремя лучше сдерживать можетъ; изъ оной сбитъ поверхъ земли стѣны подобіемъ тѣмъ, какъ дѣлаютъ глиняныя ограды, что еще и прочнѣе. Въ обѣихъ дверяхъ помянутыя опдушины могутъ служить къ возобновленію въ погребѣ воздуха, отъ чего нѣкоторыя зелени во время зимы лучше удерживаютъ свою прочностъ. Въ жестокіе морозы опдушины сѣи должно зашыхать, равно и самыя двери прикрывать гороховинами, или длиннымъ конскимъ навозомъ.

Рѣдку, какъ выше упомянуто, обыкновенно дѣлаютъ сырую; оная приносятъ своею умножаетъ позывъ на ѣду и способствуетъ варенію пищи. Хоша же при-
 КЛЮ-

ключаетъ оная и у здоровыхъ людей надмѣнѣ живоша, но оное не бываетъ онягошительно: ибо черевы припомѣ спрекочепъ, и къ выходу вѣпры побуждаепъ. Слабаго сложенія людямъ пища сѣя не хороша; совсѣмъ иное обстоятельство, когда рѣдку упошреблятъ вмѣсто лѣкарства, ибо свѣже выжашый изъ нее сокъ составляетъ дѣйствительное средство къ разпущенію густыхъ и клейкихъ мокротъ, кои въ желудкѣ у слабыхъ особъ собирающа. Также и въ другихъ часяхъ тѣла сгущающіеся соки онымъ разбиваются, и въ особливости побуждается урина. Вообще рѣдка и хрѣнъ оказываютъ одинакое дѣйствіе, но послѣдній сильнѣе. Свѣжіе ломти рѣдечные спягивающъ кожу, и учиняющъ оную красною, почему обыкновенно прикладываютъ ихъ къ подошвамъ одержимыхъ водяною болѣзнію.

Нѣкоторыя ѣдятъ рѣдку вареную, по подобію бѣлой рѣпы; обыкновенно бываетъ это блюдо съ говядиною. Вкусъ ея бываетъ тогда далеко не таковъ остръ, какъ сырой. Оказывается однако, что вареная рѣдка, сколько ни ешь на оную охотниковъ, больше нежели сырая надмѣнѣ производитъ, а припомѣ и вяжетъ ошчаша, или совсѣмъ дѣлаетъ запоръ.

Лошади ѣдятъ рѣдку охотно; даютъ имъ оную въ лѣкарство, и въ предохраненіе отъ зоба на шеѣ.

38) Редисъ, *месячная рѣдечка*.

Извѣстно, что редисъ чѣмъ ранѣе въ году имѣть можно, тѣмъ пріятнѣе; ибо замѣняея тѣмъ недостатокъ другихъ зеленыхъ плодовъ на нѣсколько времени. Для охотниковъ можно оной сѣять ежемѣсячно чрезъ все лѣто, а потому и называется мѣсячною рѣдечкою. Сія мѣсячная рѣдечка бываетъ *длинная и круглая*; первую называютъ *рафанель*. Форельной редисъ долженъ имѣть съ наружности пурпурово-красныя пятна. Нѣкоторые садовники называютъ золотымъ редисомъ тотъ, котораго корни свѣтлы, лоснящіеся, бѣлы и круглы, и имѣютъ самые малые хвостики. Считаются оныя за самой лучшей родъ.

Сѣвъ редиса начинаютъ въ парникахъ еще въ февралѣ, и можно оный повсюду чрезъ каждыя три недѣли по 24 Августа, но всегда дѣлая свѣжую навозную гряду. На открытомъ воздухѣ начинается сѣвъ этотъ въ апрѣлѣ, на землѣ хорошо унавоженной, мягкой и освѣщаемой солнцемъ. Сажаютъ же редисъ между разными другими растѣніями, которымъ онъ по вынужденію изъ земли долженъ опростать мѣсто.

Земляныя блохи любятъ праву молодого редиса больше всякой другой, почему и сѣютъ оной подъ разсадою бѣлой капусты, чтобъ онѣ ее не прогали, а обращались бы на свое любимое растѣніе. А
чтобъ

чипобѣ земляныхъ блохъ отвлечь отъ редису, при всходѣ онаго тщаельно должно прыскашь водою.

Когда редисъ поспѣетъ въ пищу, и въ это время случится жаркая погода, легко оной шруплявѣетъ, дѣлается швердъ и невкусенъ. Къ отвращенію сего должно по совѣту Г. *Рейххарта* въ это время редисъ дважды въ день изобильно поливать. Длинной редисъ скорѣе шруплявѣетъ, нежели круглой, но и этому нужно частое поливаніе.

Въ покупкѣ не всегда можно получить настоящія сѣмена редису, почему должно самому оныя воспитывать. Берушь къ сему редисъ, означенный подѣ названіемъ золошаго. Отъ настоящихъ сѣменъ редисъ можно уже кушать, когда пустишь онъ чешвершой листъ. Если же сѣмена не хороши, то корни не прежде поспѣвають въ пищу, какъ листы ихъ вырастутъ въ нѣсколько вершковъ. Когда редисъ вырастетъ въ мизинецъ толщиною, бываетъ оной вкуснѣе.

Когда сѣются въ огородѣ разные роды редису, и отъ оныхъ воспитываются сѣмена, должно вынимаемые на сѣмена корни каждаго рода сажать на мѣстахъ особливыхъ и между собою опдаленныхъ, чтобы роды оныхъ отъ сѣменной пыли не перемѣшались и не произвели вырожденныхъ сѣменъ.

39) Лукъ, цыбуля (*).

Это составляетъ общее простое названіе луку, и котораго роды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ больше сажаются и употребляются, нежели другіе. Роды же онаго слѣдующіе:

АА. Обыкновенной рѣпчатой лукъ, красной и бѣлой, лѣтній лукъ, цыбуля.

Сего луку предъ всѣми другими водятъ больше, такъ что въ здѣшнихъ мѣстахъ крестьяне получающъ онаго съ своихъ огородовъ каждой больше трехъ четвертей, кою за опмѣнною крупностію прѣзжаютъ къ нимъ покупать изъ сосѣдственныхъ городовъ и деревень, и обыкновенно еще заранѣе задашки дають. Водятъ здѣсь красной и бѣлой лукъ. Последній не столько острѣе, какъ первый, и больше уважается въ домахъ особѣ средняго состоянія; потому что въ вареніи бѣлѣе оспается, и цвѣту кушанья, съ которымъ варится, такъ какъ красной, не поришитъ. Цѣна въ покупкѣ оному выше, почему простые граждане и крестьяне больше спрашиваютъ луку краснаго, а потому на оной бываетъ вѣрной и лучшій расходъ. Бамбергской лукъ называютъ *твердымъ*, а у насъ родившійся *мягкимъ*, потому что тотъ предъ нашимъ жестче,
кра-

(*) Цыбуля названіе, употребляемое въ Малой и Бѣлой Россіи, есть искорченное, происходящее отъ двухъ смѣшанныхъ Немецкихъ именъ луку, *Цвибсль* и *белленъ*. Вообще цыбуля значитъ дробной лукъ.

краснѣе и бѣдѣе. Различаютъ же еще лукъ названіями *Ивановской лукъ*, *саженецъ* и *стрѣльчатой*, кошорыхъ и вожденіе различно. Крупной бѣлой и красной *Испанской лукъ* отъ лѣшняго луку разнится шокмо величиною и не сполько оспрымъ вкусомъ.

Поелику во всей провинціи не родится такового крупнаго луку, ни въ такомъ множествѣ, какъ у насъ; то прежде описанія образовъ вожденія луку, въ другихъ мѣстахъ употребительныхъ, опишу здѣшній.

Здѣсь за цѣлой вѣкъ уже отходятъ отъ обыкновеннаго способу перемѣнятъ ежегодно мѣста подъ огородными растѣніями. Здѣсь лукъ сажается всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ повсегодно. Земля здѣшняя низменна, черна, и во все лѣто бываетъ больше влажна, нежели суха, но не мокра; ибо, когда это случится, лукъ урожаешся не хорошо, и выходитъ очень червивъ. Впрочемъ земля эта больше мягка, нежели шверда, и ежегодно изобильно угобжается коровымъ навозомъ. Сего можешъ бышь и не нужно дѣлать, но земляная вода въ глубокую осень выступаетъ довольно высоко, до самой поверхности земли, такъ что хотя на пядень въ глубину и не видно еще бываетъ чистой воды, но земля учиняешся сполько влажна, что не крошится и не разсыпаетъ, такъ какъ лѣтомъ, но связываетъ

ся большими глыбами, изъ которыхъ отъ сильнаго подавленія вода истекаетъ. Отъ сего происходитъ, что шукъ навоза не долго въ землѣ удерживается, высаживается водою, и пошому учиняетъ ежегодное унавоженіе нужнымъ. Какъ скоро вновь вывезенной навозъ въ Маршѣ засшупомъ будетъ закопанъ, разсѣвають луковыя сѣмена свержу и загребають граблями. Сѣють опчаспи между онымъ коренчашую пепрушку, салапъ и проч. Коренья пепрушки не прежде идутъ въ толщину, какъ лукъ ростъ свой кончитъ, и будетъ готовъ къ выкапыванію. Напрошивъ салапъ, паспарнакъ и шому подобное, своими разширяющимися корнями могутъ луку вредъ приключать, отъ чего оной желтѣетъ и въ ростъ своемъ удерживается. Выкапываніемъ луковицъ не спѣшатъ, и ожидаютъ иногда по исходъ Августа, пока перья на немъ совсѣмъ завянутъ и засохнутъ. Очищаніе оныхъ происходитъ при самомъ выкапываніи луковицъ, и мало дѣлаетъ затрудненія. Естьли же въ кошоромъ году купцы рано спрашиваютъ луку, выкапываютъ мѣстечко по мѣстечку въ огородъ на продажу, и прямо изъ рукъ у бабъ въ огородахъ лукъ покупають. Четверть здѣшняго луку въ обыкновенные годы сначала покупается по 4 шалера, позднѣе же осенью слишкомъ по пяти шалеровъ; въ неурожайные же годы восходитъ до семи шалеровъ.

Что

Что бы освобожденная отъ луку земля не гуляла, и въ мѣсяцы, способные къ растѣнію, что нибудь принести могла, приготавливаютъ капустную разсаду, кошую въ исходѣ Іюня сѣютъ на особой грядѣ, и кошая между шѣмъ вырастаетъ вершковъ шести. Сіи капустныя растѣнія, кои высаживаютъ рядами въ надлежащемъ разстояніи, и нѣсколько наклонивъ, вырастаютъ скоро, и доставляютъ въ домъ капусту на зиму. Еще долженъ я припомнить, что рачительныя крестьянки въ ясные дни засохшую и въ пыль обратившуюся дорожную грязь сгребаятъ обухами грабель, въ ночвахъ относятъ на луковые огороды, и по луку примѣчая, что скоро дождь пойдетъ, изъ рукъ разсѣваютъ, чѣмъ ростъ онаго несказанно способствуется. Я съ моей стороны въ этомъ намѣреніи еще множайшее растѣніе онаго замѣчалъ, когда собирая поменьше шелковыхъ червей, и обѣдки шуповыхъ листовъ, разсыпалъ оныя по луку. Однако сіе посыпаніе должно производить почасту, а не въ одинъ разъ, чтобы шраву молодыхъ луковокъ не засыпать и не приглушить.

Въ другихъ мѣстахъ избираютъ подъ лукъ таковую землю, кошая по унавоженіи годъ или два употреблена была подъ капусту, оную подъ зиму поздно осенью вскапываютъ заступомъ. По прошествіи зимы въ Мартѣ обсѣваютъ луковыми сѣменами очень рано; ибо морозы онымъ ни

мало не вредяшѣ, а сѣмена лежатѣ недѣль
пять или шесѣ въ землѣ до восходу. Нѣко-
торые высѣвають ихѣ подѣ зиму, и даже
въ Декабрѣ разсѣянные сѣмена выпапты-
ваются, снулая ногами слѣдѣ близѣ слѣда,
а потомѣ загребаются граблями. Въ пече-
нѣи лѣта лукѣ опалывается щипательно
опѣ шравѣ; также пока оной еще молодѣ,
въ засуху опрыскивается прудовою водою,
что должно производишѣ съ великою оспо-
роженостію, чтобѣ мѣлко въ землѣ сидя-
щихѣ корней не обмышѣ и не обнажишѣ.

Во Франціи, гдѣ преимущественно
много луку сѣютѣ, особливо въ Гюжжанѣ,
сѣютѣ оной на грядахѣ, сдѣланныхѣ изѣ
дорожной деревенской грязи, въ кошорой
содержишѣ много земли, и не столько
бываетѣ она горяча, какѣ грязь съ город-
скихѣ улицѣ. Она еще больше холодного
своиства, понеже соспавляется большею
частью изѣ соломы, кошорую выбрасыва-
ютѣ на улицу къ согниванію, и опѣ ко-
шорой навозѣ получаешѣ мало горячести
и жирности. На первой слой гряды изѣ
этой грязи накладываютѣ другой изѣ
дробнаго спараго перегниваго навозу, ко-
шорой нарочно къ сему берегутѣ, толщи-
ною въ вершокѣ. Въ этотѣ слой сѣютѣ
сѣмена такѣ густо, что зерна между со-
бою почти смыкаются. По разсѣянїи сѣ-
менѣ закрываютѣ ихѣ на четверть вер-
шка самымѣ дробнымѣ навозомѣ, кошорой
еще больше перегнилѣ того, въ кошоромѣ
сѣ-

сѣмена посеѣяны. Послѣ сего накрываютъ всю гряду вѣпочками, на примѣръ шерновыми или иными, чѣтобъ воздухомъ гряды не скоро осушивало, и морозы бы не очень на оную ложиться могъ. Для самаго сего гряды располагаютъ таковымъ образомъ, чѣтобъ освѣщало онѣя въ полдни солнце, и чѣтобъ были онѣя въблизи отъ пруда, для удобности къ поливанію весною, когда дни сдѣлаются пошепѣе. Тамъ сѣютъ лукъ въ половинѣ или съ 20 Января, для того чѣто съ сего времени не бываетъ уже большихъ морозовъ. Сѣмена лежатъ тамъ цѣлой мѣсяцъ до всходу, ибо все еще холодомъ задерживаются; однакожъ въ половинѣ Февраля во Франціи онѣя всходятъ, и потому чѣто въ этой землѣ большіе морозы тогда оканчиваются, открываютъ гряды, счищаютъ съ нихъ весь соръ, и естли гряды не имѣютъ съ сѣверной стороны защищюу спѣны или спроенія, защищаютъ ихъ соломенными щитами отъ суровости вѣтровъ. Когда случится засуха, поливаютъ гряды прудовою или рѣчною водою, а не колодезною, развѣ только изъ теплаго ключа, въ которую кладутъ для поправленія конскаго навозу. Меньше, нежели въ мѣсяцъ, естли зима не очень холодна, выдешъ уже прекрасной лукъ. Когда лукъ достигнетъ полщины малаго пера гусинаго, т. е. когда опуститъ два или три пера, пересаживаютъ его на землю, хорошо

вскопанную и унавоженную. Обыкновенно занимающіеся эшимъ земледѣліемъ пріугошворяютъ къ сему землю еще съ осени, и разбивъ довольно глыбы, оставляютъ въ зиму такъ лежать, чѣмъ земля къ пересадкѣ луку умякла. Дѣйствіе это опправляется малою мошикою. Дѣлаютъ оною борозды въ вершокъ глубиною, и есѣли желаемо имѣть луковицы лучшія, сажаютъ оныя вершка на 2 съ половиною и на шири разстояніемъ между собою, на ребрѣ бороздъ, чѣмъ корни свободнѣе распространяться могли. Тогда луковицы покрываютъ на добрые полвершка землею, и дѣлаютъ новую борозду близъ первой. Луковицы первой борозды покрываются землею изъ второй борозды, такъ продолжаютъ покрывать луковицы второй борозды землею изъ третьей борозды, пока дойдутъ до шестой борозды, кошорая лукомъ не засаживается, но оставляется для ходьбы огороднику, чѣмъ имѣлъ онъ свободу за лукомъ присматривать, травы выпалывать, и землю въ послѣдствіи маленькими граблями проскребаать. Таковымъ способомъ одна гряда дастъ столько лука, чѣмъ можно будетъ онымъ засадишь немалое земли пространство. Когда растѣнія сажаютъ между собою въ равномъ разстояніи, можно отъ фунта сѣменъ засадишь шестую долю десятины лукомъ. Когда земля добра и сѣмена опборныя, можно навѣрное надѣяться, чѣмъ луковицы

цы выдутъ крупны и во многомъ количес-
ствѣ, а особливо когда при пересадкѣ лу-
ковыхъ высадковъ въ концѣ Апрѣля зем-
ля не будетъ суха, а будутъ упадать ма-
лые дожди, оную овлажняющіе; ибо луко-
вицы хотя и легко принимающся въ пере-
садкѣ, но можеть случиться, что въ
недоспашкѣ влажноти отъ росъ многія
изъ нихъ выпадутъ. Есть родъ червей,
которыя луку великой вредъ приключа-
ютъ, что прсизходитъ равно отъ земля-
ныхъ гусеницъ, сверчковъ и крошкѣвъ; ибо,
когда луковицы посажены будутъ рядами,
животныя сіи переходятъ изъ ряду въ
другой, и почти все испребляютъ. Нѣ-
котораго свойства земли больше другихъ
сему злу бывають подвержены, а особли-
во лежащія смежно къ лугамъ; потому
что въ это время года животныя сіи отъ
воды, которую тогда во Франціи на лу-
га пускаютъ, изъ оныхъ выгоняются, и
опустошаютъ сосѣдственныя мѣста. По-
чему безъ нужды на таковыхъ мѣстахъ
луку не высаживаютъ, а особливо къ са-
мому наводненію луговъ. —

Искусные огородники изъ сего шруд-
наго луковаго земледѣлія многое най-
дутъ выкинуть, а нѣкоторое оставятъ
для опытовъ къ подражанію, какъ-то
должно наблюдать и со всѣми перенимае-
мыми у иностранцевъ дѣйствіями. По-
чему находящія слѣдующія замѣчанія Г.
Геппена въ его Энциклопедическомъ лѣто-

писцѣ, присовокупленные къ сему Французскому земледѣлію. Я нахожу въ этомъ способѣ вожденія луку великое затрудненіе, состоящее въ томъ, что много времени и работы пошребно для пересадки. Сверхъ того замѣшилъ я, что лукъ, выращенный таковымъ образомъ, имѣетъ толстую кожу, позднѣе поспѣваетъ, и не таковъ проченъ въ лежанье. Луковицы, вырастающія въ жирной и сильной землѣ, еще меньше бывающъ прочны, выраживаются, и еще позднѣе поспѣваютъ. Замѣтилъ же я, что противу всеобщаго правила о поваренныхъ растѣніяхъ луку глубокое земли вскапываніе и глубокое сажденіе. Оной растетъ обыкновенно на поверхности земли. Если земля будетъ вскопана глубоко, мочка луковицъ распространяется далеко, и находя во глубинѣ земли много питанія и влаги, растѣніе идетъ только въ перья, и луковицы ни мало не выходящъ таковы крупны, какъ въ землѣ, вскопанной однимъ заступомъ. Это погрѣшность, которую никто не замѣчаетъ, и которую очень легко поправить можно, не рѣдко бывающъ причиною, отъ чего выходитъ лукъ нехорошъ, не столько прочной въ лежанье, какъ выросшій на землѣ, мѣлче вскопанной, и которой изрѣдка поливаютъ, пока онъ возметъ силу. Отъ теплоты луковицы вырастающъ велики, и скоро поспѣваютъ. (Это замѣчаніе очень важно, и шѣмъ больше,

ше, когда пошва земли сама по себѣ не холодна, а шепла; ибо зѣбниная наша пошва, на кошорой, какъ выше сказано, самой крупной изъ всей провинціи лукъ родится, шаковаго роду.) Чѣшобѣ лукъ проченѣ былѣ въ лежанье, должно, чѣшобѣ кожа была на немѣ самая тонкая, и опшускалѣ бы онѣ мало перьевѣ. Толсшыя луковицы, имѣющія малую мочку, лежалѣ всѣхѣ прочнѣе. (Прочносѣ луку не такѣ разумѣшѣ должно, чѣшобѣ лѣшній лукъ весною долго могѣ лежалѣ въ одинакой доброшѣ; ибо чѣмѣ больше весенняя шеплоша прибываетѣ, шѣмѣ больше луковицы прорастающѣ и шперяющѣ прежній свой добрый вкусѣ. Между шѣмѣ луковицы выше замѣченнаго свойства лежалѣ долѣе, пока въ томѣ мѣсшѣ, гдѣ ихѣ храняшѣ, прорастушѣ. Лучшее же содержаніе сберегаемыхѣ луковицѣ состоишѣ въ томѣ единственно, чѣшобѣ онѣ не сгнили. Эшо испышывающѣ многіе, водящіе или покупающіе лукъ нехорошаго роду, когда у нихѣ зимній запасѣ около Рождества уже до половины согниваетѣ, и слѣдшвенно шаковому луку не достаешѣ прочности.) Знапоки удобно умѣющѣ лукъ выбирать, и не хорошій опшкладывающѣ особливо, либо для скорого упошребленія въ расходѣ, или въ посадкѣ, чѣшобѣ получить цыбулю или дробный лукъ. (Цыбуля, значишѣ дробной опѣ перераживанія происходящій лукъ. Оной довольсшвуешѣ худою землею и худшимѣ земле-

дѣ-

дѣлѣемъ.) Луковицы, опредѣляемыя къ продолженію своего рода, опбирающіяся крупныя, тонкокожія, мало листовѣ имѣющія, и зимою не опустившія ростковѣ. Сѣменныя луковицы, какъ скоро снѣгъ сойдесть, должно высаживать въ землю среднюю, ни очень жирную, ни легкую. Должны онѣ имѣть между собою пространства на 6 вершковѣ, и когда опустяшъ сѣменныя спрѣлки, втыкаяшъ близъ оныхъ палочки, и привязывающъ къ онымъ спрѣлки мочаломъ, чѣмъ опъ ливнаго дождя и вѣтровѣ не повалялись и не ломались. Сѣменѣ не собираютъ, пока оныя не высѣютъ совершенно. На сей конецъ должно до шѣхъ поръ ожидать, пока спрѣлки пожелѣютъ и почти совсѣмъ засохнутъ. Когда же сѣменныя луковицы высадишь въ тучную и глубоко вскопанную землю, то мочка луковицъ глубоко въ землю простираясь, найдетъ слишкомъ много пищи, а опъ сего сѣмена не такъ совершенно вызрѣютъ, и въ будущемъ посѣвѣ не таково хорошо взойдутъ, какъ бы надлежало. Какъ дробной лукъ, такъ и на грядахъ сажаемый, ощущаетъ сіе весьма, и послѣдній опъ того выраживается. Видимо изъ всего сего, что образъ луковаго земледѣлія не есть мало-важность, какъ бы думашъ надлежало, и что не лѣзя довольно употреблять старанія, когда желашъ имѣть добрый лукъ и всегда одинакой доброты. (Главная причина,

на, отъ чего глубоко въ землю проспирающіяся луковицы плохія сѣмена приносятся, можетъ быть сія, что въ поверьхности земли находящѣ меньше сырой питательной сокъ, коюрой свойству ихъ лучше приличенъ; ибо луковицы вообще лучше урожаются, чѣмъ теплѣе будетъ земля и погода. Соки земные на поверьхности, а особливо въ черноземѣ, лучше отъ солнца, такъ сказать, перевариваются. А въ теплой странѣ, какова Франція, солнечный жаръ глубже проспирается въ землю, нежели у насъ (*), такъ что тамъ глубже сажаемый лукъ лучше нашего урожається можетъ, нежели бы мы сажали оной столькожъ глубоко, а особливо въ глинистой холодной землѣ.)

Въ разсужденіи различнаго состоянія луку въ отношеніи къ его добротѣ и вкусу говоришь помянутый писатель слѣдующее: почти всякаго рода земля способна лукъ производить. Онъ рождается во всѣхъ огородахъ. Между тѣмъ есть роды земель, въ коихъ онъ лучше урожається, а шаковы легкія, песчаныя и каменистыя земли (въ нихъ солнечная теплота легче вникаетъ и согрѣваетъ); напротивъ очень твердыя, глинистыя и холодныя земли подъ лукъ самыя неспособныя. Лукъ имѣетъ вкусъ острѣе и слабѣе отъ свойства

(*) Подъ одинакимъ съ Франціею климатомъ лежатъ въ Россіи Астрахань, Сарашовъ, и мѣста по теченію рѣкъ Дона и Донца.

сства земли и навозу, подѣ него употребленныхъ. Во всѣхъ твердыхъ и суглинистыхъ земляхъ получасѣ онѣ вкусъ кисловатой, толстую кожу, и въ сыромъ яденіи непріятность. Напрошивъ таковой предпочитается для варенія и соусовъ предѣ другими родами. Навозъ изъ дорожной грязи и зѣла изъ щелоковъ сообщающѣ луку несказанной росѣ.

Кому надобенъ лукъ слабѣе вкусомъ, и чѣобъ сколько возможно не было въ немъ остроты, должно сажать его въ песчаной землѣ, унавоживаѣ перегорѣлымъ навозомъ изъ старыхъ паровыхъ грядъ; и когда въ таковую землю посадишь родъ лука продолговатаго, копорой подобенъ грушамъ видомъ, выдеѣ лукъ, столькожъ мало остроты содержащій, какъ яблоки, копорой пріятенъ въ сыромъ вкушеніи, и не ославляющій зловонія изъ рта. Во множествѣ луковицъ, народной грядѣ распуцѣхъ, всегда однѣ выходяѣ острѣе, а другія слабѣе. Признакъ къ отбиранию слабыхъ вкусомъ, копорыя въ давленіи между пальцевъ кажутся мягче; для того чѣо твердыя и къ соску или верѣху своему имѣющія зеленыя полосы всегда вкусомъ бывающѣ острѣе.

Время поспѣванія луку къ выкапыванію онаго зависитъ отъ множайшей или меньшей теплоты и сухости лѣта, почему въ точности онаго показатъ не можно. Спѣлость же лука узнающѣ по тому, чѣо права или перья

перья онаго сами собою поваляющся и поблѣющъ. Въ нѣкошорыхъ хозяйствахъ есть обыкновеніе, даже въ Экономическихъ книгахъ предписывается, лукъ въ концѣ каникулъ припапшывать ногами, чтобъ споспѣшествовать шѣмъ росту и созрѣванію луковицъ. Однако Г. Рейххартъ по опытамъ своимъ сего не одобряетъ, и говоритъ, что онъ по опытамъ нашелъ, что лукъ отъ того скорѣе загниваетъ.

Не должно ожидать того, пока всѣ луковицы вышеписанный признакъ сплоски на себѣ окажутъ. Выкапываніе учреждающъ по мѣрѣ того, какъ большая часть луковицъ окажется сплелыхъ, и при томъ перья у луковицъ завершываютъ, и до половины отпрыгаютъ, чтобъ скорѣе высыхали.

Выкопанные луковицы рассыпаются къ сушенію въ прохладномъ покоѣ на полу. Это главнѣйше тамъ нужно, гдѣ оставляющъ перья, къ удобности связыванія луковицъ въ плетенки съ соломой на продажу. Здѣсь луку шаковымъ образомъ не вяжутъ, но продаютъ на четверикъ, почему у высохшаго луку праву влошь отвершываютъ. Когда рассыпанный лукъ нѣсколько дней на полу пролежитъ, ворочаютъ оной деревянными граблями, и повторяющъ это по нѣкоемъ времени еще раза два. Оставляющъ оной такимъ образомъ рассыпанной такъ лежатъ до зимы, или сгребая оной граблями въ высокія кучи.

Лукъ

Лукъ замерзаетъ равно, такъ какъ садовой овощъ. Почему предъ наступленіемъ большихъ морозовъ должно перенести его въ избу или покой, хотя не шопленой, но защищенной, куда бы морозъ не проникъ, и насыпаютъ слоемъ вершковъ десятию толщиною. Если насыпать его выше сего, легко начинаеть онъ пошеть и согнивать. Въ жестокіе морозы должно накрывать лукъ соломой или вершемъ, но покрывку шопчасъ снять, какъ скоро сильной морозъ кончится. Можно бы лукъ сберегать въ выходахъ отъ холоду, но влажность, въ оныхъ находящаяся, скоро принуждаетъ его прорастать. Въ шопленомъ покоѣ шого же опасаться надлежитъ.

Если случится, что лукъ смерзнеть въ глыбу, лучший способъ спасти оной такъ лежать не шрогая, пока въ начинающееся тепло самъ оттаеть, для чего должно тогда окна отворить, и шеплому воздуху входъ доспавить; въ этомъ случаѣ хотя не всѣ, но многія луковицы годятся къ употребленію.

Обхожденіе съ сѣменнымъ лукомъ выше упомянуто. По отобраніи луковицъ самыхъ чистыхъ, крупныхъ, широкихъ и лоснящихся, можно оныя заправу соломой въ пучки связавъ, привѣсить въ сухомъ покоѣ, и въ свое время отъ сильныхъ морозовъ равномерно прикрывать. Когда сѣменные головки луку въ концѣ

Ав-

Августа, или въ началѣ Сентября, пожела-
тѣюшъ и шреснушъ, срѣзавъ ихъ кла-
дущъ въ мѣшки, понеже впрочемъ много
сѣменъ разсыпаетсѣ. Сушатъ оныя, разсы-
пая въ тѣнѣишомъ сухомъ мѣстѣ на до-
скахъ тонкихъ слоемъ. Во время влаж-
ной погоды ворочающъ ихъ граблями, чѣобъ
сѣ нижней спороны не заплѣсневѣли. Сѣ-
мена не вылущивающъ числѣ до насту-
пленія ясныхъ и морозныхъ зимнихъ дней.
Тогда, по обыкновенію нѣкоторыхъ мѣстъ,
головицы молосятъ на покахъ, насыпавъ
слой толщиною вершковъ въ шестъ, да-
бы удары цѣповъ до нижнихъ не прохва-
щывали и сѣменъ не вредили. У кого сѣ-
менъ сихъ не много, вытирающъ ихъ ру-
ками изъ головицъ. Попомъ просѣвають,
и лузгу спалываютъ на ночвахъ, а послѣ
въ мѣшечкахъ хранятъ въ сухомъ мѣстѣ.
Сѣмена сіи прочно лежатъ два года. Нѣ-
которые совѣтуюшъ сѣмена предъ посѣ-
вомъ мочить два часа въ водѣ, и потомъ
смѣшивать сѣ просѣянною золою; но это
не слишкомъ нужно: ибо сѣмена рано
весною по окончаніи морозовъ сѣющъ, ко-
гда еще въ землѣ находишся влажностъ.
Полезно это тогда, когда послѣ сѣву на-
станетъ продолжительная засуха, копо-
рая такъ землю высосетъ, что сѣмена
взойти не могутъ. Въ этомъ случаѣ
полезно помогать сѣменамъ опрыскива-
ніемъ грядъ водою, и шѣмъ способствовать
всходу оныхъ. Впрочемъ сѣмена луч-

ше сѣять густо, нежели рѣдко. У насъ изъ луку ничего не выдесть, естѣли посѣять оной рѣдко. Чѣмъ гуще, тѣмъ лучше. Въ послѣдствѣ молодыхъ луковицы съ перваго полошья продергиваются на расходъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ сидятъ густо. Корень и перья молодыхъ луковицъ равно идутъ въ пищу. Креснянскія бабы связываютъ шаковой молодой лукъ въ пучки, чтобъ оной готовъ былъ къ продажѣ спрашивающимъ онаго; ибо сему луку великой расходъ весною для салатова, яичница, похлѣбокъ и разныхъ мясныхъ блюдъ, въ кои крошатъ его съ перьями.

Ивановской лукъ называется шомъ, которой сѣютъ за двѣ недѣли до Иванова дни (24 Юня), и осаживаютъ въ землѣ зимовать, чтобъ по сходѣ снѣгу весною готовъ былъ онъ съ перьями своими. Сѣмена сего луку не различествуютъ отъ обыкновеннаго лѣшняго или стрѣльчатого луку. Они тѣже, но только по сказанному высѣваются позднѣе.

Изъ лѣшняго луку отбираютъ пакъ называемой *лукъ саженецъ*, которой бываетъ либо *стрѣльчатой*, или обыкновенной *саженецъ*.

Саженецъ называютъ инако *яловецъ*, потому что оной сильнымъ высушиваніемъ до того доводятъ, что оной въ сѣменные стрѣлки неидетъ, и по посадкѣ въ землю отпускаетъ одни кусты перьевъ. Яловцемъ же называютъ его потому,

тому, что онъ сѣменъ не приноситъ, и взято это названіе отъ коровъ, еще не иѣвшихъ, коихъ называютъ яловицами. Къ произведенію изъ лѣшняго или песочнаго луку осенью сажена отбирающіе головки самыя дробныя, насыпающіе ихъ въ лукошки или на рѣшетки, изъ ивовыхъ прутьевъ рѣдко сплешенныя, или на доски изверченныя, и спаваяющіе оныя на печь (или въ кресъянскихъ избахъ надъ устьемъ печнымъ, чѣмъ прокопчили отъ дыму), чѣмъ гораздо высохли. Должно въ этомъ случаѣ луковицы насыпать тонкимъ слоемъ не больше двухъ вершковъ, нѣсколько разъ перевертывающіе, и по двухъ недѣляхъ, когда довольно высохнутъ, снимающіе, а на мѣсто ихъ насыпать свѣжихъ къ сушенію. Все дѣло въ томъ состоитъ, чѣмъ насыпать слой не толстъ, дабы лучше просыхали; для того чѣмъ въ противномъ случаѣ большая часть луковицъ удержатъ силу свою къ прораспанію въ сѣменной стволъ, и не выйдутъ изъ оныхъ луку яловца. По засушеніи хранятся они въ сухомъ мѣстѣ до весны, а тогда высаживаются въ копную землю на 2 и на 3 вершка разстояніемъ, и на три четверти вершка глубиною вдавливаются въ землю руками, или садилкомъ такъ сажаются, чѣмъ ростокъ пришелся вверхъ. Оныя предъ лукомъ сѣнцомъ или лѣшнымъ столько оплечаются, чѣмъ вскорѣ велики разрастаются,

и созрѣвъ бывающѣ оныхъ вдвое и шрое крупнѣе.

Кому надобно имѣть обыкновенной *лукъ саженецъ*, отбирающся къ сему равномѣрно самыя малыя луковки сѣбенцу, и зимою хранятся въ сухомъ мѣсѣ. Нѣкоторыя кладущѣ ихъ въ льняной мѣшокъ, пересыпающѣ сухою золою, и привѣшивающѣ въ черной избѣ. Весною сажаютъ оныя въ землю свѣже-вскопанную на полтора вершка глубиною. Поелику оныя не засушиваютъ шакъ, какъ *лукъ яловецъ*, то пускающѣ оныя стрѣлки, и сѣмена приносящѣ. Почему въ покупкѣ сѣменъ корыстолобивые люди не рѣдко обманываютъ, продавая сѣмена не большаго луку сѣбенцу, но собранныя со стрѣльчагаго луку саженцу.

ББ. Зимовой *лукъ*.

Зимовой *лукъ* должно считать за осободіе особливое отъ лѣшняго или сѣбенцу луку, и въ православіи называется онъ продолговатой *лукъ* съ надутою стрѣлкою, которая длиною равна надутымъ перьямъ. Сера oblonga C. В. Р. Allium fistulosum у *Линнея*. Луковица имѣетъ кожи на себѣ иногда красныя, иногда бѣлыя, къ верху она возвышенна, къ низу сжата, и внизу гораздо толще, нежели вверху, запахомъ же и вкусомъ сходна къ лѣшнему луку. Стрѣлка вырастаетъ не выше шести вершковъ, въ срединѣ брюшиска, и по содержанію своему толще, нежели у
лѣ-

лѣшняго луку. Лиспы, или какъ называющѣ перья, надушы, не много покороче стрѣлки, или одинакой съ нею длины. Цвѣточное влагалище однолистное, широкое и короткое, а шарообразная цвѣточная голова поменьше, нежели у перваго рода. Плодъ состоишъ какъ бы изъ трехъ соединенныхъ шариковъ, а сѣмена черны и угловаты.

Употребляющѣ эшотъ зимовой лукъ подобно сѣнцу, кромѣ того, что отъ сего употребляютъ одни корни, а отъ того корень и перья.

Сѣвъ производится нѣсколько позднѣе, около половины Апрѣля; луковицы же вынимающѣ обыкновенно въ Ивановъ день (24 Юня), и разсаживаютъ на другомъ хорошо вскопанномъ мѣстѣ, на шесть вершковъ между собою разстоянїемъ. Въ каждую садилomъ сдѣланную ямку сажается по 3 и 4 луковки, по укороченїи длинной оныхъ мочки, также и обрѣзанїи перьевъ поменьше половины. Потомъ поливаютъ ихъ, чтобы лучше принялись. Въ послѣдствїи земля между луку взрывается, и опалывается отъ поспороннихъ травъ. На зиму оспаваютъ ихъ въ землѣ, потому что морозъ имъ ни мало не вредитъ, и перья ихъ остаются зелены подъ снѣгомъ. Весною вынимающѣ эшотъ лукъ для употребленїя. Бѣлыя луковицы сего рода уважаютъ больше красныхъ.

Къ собранію сѣменъ бѣлыя луковицы отъ красныхъ отдѣляются, и каждой родъ высаживается на особливую гряду, довольно освѣщаемую солнцемъ. Сѣменные стрѣлки выходятъ въ Маѣ мѣсяцѣ, и сѣмена бывають обыкновенно крупнѣе и совершеннѣе, нежели у лѣшняго луку; лежатъ всхожи два и три года.

ВВ. *Шалотъ, Аскалонской лукъ съ равнообразною стрѣлкою.*

Этотъ родъ малаго и пріятнаго вкуса луку требуетъ доброй, песчаной или рыхлой земли, и не вновь унавоженной. Обсаживаютъ онымъ нѣкоторые края грядъ въ поваренномъ огородѣ. Сѣмена его привозятъ къ намъ изъ Франціи и Италіи, пошому что у насъ этотъ лукъ не цвѣтитъ и сѣменъ не приноситъ. Корни же его у насъ состоятъ изъ многихъ совоккупленныхъ зубковъ, величиною въ лѣсной орѣхъ, и сходящаяся оканчиваясь волосистой мочкою. Перья у него шонки, шрубковаты и шиломъ. Кругловатая, голая стрѣлка бываетъ въ пядень вышиною. Луковицы множественно употребляются въ поварняхъ, и имѣютъ вкусъ и дѣйствіе гораздо умѣреннѣйшее предъ описанными выше луками.

Размножаятъ лукъ этотъ у насъ раздѣленіемъ зубковъ луковочныхъ, которые сажаютъ либо въ Сентябрь, или весною, на три вершка разстояніемъ и на вершокъ или полшора глубиною, къ чему
отбѣ-

отбираютъ зубки малые и средніе, а крупные упошребляютъ въ поварѣ. Когда саженье производится подъ зиму, покрываютъ гряду на вершокъ или полпора конскимъ или коровьимъ навозомъ, и оставляютъ оной лежать на грядѣ какъ зиму, такъ и въ лѣто. Онѣ сего луковицы очень хорошо растутъ и несказанно размножаются.

Шалотъ выкапываютъ обыкновенно 25
Юля, когда перья его пожелкнутъ и по-
валявшись сохнутъ, начнутъ. Завяливъ
оныя тогда и разсыпавъ на полу въ про-
хладномъ мѣстѣ, отдѣляющъ малыхъ лу-
ковки отъ крупныхъ, первыя для сажде-
нія, а другія въ пищу.

Лукъ въ Европѣ служилъ богатымъ и убогимъ ошчасни приправою, часпью же просто въ пищу. Однакожъ собспвенно пищею счишашъ онаго не должно, и когда употреблшашъ оной съ излишкомъ, приключашъ онъ надмѣнїе и производшъ худые соки въ шѣлѣ, или оныя слишкомъ разводшъ и въ движенїе приводшъ, умножашъ же онъ и плоское вожелѣнїе.

Въ приправѣ возвышаетъ онъ несканно вкусъ яствъ; а когда употреблять его вмѣсто лѣкарства, способствуешъ онъ не токмо варенію желудка и разводитъ мокроту, но гонитъ и урину. Здѣшніе крестьяне имѣютъ обыкновеніе, когда нужно побудитъ иссеченіе урины, крошитъ бѣлой лукъ въ малые кусочки, на-

дивашь хлѣбнымъ виномъ, и настоявъ 12 часовъ, пишь. Я многократно видѣлъ и слышалъ, что эта насойка вдругъ больнымъ помогаетъ, хотя бы шрой сушокъ ни капли урины у нихъ не исходило, и прешерпѣвали отъ того великое страданіе. Почему должно съ древними врачами согласиться, когда они полагали лукъ за средство, камень разбивающее. Г. Спилманъ повѣствуетъ, что въ Спразбургѣ множественно употребляющъ лукъ отъ опягощенія груди, разваривая къ сему двѣ или три луковицы въ шѣлячемъ супѣ, и вдругъ сбѣдая,

Когда для лѣкарства бѣсть лукъ сырой, можно только отъ малаго количества онаго ожидать желаемого дѣйствія. Въ сыромъ вкушеніи сего въ особливости отъ него ожидаемо, что онъ позываетъ на бду, желчь изгоняетъ, и вареніе крѣпкаго желудка облегчаетъ. У насъ въ немногихъ кушаньяхъ употребляющъ въ домахъ средняго состоянія лукъ сырой, какъ-то къ сельдямъ, холодному гороху, и проч. Въ дѣйствіи моемъ знавалъ я знаменитаго Штабъ-Офицера весьма престарѣлыхъ лѣтъ, въ каковыхъ суровую пищу употреблялъ уже не ловко; но онъ бдалъ даже въ зимнее время, первымъ блюдомъ въ обѣдѣ, холодной отварной горохъ съ ренскимъ уксусомъ и множествомъ накрошеннаго сыраго луку, сказывая, что желудокъ его отъ этой пищи не-
ска-

сказанно укрѣпляется, а шѣло швердосшь и бодросшь получаешѣ. Кромѣ Турокѣ и Венгровѣ, опчаспи же Поляковѣ, ѣдяшѣ здѣшніе природные Венды, а особливо вѣ завпракѣ, лукѣ, и вѣ послѣднихѣ оказы-
вается, не взирая на шо, что они изѣ всѣхѣ Нѣмецкихѣ народовѣ довольствуются худ-
шею пищею, и мало или вовсе не ѣдятѣ мяса, что они бывающѣ рослые, крѣпка-
го сложенія и сильные люди. Сырой лукѣ вѣ нѣкошорыхѣ скудныхѣ Нѣмецкихѣ об-
ласпяхѣ составляетѣ шерякѣ крестьян-
ской, кои ѣдятѣ его сырой нашоцакѣ вѣ предохраненіе опѣ мороваго повѣшрїя и
другихѣ заразительныхѣ болѣзней. Одно
неудобство вѣ немѣ, что особы средняго
состоянія должны осперегаться ѣспѣ его
сырой, за остающимся опѣ шого зловонї-
емѣ изо рта. Должно всему семейству сго-
ворясь ѣспѣ сырой лукѣ; ибо не ѣвшему
вѣ сообществѣ ѣвшихѣ сидѣшѣ противно.
Сожалишельно пошому, что еспешвен-
ной запахѣ лишаетѣ насѣ сполько нужной
для здоровья пищи, когда видяшѣ и слы-
шашѣ, какое дѣйствїе производитѣ онѣ вѣ
проспомѣ народѣ. Но можно изыскашѣ ка-
кое нибудѣ средство кѣ удержанію зло-
вонїя, остающагося послѣ луку, или заглу-
шенію онаго, на примѣрѣ, вѣ завпракѣ
послѣ луку сѣѣспѣ довольно хлѣба сѣ
масломѣ, или державѣ предѣ ршомѣ пла-
токѣ, сильно дыхашѣ изѣ себя и вѣ се-
бѣ дыханіе вшягивашѣ, или жевашѣ послѣ

благовонные корни, травы, листья и плоды.

40) Порей, или лукъ съ чесночными листьями.

Порей или порѣ, чеснокъ и лукъ составляютъ роды очень между собою сходные, и только нѣкопторыми признаками отличаются. Древніе писатели различіе это полагали въ корняхъ. Чеснокомъ *alium* называли они тѣ роды, коихъ корень сосоставленъ изъ совокупленія многихъ частей; лукомъ *seera*, у котораго корень цѣльной и состоитъ изъ многихъ кожъ, одна другую покрывающихъ; а поромъ или пореемъ, у котораго луковочной же корень, но кошорой листьями онъ обоихъ первыхъ отличенъ; ибо лукъ имѣетъ пустые внутри или трубкою листья, а у поря оныя плоскіе, какъ у чесноку. Это различіе содержатъ и простые садовники. Къ поваренному употребленію пореевъ сѣются слѣдующіе роды:

АА. Порѣ съ луковыми или трубчатыми листьями, малой порей.

Этотъ родъ порею у насъ очень обыкновененъ, и въ особливости весною многешвенно подмѣшиваеиъ въ салатъ, яичное кушанье, кислую капусту, и съ молодыми огородными шравами въ супы, къ общенію онымъ приноси; а силою сходствуетъ къ обыкновенному луку, хотя въ меньшей мѣрѣ. Размножаютъ его раздѣленіемъ луковицъ, и посадкою оныхъ осенью и весною. Онъ на всякой землѣ родитъ.

дился, но лучше на доброй тучной. Обсаживаютъ онымъ гряды по краямъ, и въ цвѣтникахъ рабашки; ибо онъ оспаиваетъ зиму и лѣто на своемъ мѣстѣ, и никогда не вымерзаетъ. По тому же, что онъ долго посидѣвъ на одномъ мѣстѣ, разрастается, и онъ густошны глохнетъ или выпадаетъ, лучше оной чрезъ каждые два года пересаживать. Избираютъ къ сему цвѣтные корни, ибо вскорѣ размножаясь они онъ побочныхъ луковъ. Если онымъ обсажены рабашки, должно листы и стрѣлки его иногда приспиргать, и шѣмъ придавать рядамъ красоту: ибо въ упущеніи сего приспирганія перья отраснутъ высоки, и въпрямъ ихъ разворачивая перепутывается, и шѣмъ производитъ непріятной видъ.

Не должно позволять берущимъ эшотъ порей изъ цвѣтниковъ для поварни рвать руками, должно его обрѣзывать; по тому что онъ рванья корни слишкомъ протаются, и въ сухое время погибаютъ, такъ что происходятъ промежки, очень гнусной видъ въ шаковыхъ опушкахъ производяще. Не должно же обрѣзывать и въ дождь, ибо вода затекаетъ въ срѣзанные шрубочки перьевъ, онъ чего оныя желкнутъ и вянутъ. Но какъ поваренныя надобности случаются и въ дождь, и конца оному ждать не можно, содержатъ для сего низенькую длинную скамеечку, которую спавятъ на обрѣзываемый порей, и шѣмъ

тѣмъ оной отъ дождя закрываютъ. Не должно же для повареннаго расхода срѣзывать порей, какъ ни понало, и въ разныхъ мѣстахъ, но производитъ обрѣзываніе съ одного мѣста далѣе. Если расходъ поваренной великъ, и одного ряду станеть не на долго, можно приняться тогда за другой, выравнивая обрѣзку. Впрочемъ обрѣзка порею приноситъ великую пользу молодымъ домовымъ пшцамъ; крошатъ его мѣлко и смѣшавъ съ опрубями или дробинами даютъ имъ. Гусямъ, когда они перишься начнутъ, кормъ эпотъ составляетъ хорошее лѣкарство къ предваренію ихъ болѣзней и обыкновеннаго помиранія курамъ индѣйскимъ и просымамъ служишь эпотъ кормъ отъ силу. Если удастся прѣучить къ оному ягнятъ, вообще укрѣпляетъ онъ ихъ натуру. Даютъ онымъ порей нерубленой, но смѣшавъ съ хорошими молодыми травами. Привыкають они къ нему скоро, и наконецъ бѣдятъ одинъ охотно, и тѣмъ освобождаются отъ пѣявокъ и другихъ опасныхъ болѣзней легкаго. А поелику нѣтъ ничего легче, какъ размноженіе сего луку, копорой при томъ служишь и украшеніемъ цвѣтничковъ, бывъ безпрестанно почти пристригаемъ, и въ сприжкѣ видомъ не уступаетъ шпалеркамъ буковымъ: то Хозяину о разводѣ онаго спараться должно, и ягнцкамъ своимъ, а особливо въ случаѣ нездоровой паствы и погоды, давая онаго вре-

временно вмѣсто завтраку. Чеснокъ конечно производишь сильнѣйшее дѣйствіе, но малой порей за то скорѣе отращаетъ и размножается, и потому можно имѣть онаго множественнѣе.

Еще припомнишь должно, что сего порею содержатъ въ садахъ большой родъ, которой у Ботаниковъ извѣстенъ подъ названіемъ сера *fissilis*, или сера *fecilis major*.

ВВ. *Испанской лукъ, порей, лукъ порей большой.*

Этотъ поръ въ садовыхъ книгахъ также извѣстенъ подъ именемъ Испаліанскаго или Французскаго порея. Въ нѣкоторыхъ же странахъ называютъ оной горшечнымъ лукомъ, потому что одною луковицею легко наполнишь можно поваренной горшокъ.

Есть сего луку лѣтній и зимовый родъ. Послѣдній выдерживаетъ зиму на открытомъ воздухѣ; а первый слабъ, вымерзаетъ, и луковицы онаго не столько крупны.

Оба рода сѣютъ въ одно время, а именно: въ Мартѣ въ парникахъ, а въ Апрѣлѣ на открытыхъ грядкахъ. Когда вырастетъ онъ шолщиною въ гусиное перо, пересаживаютъ его на жирную, больше влажную, нежели сухую землю, разстояніемъ вершка на 4 и на пять рядами по сурку. Но пересаживая должно траву и мочку у корня нѣсколько обрѣзать, а посадивъ полишь. Когда пойдетъ онъ въ ростъ, обсыпаютъ его землею и опалываютъ.

ваютъ. Чѣмъ чаще пригребаніе земли будетъ производимо, тѣмъ лучше оной выдесть.

Лѣтній порей обыкновеннѣе, и легко вымерзаетъ, почему должно оной въ глубокую осень выкапывать, и покладъ на грядѣ слоями, закрытъ и засыпанъ, или лучше хранишь въ выходахъ. Зимній порей не вымерзаетъ, и осматривается зимовать на своихъ мѣстахъ. Но чѣмъ имѣть оной для зимняго расхода, луковицы его равномерно предъ зимою выкапывая, кладутъ на грядѣ рядомъ, и накрываютъ соломой или инымъ чѣмъ, чѣмъ удобнѣе было брать, когда понадобится. Можно же содержать оныя и въ погребѣ, въ сырой песокъ впопнувъ тѣсно сжавши между собою луковицы.

Сѣмена сего луку не всякой годъ у насъ высѣваютъ; есѣли же и высѣваютъ когда, то очень поздно. Оныя не высыпаются, и для того сѣменные головки въ глубокую осень должно срѣзать, довольно засушивъ на солнцѣ, и тогда черныя его сѣмена выколопши или вытереть руками. Оныя лежатъ всхожи два года. Есѣли будешь недоспашокъ въ домашнихъ сѣменахъ, можно получить оныхъ за дешево изъ Италіи.

Порейныя луковицы растутъ въ длину, и бывають большею частью вершковъ на шесть длиною бѣлаго цвѣта; по самое это бѣлое мѣсто употребляютъ ихъ

множе-

множесвѣнно въ пакѣ называемые Французскіе говяжьи супы и другія кушанья. Не рѣдко на корнѣ ихъ завязывается булaviца, но она въ кушанье негодна.

Когда многіе употребленіе порею считали вреднымъ, то Жеофрой, дѣлая примѣчанія, не нашелъ иныхъ слѣдствій въ тѣхъ особахъ, кои много онаго ѣли, опричь надмѣнія. Порѣ посредствомъ своихъ оспрыхъ и лешучихъ солей разводишь клейкія и густыя мокроты, и въ особливости умножаетъ истеченіе урины. Утверждаютъ, что отваръ корней его разбиваетъ камень въ пузырь. Иппократъ похваляетъ порѣ въ болѣзняхъ женскаго полу, и когда оныя отъ сгустившихся соковъ производятъ, можно съ нимъ согласиться. Нѣкоторые употребляютъ порейной сиропъ отъ колющихъ и другихъ мокротныхъ припадковъ груди.

41) Чеснокъ.

Чесноку извѣстны многіе роды, изъ которыхъ замѣтимъ мы лишь тѣ, кои для повареннаго употребленія въ огородахъ водятся.

АА. Обікновенной чеснокъ, *Allium sativum*. L.

Землю подъ чеснокъ уваживаютъ нѣтъ нужды, но должна однако она имѣть нѣкоторую доброту, мягкость и влагу. Къ сажению голову чесночную раздѣляютъ, и каждой зубокъ осенью или весною сажаютъ на вершокъ глубиною и на 4 вершка разстояніемъ, подѣлавъ сперва ямочки по
снѣ-

снуру садиломъ. Вмѣсто зубковъ чесночныхъ можно собирать находящіеся между цвѣтшыхъ чесночныхъ подобныя луковкамъ булавички, и оныя таковымъ же образомъ сажать. Однакожъ онымъ пошребно два года времени, пока онѣ въ сволѣ пойдутъ; напрошивъ саженыя зубцы чесночные въ первой годъ оной опускающъ. Въ засуху чеснокъ должно тщательно поливать и выпалывать. Послѣ Иванова дни (24 Іюня) праву обыкновенно завивающъ, или заламывающъ, чтобъ головки разрастались. Въ землѣ морозъ чесноку не вредитъ, но въ оной легко. Выкапывающъ чеснокъ въ Августѣ въ сухое время, сплешающъ правую въ плешенку, привѣшивающъ въ сухомъ прохладномъ мѣстѣ, и такъ хранящъ для употребленія. Зимую отъ морозовъ должно оной закрывать.

Чеснокъ по своему летучему существу въ различныхъ болѣзняхъ полезенъ: ибо густыя мокроты разбиваетъ, засорившіеся сосудцы отверзаетъ, и способствуетъ опдѣленію и изведенію вредныхъ мокротъ, а особливо уриною и потомъ. Простолудимы счишающъ оной средствомъ отъ каменной болѣзни, что въ самомъ дѣлѣ справедливо, когда употребляютъ онаго чеснока недѣли сряду умѣренно. Можетъ быть для этой причины Жиды оной столько любящъ; ибо никакой народъ столько чесноку не употребляетъ. *Сиденгамъ,*
Май-

Майернѣ исцѣляли водяную болѣзнь однимъ чеснокомъ безъ помощи слабительныхъ средствъ; также и *опѣ* глистовъ иногда нѣмѣ лучшаго лѣкарства. Можно въ этомъ намѣреніи чеснокъ ѣсть сырой, варить въ молокѣ, и оное какъ пить, такъ и клиспиромъ впускать. Теплый паръ отвара чесночнаго предписывается *Г. Алпинѣ* къ возстановленію мѣсячнаго очищенія. Но какъ это средство очень разгорячаетъ, легко головную боль и другіе припадки приключать можеть, должно съ онымъ обходиться осторожно, а особливо въ горячихъ болѣзняхъ лучше употребленіе онаго ославить; ибо предразсудокъ, что чеснокомъ можно предохранить себя отъ заразительныхъ болѣзней, въ нынѣшнія времена не подтвердился; и еще *Димербрекъ* утверждалъ, что чеснокъ во время моровой язвы не только былъ полезенъ, но еще и вреденъ. Въ новомъ собраніи опборныхъ наблюденій (*neuen Samml. auserlesener Wahrnehmungen*, IX. В. 16 С.) чеснокъ похваляется вѣрнымъ средствомъ отъ курьихъ глазковъ или мозолей, бывающихъ на ногахъ. Зубокъ чесноку должно спечь на угляхъ или въ горячей золѣ, и горячій приложивъ къ мозоли, завязать тряпкою. Но чеснокъ должно держать, пока нога еще боса; если же будетъ спянуша обувью, даже чулкомъ, нога легко можеть воспалиться и приключить лихорадку, что случаетсяся

Часть IV. Отдѣл. 2. Т. и

и отъ прикладыванія сыраго чесноку. Печеной же чеснокъ и на босой ногѣ не производитъ никакихъ худыхъ слѣдствій. Хорошо, чѣмбъ это бѣдное лѣкарство перемѣняшь въ сутки раза два и три свѣжимъ. Обыкновенно исцѣляешь оное въ два и три дни; потомъ должно ногу поставивъ въ теплую воду, чѣмбъ роговая кожа ошшла, и послѣ сего мозоли болѣе не останутся.

Въ скотскихъ лѣкарствахъ чеснокъ также имѣетъ свое мѣсто. Даютъ оной лошадямъ, когда онѣ неохотно бѣгутъ и мышишься хотятъ. Даютъ же оной и рогатому скоту предъ шѣмъ, какъ весною въ первой разъ въ поле выгоняютъ. Отъ сего оной главнѣйше ободряется, не боится робокъ, и обороняется отъ нападающихъ. Въ шѣхъ спранахъ, гдѣ еще употребительно конское рысшаніе на свадьбахъ, нѣкоторыя конюха пользуются таинствомъ кормить лошадей своихъ въ день, назначенный къ рысшанію, изобильно чеснокомъ. Отъ сего происходитъ, что лошади, не кормленыя чеснокомъ, скоро утомляются и ошшютъ. Сказываютъ, что то же оказывается и въ челоуѣкахъ, вмѣстѣ путешествующихъ: бѣшіе чеснокъ утомляютъ не бѣвшихъ онаго и идущихъ съ ними. Курамъ, имѣющимъ такъ называемой сипъ, должно напирать языкъ чеснокомъ. Сокъ чесночной похвально въ мѣсто кишку къ склейкѣ спе-

кла

кла и фарфору. Смощри *Новой Бременской Магазины*, Томъ 7, стр. 617. Должно располочъ чеснокъ въ каменной иготи, и сокомъ изъ того помазавъ шовъ посуды, кою клеишь хочешь, сосшавишь. Кишть эшотъ держишь крѣпко, и почти не осипавляетъ признаку, гдѣ было разбило.

Въ поварняхъ особъ средняго сосшодня чеснокъ упошребляется къ шпикованію жареной баранины, отъ чего она опмѣнно доброй вкусъ получаетъ. Кладушь же его и въ нѣкоторыя соусы. Здѣсь мѣсно замѣшишь, чшо крошащіе въ поварняхъ лукъ, чеснокъ и порей должны очень ошерегаться, чшобъ не порѣзаться шѣмъ ножемъ, на кошоромъ есть еще свѣжій сокъ, потому чшо произойдетъ отъ сего опасная рана, кою шрудно залечишь.

ББ. *Рокамболь, эшвистой чеснокъ.*

Эшотъ родъ чесноку къ предшешему совершенно сходенъ, также разводъ и приосмотрѣ за нимъ въ огородѣ одинаковъ. Корни его упошребляютъ въ поварняхъ знатныхъ особъ, пошому чшо вкусъ и запахъ его умѣреннѣе обыкновеннаго чеснока, и для того отъ многихъ предпошитаешся.

42) Капуста.

Капустный родъ содержитъ въ себѣ многія ошродія, изъ кошорыхъ мы шѣшолько замѣшимъ, кои водяшь въ огородахъ для повареннаго упошребленія.

АА. Кочанная капуста, бѣлая капуста.

Не всякая пошва земли равно хороша къ произведенію этой капусты. Черная, шучная, влажная и мягкая земля къ сему способнѣе. У насъ водяшъ капусты очень много въ огородахъ и въ полѣ, какъ для челоуѣковъ, такъ и скошовъ. Въ кормленіи скошовъ капуста на равнѣ считается съ лучшими родами дяшловины.

Поелику въ разсужденіи всѣхъ поваренныхъ растѣній нужно спарашься имѣшь хорошія сѣмена, тѣмъ больше необходимо это въ разсужденіи капусты; пошому что онѣ худыхъ сѣменъ выходитъ худая разсада, а изъ худой разсады шолько негодные кочни.

О лукъ сказано выше, что у насъ сѣюшъ онаго больше всѣхъ мѣстъ въ провинціи нашей. Самая же крупная и во множествѣ кочанная капуста водится по близоспи насъ въ Саксонской деревнѣ Линшовѣ; пошому что на флемингѣ нѣшъ земли къ шому удобной, и едно помянутое мѣсто снабжаетъ капустою весь флемингъ и Маркскую спорону. Поелику здѣшнее вожденіе луку вкрашцѣ описано, намѣренъ я описать и образъ Линшовскаго капустнаго земледѣлія, пошому что оно онѣ обыкновенія другихъ мѣстъ въ нѣкопорыхъ часіяхъ опличесшвуетъ.

Подобно какъ здѣсь землю, подѣ лукомъ бывшую, не перемѣняюшъ, шожъ произходитъ и съ капустною землею въ Линшовѣ.

шовѣ. За цѣлой вѣкѣ ежегодно сажаютъ оную на одномъ мѣстѣ. Пошва земли съ здѣшнею, подѣ лукъ употребляемою, какъ оная описана выше, совершенно сходна. Оба сосѣдственные сіи селенія какъ бы изстари стоворились, чинѣ одно упражнялось въ луководствѣ, а другое садило бы капусту; ибо въ обоихъ мѣстахъ, какъ сказано, пошва земли одинакова, и впрочемъ оба растѣнія сіи равно бы могли родиться.

Унавоживаніе капустной земли въ Линшовѣ также ежегодно производится. А какъ крестьяне тамошніе множеству водятъ капусты, и за другими работами въ другое время не имѣющъ свободы; то февраль мѣсяцъ находящъ способнѣйшимъ къ возкѣ навозу на капустники, а особливо когда санной путь хорошъ. Нѣкоторые осматриваютъ оной нѣсколько полежавъ въ кучахъ, но другіе усматривая окончаніе зимы, разравниваютъ навозъ очень толстымъ слоемъ, послѣ чего и первые вскорѣ помужъ слѣдующъ, а иѣмъ производятъ что земля, полежавши подѣ распротраненнымъ навозомъ, учиняется несравненно мягче, нежели та, на которой лежалъ оной въ кучахъ до самаго перваго вскопанія, которое происходитъ въ половинѣ Апрѣля, ранѣе или поздѣе, какъ Хозяину удастся время къ тому избрать. Называютъ тамъ это первое вскапываніе взметѣ. Симъ взметомъ какъ

навозъ, такъ и всѣ сорныя травы, на поверхность земли бывшія, лежаща въ глубину. Въ половинѣ Мая мѣсяца эпошъ возьмѣ перекапываютъ вторично къ посадкѣ капустной разсады. Называется эшо у нихъ копаніемъ подъ разсаду. Если снѣгъ поздно сойдетъ, опкладываютъ эшо второе копаніе до начала Іюня, но не позднѣе; ибо ростъ молодыхъ высадковъ зависитъ единственно отъ теплой погоды, и сѣи капустные промышленники между другими своими поступаніями полагаютъ основаніемъ къ полученію большихъ вилокъ или кочней шо, чшобъ опшодъ слабой разсады не сажашъ, и для шо по состоянію погоды выжидаютъ, пока разсада придетъ въ надлежащую силу. Разсаду же свою сѣютъ въ Маршъ на опкрышомъ воздухѣ, какъ скоро морозы позволяющъ заснутъ въ землю запусиптъ. Сѣютъ же оную и въ разное время, дабы въ случаѣ, когда первый сѣвъ отъ морозу или инаго чего будетъ поврежденъ, послѣдніе сѣвы могли уронъ эшошъ наградить. Но обыкновенно первый сѣвъ бываетъ лучшій, хотябъ и всѣ равно удались.

При посѣвѣ разсады, которой всегда на изобильно и вновь унавоженной свѣжей грядѣ производипся, всегдашняя привычка Хозяекъ (ибо ихъ шо дѣло) научила, сѣмена бросашъ всегда равною мѣрою, чшобъ оныя ни гуще, ни рѣже легли. Поелику,
какъ

какъ выше сказано, у нихъ за главное правило поспавляется высаживать разсаду здоровую и укрѣпившуюся, то сѣявъ рѣже, лучше достигаютъ сего намѣренія. Гуспо посѣянная разсада бываетъ очень тонкобыла, и расшетъ больше вверхъ, а не въ толщину, да и листъ получаетъ дробной. Напротивъ рѣдко сидящая разсада бываетъ толстобыла, и листы имѣетъ толстые и крупные, что вообще лучшую надежду къ доброму урожаю капусты тѣмъ промышленникамъ подаютъ.

Къ высаживанію разсады сухая погода для нихъ пріятнѣе влажной, и они считаютъ оную за предвѣщаніе урожая самыхъ большихъ кочней, когда земля такъ суха, что высаженная разсада въ первые дни повалился, и листы ея совсѣмъ завянутъ. Если дождя и не случится, они не опасаются, чтобъ капуста ихъ не оправилась и не принялась; ибо въ глубинѣ земли содержится еще влажность, и изобильныя ночныя росы, изъ находящихся въ окрестности рудниковъ, луговъ и болотъ собирающіяся, упадаютъ тѣмъ дѣяшельнѣе на молодую капусту. Когда же наконецъ необходимая нужда потребуетъ разсаду нѣсколько разъ полить, имѣютъ они по близости воду въ колодезяхъ и ручайкахъ, или близъ капустниковъ копаютъ ямы, въ копорыхъ вода вскорѣ набирается, и достаточно къ полишю сполько пространныхъ капустниковъ,

ковъ, что почти глазомъ не окинешь. Что же у нихъ съ опытовъ ожидающъ лучшаго на капусту урожая, когда засуха господствуетъ во время высаживанія разсады, кажется мнѣ, что между прочимъ имѣетъ се въ томъ причину, что тамошняя очень справянистая земля отъ сухмени осмаетъ чище, и сорныя травы на оной очень поздно и слабы выходящъ; а къ тому присовокупляется, что солнцемъ черную землю лучше пропекаетъ, и сырую влагу къ пишанію растѣній какъ бы умягчаетъ и въ способность приводитъ. Замѣнилъ же я, что тамошняя капуста въ сухіе годы лучшей вкусъ имѣетъ, нежели въ мокрые, дождливые и холодовашые. Еслии Августъ въ особливости не будетъ означеннаго содержания, капустѣ будетъ не доставать того пріятнаго вкуса, и кочни выдутъ несравненно меньше.

Еще есть главная причина, отъ чего капуста вырастаетъ въ большіе кочни: надлежащее пространство между разсады въ посадкѣ. Капустные промышленники въ Лингофѣ слѣдуютъ въ этомъ одному своему глазомѣру, и вопрошающимъ, какъ пропорно капусту высаживать должно? отвѣчаютъ: между каждымъ высадкомъ разсаднымъ должно быть столько пространства, чтобъ ягненокъ, весной оягнвшея, свободно шакъ улегся, чтобъ ни до листа, ни до стебля не коснулся. А
въ

въ эшомъ и состоишъ главная погрѣшность во многихъ мѣстахъ, въ копорыхъ капусту сажаютъ хотя на пучной землѣ, но кочни выходяшъ у ней такъ малы и плохи, что въ четырехъ, иногда въ 8, не больше бываетъ вѣсомъ противу одного Линшовскаго; для того что пучъ корень отъ корня сажаютъ вершковъ на 14 и на аршинъ съ четвертью, а въ шѣхъ мѣстахъ едва вершковъ на шесть или на семь. Таковой опмѣнной величины Линшовскіе кочни обыкновенно сопровождаются полновѣсемъ; ибо они внутри бываютъ плохны и пуги, а тамъ, гдѣ разсаду шѣсно высаживаютъ, кочаны внутри всегда рухлы и пусы.

Прочее ходеніе за капустою въ Линшовѣ, въ разсужденіи пригребанія земли къ корнямъ, обламываніи листовъ и прочаго, одинаково съ употребляемымъ въ другихъ мѣстахъ, и около половины Октябрю начинаютъ оную срубать. Ссѣкаютъ ежедневно мѣспечко полосою вдоль, и кочни складываютъ на капустникъ по 60 въ четвероугольную кучу. Въ показанное время видимы тамъ сопни шѣлегъ ежедневно, крещьянъ Флемингскихъ, прѣзжающихъ покупать капусту. Въ цѣнѣ у нихъ давно уже условлено, что за 60 кочней платишь столькожъ, почему состоишъ торговая цѣна полосминъ ржи; почему покупщики съ продавцами и не торгуются. А какъ Линшовцы не имѣ-

ютъ пашень, удобныхъ къ сѣву ржи, по промѣнивають часъ своей капусты на рожь, ячень, горохъ и гречиху, что для Флемингцовъ еще и выгоднѣе.

Теперь возвращаюсь я къ описанію различныхъ въ другихъ мѣстахъ упопрѣбительныхъ капустоводствъ.

Нѣкоторые огородники копаютъ свои капустники, естли земля отъ напуры тверда и связна, еще подъ зиму глубоко, и прикрываютъ конскимъ навозомъ, чтобъ влажностъ отъ дождей и снѣгу мало по малу во вскопанную землю вбиралась, и оную умягчала. Когда же весною навозъ будетъ снятъ, или вкопанъ, земля найдется въ состояніи принести добрую капусту.

Не есть также не обыкновенное, сѣять разсаду въ парникахъ, и высаживать на гряды, сѣ осени прѣутоповленные, чтобы очень рано имѣть капусту.

Г. Хагедорнъ къ воспитанію капусты всякаго рода предписываетъ поступать слѣдующимъ образомъ: у кого нѣтъ парниковъ, можетъ тотъ сѣять, какъ скоро теплые дни землю откроютъ, на мѣстѣ открытомъ и освѣщаемомъ солнцемъ добрыя капустныя сѣмена всякаго рода, какъ бѣлаго, такъ и краснаго; и какъ скоро разсада получитъ 4 или 5 листовъ, высадить на добрую жирную землю, и при томъ бѣлую кочанную капусту на 14 вершковъ, простую сѣрую на 10 вершковъ,

а красную шолько на 3 вершка между собою разспоянѣмъ; пришомъ тщаельно опѣ шравъ опалывашъ, и бѣлую капусту два раза обкопашъ и землю къ корню пригресшъ. Таковымъ образомъ не рѣдко можно получить лучшую капусту, нежели высаживая разсаду, въ парникахъ выращенную. При семъ должно еще напомнишь, что сѣмена, высѣваемые прошиву полденъ на довольно освѣщаемомъ солнцемъ мѣстѣ, хотя производяшъ раннюю разсаду, коя выгоднѣе къ разсаживанію, но на шаковомъ мѣстѣ больше бываетъ подвержена нападенію земляныхъ блохъ. Солице укрѣпляешъ и поддерживаешъ оную; почему совѣтую сѣмена бѣлой и красной капусты сѣять не въ одномъ мѣстѣ, но порознь, опчаспи на влажной, часшю на сухой, часшю на освѣщаемой солнцемъ, и часшю на тѣнистой землѣ: шаковымъ образомъ можно имѣть выгоду, что когда разсада не удастся на одномъ мѣстѣ, будетъ хороша на другомъ, и земляныя блохи не всюду оную сыщутъ и повредяшъ. Хотя есшъ средство прогоняшъ земляныхъ блохъ, посыпая печною сажею, прыская соленою водою, а особливо усыпая гряду кожевенною скорью; но чрезъ это не однѣ земляныя блохи, а и самыя растѣнія ослабляются. (Сего въ точности утверждать не лзя, чтобъ посыпаніемъ полезныхъ прошиву земляныхъ блохъ средствъ растѣнія можно было ослабить. Оныя прежде того

еще

еще ослабляются онѣ обвѣданія блохами, такъ что порядочно оправишься не можешь: ибо таковыя способы обыкновенно употребляютъ поздно, и тогда, какъ блохи работу свою оканчиваютъ.) Тому должно поранѣе вспахать, кто хочетъ онѣ разсады, единожды онѣ блохъ земляныхъ нападенной, получить добрую капусту. Ближайшій и вѣрнѣйшій путь къ прогнанію сихъ блохъ шовъ, чшобъ, когда онѣ одолѣютъ, землю вскопать, оглоданную разсаду общесъ блохами зарыть, и гряду употребить на что нибудь иное. —

Пропускаются здѣсь очень многія въ Экономическихъ сочиненіяхъ показываемыя средства противу земляныхъ блохъ, и упоминается только, что ранній сѣвъ лучше онымъ сопротивляется, потому что блохъ во время всходу разсады еще не бываетъ; а тогда, какъ солнечная теплота земляныхъ блохъ оживитъ, разсада уже опвердетъ, и не можетъ служить онымъ приманчивою пищею. На сей конецъ многіе подъ разсаду прѣупоковляютъ навозную гряду еще съ осени, хорошо унавозивъ и глубоко вскопавъ, чшобъ въ Мартѣ сѣмена можно было посѣять и только загрести граблями. Нѣкоторыя огородники подмѣшиваютъ въ разсаду редисныхъ сѣменъ, чшобъ земляныя блохи держались только однихъ нѣжныхъ листовъ редисныхъ, а разсаду бы не шогали. Когда избрана будетъ подъ разсаду больше влажная

и низменная, нежели возвышенно лежащая сухая гряда, земляныя блохи на такуюю не нападаютъ или очень мало. Для сего сухія гряды должно овлажняшь прилѣжнымъ поливаніемъ.

Капустная разсада имѣетъ еще врага въ дождевыхъ червяхъ, которыхъ нѣкоторые занимають шѣмъ, что конскіе шевяки, или дробной отъ соломы очищенной навозъ лошадиной, насухо высушиваютъ, мѣлко толкутъ, и по грядѣ разсыпають, чтобы дождевые черви оной въ норы свои таскашь принялись. Другіе, къ воспрепятствованію симъ червямъ впаскивають молодую разсаду въ свои норы, и къ истребленію оныхъ изъ гряды, предписываютъ опрыскивать гряду отваромъ изъ липовъ и шелухи орѣховаго грецкаго дерева: отъ сего черви изъ норъ своихъ выползають, и можно оныхъ собрать. Можно къ сему запасать шелуху и листья орѣховъ грецкихъ.

Въ разсужденіи времени сѣву капустныхъ сѣменъ примѣчается различіе. Огородники въ возрѣніи на величину кочней капустныхъ дѣлають широкое раздѣленіе: полагають большой, средній и малый разборъ. Въ первой разборъ надлежитъ *большая Брауншвейгская*, которая на аршинъ съ четвертью разстояніемъ разсаживается. *Эрфуртская* кочанная копуста нѣсколько меньше, но приноситъ тугіе кочни, и сажается на аршинъ разстояніемъ. Потомъ
слѣ-

слѣдуетъ *малый родъ* кочанной капусты, кошорая не больше 14 вершковъ пространства въ разсадкѣ пребудетъ. Сѣмена обоихъ первыхъ родовъ выставляются въ Мартѣ. Съ сѣменами же малаго рода можно ожидать первыхъ чиселъ Мая, попомучпо вилокъ малой капусты скорѣе достигаетъ совершенства. Кто желаетъ имѣть рано кочни капустные въ пищу, можетъ сѣмена капусты малаго рода или капорки ранѣ сѣять, и разсаду высаживать въ первыхъ числахъ Іюня.

Когда сѣмена большаго рода капусты выставлятъ весною поздно, на примѣръ въ половинѣ Мая мѣсяца, происходящая отъ того разсада не можетъ по пересадкѣ достигнуть надлежащаго совершенства; она на одной кочарыгѣ выводитъ по 4, по 5 и больше малыхъ вилокъ, кои называютъ пупушками. Также отъ худыхъ сѣменъ, хотя бы оныя и въ надлежащую пору посѣяны были, выходятъ иногда шаковыя же растѣнія. Въ нѣкошорыхъ мѣстахъ нарочно шаковую не вилю капусту сажаютъ для крошева. Малые кочни изъ нее вырѣзываютъ, разрѣзываютъ на нѣсколько штукъ и квасятъ по обыкновенію, шакъ какъ обыкновенную крошеную капусту, послѣ сваривъ на столѣ подаютъ.

Въ разсужденіи наружнаго вида раздѣляютъ кочанную капусту на различные роды, какъ-то малую *Рускую кочанную*
ка-

капусту, сахарною головою кочанную капусту, плоскобокую кочанную капусту и другіе нѣкоторыя. Въ мочливые годы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ больше держится оспрокочанной или сахарною головою капусты, нежели плоской; попому что на оной вода застаивается и въ гниль приводитъ. Есть также капуста съ круглыми кочнями, или у которой кочни къ верху больше окаписшы, нежели плоски, на коихъ вода не задерживается, и по сему она въ мочливые годы равномѣрно уважается, какъ и оспроверхіе кочни имѣющая.

Еще различаютъ кочанную капусту по ея цвѣту, для того что кромѣ бѣлаго, которой обыкновеннѣйшій, есть цвѣта краснаго и синяго, а при томъ иногда шемнѣе, иногда свѣтлѣе и блѣднѣе. Кто любитъ капусту того или иного цвѣта, долженъ сѣменные высадки садить не сплошь, или однѣ близъ другихъ, попому что цвѣты разныхъ родовъ взаимно себя оплодоносятъ. Темныхъ цвѣтовъ капусты другимъ предпочитаютъ, для того что подаются на столъ въ сыромъ капустномъ салатѣ, а особливо съ ломтями бѣлой селлерей, рапунцелемъ и иными салатными травами, гдѣ бывають красивѣе блѣдноцвѣтныхъ. Для украшенія же сего, подмѣшиваютъ повары иногда въ красную капусту бѣлой.

Выса-

Высаживая капустную разсаду, не худо производить это рядами. Таковымъ образѣ можно не токмо желаемое разстояніе между растѣніями соблюсти, но и лучше осмошрѣться, гдѣ растѣніе вытало, чшобѣ посадить на то мѣсто новое. Сверхъ того рядами сидящую капусту не токмо лучше обкапывать, шакѣ чшо къ каждому ряду можно землю пригрести валикомъ, но и обламываніе листовъ производить порядочнѣе и рядомъ. Еслили капуста сидитъ сбродомъ, то обламывающая дѣвка не можетъ всѣхъ кусковъ осмошрѣть, и мѣсечками ломая, нѣкоторые кусы оспавитъ, а опъ того листы, кои обломать слѣдуетъ, пожелкнутъ и завянутъ. Когда капуста сидитъ не рядами, то при обламываніи можно нѣкоторые кусы спопшать и наклонить на бокъ, или много нужныхъ листовъ заломать. Это составляетъ погрѣшность и въ Линшовѣ, гдѣ высаживаютъ капусту, шолько разстояніе, а не ряды наблюдая.

Къ произведенію шаковыхъ рядовъ можно употреблять орудіе, употребляемое при шабаководствѣ, и писарь называемое. Это большія грабли, у копорыхъ съ краевъ шолько по одному зубу, на аршинѣ съ четвертью разстоянія между собою имѣющихъ. Таковымъ писаремъ поперегъ гряды прошагиваютъ прямые черны, и по онымъ сажаютъ шабачные высадки рядами. Но могутъ зубья у сего писаря и меньше арши-

аршина съ четвертью имѣшь разстоянїя, въ разсужденїи рода капусты, крупнокочанную или малую высаживать.

Г. фонъ *Экхартъ* о сажденїи капусты въ полѣ по вспаханной пашнѣ слѣдующее предлагаетъ насъ павленїе: сѣмена кочанной капусты сѣютъ въ великой посѣ, когда кончашся уже большїе ночные морозы, въ огородѣ на узкой, доброй, рыхлой и подѣ зиму вскопанной и съ дробнымъ навозомъ перемѣшанной грядкѣ, шакъ густо, какъ лакшукъ салатъ; а есѣли теплая погода господствуетъ, и землянымъ блохамъ появившся должно, ежедневно нѣсколько разъ опрыскивать, пока разсада получишь четыре листа, и когда земляныя блохи оныхъ уже не вредятъ. Очень нѣсно разсадѣ сидѣть не должно, чѣобы она не вытянулась и не сдѣлалась тонкобыла, но была бы коренясна. Когда между Пасхою и Троицынымъ днемъ доброе мѣсто въ паровомъ клинѣ надлежащимъ образомъ унавозить и нѣсколько поглубже вспахать: тогда разсада, которой кромѣ корня должно быть въ 3 или 4 вершка длиною, выдерживается, и разчернивъ гряду поперегъ *писаремъ*, которой долженъ проводить черны на 14 вершковъ разстоянїемъ, сажать по онымъ разсаду на семь вершковъ между собою, нѣсколько глубже, нежели сидѣла она въ огородѣ, и тотчасъ между нѣмъ приготовленною водою каждой высадокъ поливъ, чѣобѣ земля тогдажъ

Часть IV. Ондѣл. 2. У ко.

корень облѣпила. Три дни спустивъ должно нѣсколькимъ людямъ, запасшись разсадою въ лукошкахъ, ходишь по капустнику, и смошрѣшь, гдѣ разсада выпала, на тѣ мѣста садить вновь, чѣмъ пустыхъ мѣстъ не оспавалось. Когда по прошествіи мѣсяца разсада опрастетъ въ пядень, обкапываютъ оную подобно какъ табакъ, и землю пригребаютъ къ кочарыгѣ по самыя лисы. Спустивъ еще мѣсяцъ, нижніе лисы, кои разрастутся велики и широки, такъ чѣмъ между рядами, только 14 вершковъ пространства имѣющими, ходишь будешь не можно, посылаемыя дѣвочки мало по малу обламываютъ, относятъ домой въ кормъ коровамъ, и продолжаютъ это до исходу Октября, или пока снѣгъ не напалъ. (Первымъ обламываніемъ листовъ не должно спѣшить, ибо нижніе лисы по тѣхъ поръ споспѣшествуютъ росу капусты, пока еще совсѣмъ зелены. Какъ же скоро нижніе лисы зелень свою переменятъ, и по краямъ начнутъ нѣсколько желтѣть, составляетъ это знакъ, чѣмъ время ихъ обламывать).

Находится много другихъ различныхъ предписаній къ сажению капусты, изъ которыхъ я только тѣ внесу сюда, кои въ особенности противны обыкновенному очень погрѣшному высаживанію разсады. Слѣдующее Г. Хагедорна, которой въ своемъ *Landschaftlichen Haus-Halter*, къ наблюденію слѣдующихъ производствъ побуждаетъ.

Не

Не должно брать для высаживанія ни одного разсаднаго распѣнїя бѣлой капуста, вирзингу или кудряваго сафою, и цвѣтной капусты, у котораго нѣтъ добраго спержня или сердечнаго ростка. Когда въ срединѣ между листовъ шаковаго спержня нѣтъ ростка, то распѣнїе никогда не можетъ свѣстись въ кочанѣ. Предъ пересадкою должно въ ведро или нѣмцы положить овечьяго и куринаго навозу, также не много жирной земли, подлишь навозной воды, и все это разболтать, чтобъ было густо. Въ этомъ растворѣ посадишь разсаду рядами на нѣсколько часовъ, и хотя нѣсколько смѣси этой прильнешь къ корнямъ, тѣмъ полезнѣе. Высадку должно производить послѣ дождя, или сморѣть выборомъ такую погоду, чтобъ послѣ скоро дождь послѣдовалъ: чрезъ это замѣнишь поливаніе, и разсада не такъ засыхаетъ. Сажать же разсаду должно по снурку, и глубиною столько, чтобъ спержень распѣнїя спалъ на равнѣ съ землею. Къ корню распѣнїя землю должно плотно пригнестъ, чтобъ внизу не осталось пустошы, и корни бы тѣмъ лучше съ землею соединились. При пересадкѣ же вообще должно наблюдать, чтобъ корешковъ не загнуть, и таковымъ загибомъ въ землю не вдавить, но корни и мочку порядочно распространить, и прямо въ землю опустить. Хозяева и огородники сажаютъ не сами, но употребляютъ къ тому женщинъ, кои

У а раз-

разсаду тыкають въ землю на удачу, а тѣмъ Хозяина лишаютъ многихъ возовъ капусты, и капустникъ обезображиваютъ. —

Эпо предписаніе Г. Хагедорна въ сужденіи посадки капусты заслуживаетъ всевозможное одобреніе, для того что урожай капусты отъ того зависитъ. Почти всемѣстно съ саженіемъ такъ поступаютъ, что выкапываютъ садильную лопашкою ямку, и бока оной такъ плотно угнѣтають, что вдавливаемые корни отчасти остаются безполезны, или въ спороны провертываютъ скважину, чтобъ пріискашь себѣ питаніе, отъ чего необходимо кочнямъ должно выходить дробнѣе. Если земля въ капустникѣ, какъ и быть должно, очень мягка и рыхла, то будетъ она больше рыхла предъ дождемъ, нежели послѣ онаго; почему женщины сажаящія должны землю вынимать руками въ глубину и спороны столько обширно, чтобъ корень растѣнія свободно распространился, и ямка вынутаю рыхлою землею опять засыпана была, при чемъ лучше поливать, нежели землю удавливать. Нужно лишь испытать оба рода саженія, обыкновенной и теперь только описанной, на одномъ капустникѣ, и примѣчать слѣдствія. По сему способу капуста будетъ расти бодро, нѣсколькими недѣлями ранѣе поспѣетъ, и наконецъ получитъ крупнѣйшіе кочни предъ посаженною обыкновеннымъ образомъ. Пра-

Не есть необыкновенное, что въ разныхъ мѣстахъ къ пересадкѣ разсады во время продолжительной засухи дѣлають шакъ называемую ногу, и съ оною пересаживають. Къ сему берутъ вышеписанной Хагедорновъ растворъ, но больше земли, нежели овечьяго, куриного или голубинаго навозу, и разводяшъ шакъ густо, чтобъ оной былъ связанъ, а не распекался. Берутъ этой гущи комокъ, въ которой каждую разсаду сажашъ, и оною же закрываютъ; кладутъ разсаду на доски и ночью старыя, и облѣпивъ помянутою

У 3

но-

ногою корни, сажаютъ, а сверху засыпаютъ обыкновенною землею. Тѣмъ замѣняется поливаніе, и высадки разсадныя безъ дождя отъ жирныхъ и влажныхъ своихъ такъ называемыхъ ногъ принимаются, а особливо когда къ саженію избрано будетъ вечернее время, чѣмъ растѣнія отъ слѣдующей за тѣмъ непосредственно росы подкрѣпленіе получили.

Другіе еще просѣе достигаютъ въ дѣланіи подъ разсаду ноги, или такъ сказавъ основанія, а именно: они поливаютъ гряду, изъ которой вынимаютъ разсаду къ пересадкѣ, мало по малу такъ много, что молодыя растѣнія со всею землею около корней своихъ выдергиваются. Тогда кладутъ ихъ рядами на ночвахъ, относятъ въ капустникъ, и сажаютъ корни съ ихъ собственною землею. Чѣмъ лучше будетъ земля, на которой сѣяна разсада, тѣмъ лучше удадутся вынуженныя и посаженныя съ нею растѣнія. Но прежде написанія поливкою гряды къ сему намѣренію осматривается она, и густо сидящія растѣнія продергиваются, чѣмъ прочимъ осталось столько простору, сколько потребно онаго къ полученію довольной ноги, т. е. чѣмъ около cadaго корня довольно вынулось земли.

Не всюду по *Экхартову* предписанію можно удовлетворить капустѣ однимъ обкапываніемъ. Въ нашихъ мѣстахъ должны мы производить оное двоекратно въ раз-

разное время: въ первой разѣ вскапы-
ваемъ мы поверхность земли съ шѣмъ
только, чѣмъ разрушить скоро отраща-
ющія сорныя травы, такъ и для того,
чѣмъ землю провѣшрить. Не лѣзя къ
сему отъ времени высадки разсады назна-
чить непремѣнную пору; должно распола-
гаться это по обстоятельству погоды
и произходящему отъ того росту травъ.
Съ слѣдующимъ потомъ чрезъ нѣсколько
недѣль обкапываніемъ капустны равное об-
стоятельство. Но для перваго и втора-
го обкапыванія потребна сухая погода.

Выше упомянуто, что высаживаніе
капусты рядами къ тому служишь дол-
жно, чѣмъ обламываніе листовъ съ оной
могло производить порядкомъ. Въ здѣ-
шнихъ мѣстахъ начинается это въ Авгу-
стѣ, и продолжается до Ноября, какъ-то
и во многихъ другихъ мѣстахъ дѣлають,
доставляя шѣмъ самый лучшій кормъ ко-
ровамъ. Это въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
соспавляетъ такую важность, что со-
бирають въ оныхъ тогда капустное ко-
ровье масло такой же доброты, какъ
Майское, такъ называемое травяное, ко-
торое вкусомъ и доброшою маслу бито-
му въ другихъ мѣсяцахъ предпочищается.
И какъ Майскаго сбора масло въ здѣшнихъ
домахъ ровно годъ бываетъ прочно, такъ
равно и капустное, гдѣ много онаго соби-
рають.

Обломанные листы капустные крошатъ мѣлко сѣчками, и смѣшавъ съ рѣзкою, дающъ коровамъ: таковой кормъ наравнѣ счищается съ дятловиною, когда только въ нѣкоторомъ намѣреніи не предпочтительнѣе оной.

Очень легко можно счетъ сдѣлать, когда капуста сидитъ рядами, сколько потребно листовъ къ прокормленію коровы въ день. По сему распоряжается и все кормленіе, и когда капустины не доспанеи, то какъ и какого подсобнаго корму къ тому прибавитъ.

При великомъ запасѣ хлѣбномъ всѣхъ листовъ капустныхъ, остающихся послѣ продажи кочней, рубленіи оной къ квашенію и при срубаніи, осенью издержавъ въ кормъ не можно; потому что вмѣстѣ оныхъ остающіяся кочарыги или по проспоренію хряпки, кои долго лежатъ не могутъ, не затвердѣвъ какъ дерево, почему и учиняющіяся въ кормъ не способны. Почему совѣтую излишнихъ листовъ заквашиваніе, такъ какъ готовящъ кислую капусту или крошево, а именно: капустные листы, а кому угодно и кочарыги крошатся крупно, и по довольномъ пересыпаніи солью, опчасши шминомъ, въ большихъ кадкахъ для корму скопийъ заквашиваются, и сѣи ставятся въ выходъ или въ теплые скопскіе покои, куда морозъ проходить не можеть. Берутъ же къ сему остатки шѣхъ кочней, кои по
обы-

обыкновенію для повареннаго расходу осклабляются. Сіи осипашки называются въ Нѣмецкой землѣ шлюпкенѣ, каковымъ именемъ зовущъ и шѣ расшѣнія капустныя, кои въ кочень не свиваются, или не вилятся. Нѣкоторые наливаютъ водою шакковыя капустныя очиски, въ кормѣ скошинѣ приготавлиаемыя, но это не нужно, потому что капуста сама столько дастъ соку, что по наложеніи на крошиво деревяннаго кружка съ гнемомъ, сокъ вскорѣ выступаетъ на поверхность, и всю капусту покрываетъ.

Эта шотландская кислая капуста, естьли соли не пожалѣть, сиюшѣ не испортившись даже въ Апрѣль мѣсяцѣ, и не худо кормленіемъ ее распоряжатъ такъ, чтобъ давать оную и тогда скошинѣ, какъ начнетъ она вытускаема быть на пашву. Составляетъ она предохранительное средство отъ разныхъ припадковъ, кои въ это время во многихъ мѣстахъ съ рогавою скопиною вспрѣчаются. Равномѣрно хорошо, когда осенью скопина вступаетъ съ травы на сухой кормъ, давать часнѣ таковой кислой капусты коровамъ; для того что шотландской падежъ, когда бываетъ въ странѣ, оказывается большею частію въ рогавой скопинѣ тогда, какъ станетъ она въ стойла. Всякой кислой кормъ и напшоукъ, по многократнымъ опытамъ, оказываетъ отмѣнную услугу прошиву заразѣ скошу, и тогда, какъ оной заразишся.

ся. Даютъ же кислую капусту смѣшавъ съ одною соломенною рѣзкою, когда инаго корму жалѣють, и коровы смѣсь сѣю бдятъ охотно. Если же съ соломою рѣзатъ сѣно, то кормъ будетъ тѣмъ питательнѣе.

Нѣкопорымъ Хозяйствамъ больше, нежели въ одномъ намѣреніи, есть нужда, чтобы коровы, если не всѣ, то большею частью, въ одно и надлежащее время тѣлились, а особливо когда намѣреніе опносятся къ тому, чтобы тѣлята родились въ такое время, когда ихъ по состоянію мѣста удобнѣе вскормить. Около того времени, когда надобно, чтобы коровы ломались, должно начать кормить оныхъ кислую капустою, и можно бытъ увѣрену, что изъ коровъ, состоящихъ на этомъ кормѣ, одна по одной скорѣ быка пожелаютъ. У меня это средство изъ давняго времени всегда желаемое дѣйствіе оказываетъ.

Еще въ нѣкопорыхъ домахъ есть обыкновеніе лѣтомъ обламываемые капустные листья сушить, и хранить оные въ зимній кормъ. Потребенъ къ сему прохладной сарай съ поломъ, на которомъ листья кладутъ тонкимъ слоемъ, и ежедневно, а особливо сначала, переворачиваются, чтобы мало по малу вяли и засыхали. Много потребно къ сему времени, пока капустные листья столько засохнутъ, чтобы безопасно было положить ихъ въ ку-

кучу; ибо они легко плѣсневѣютъ или загниваютъ. Можно это дѣлать только при маломъ скопководствѣ, когда для онаго сѣна недоспапочно. Кромѣ запрудненія въ сушеніи, и въ возможности при большомъ скопководствѣ будетъ недоспашокъ; почему лучше въ послѣднемъ случаѣ зелеными листьями кормить лѣшомъ, а подъ исходъ ихъ квасить.

Кочни капустные должно срубать осенью не рано, пошому что оныя опчасти, пока не мерзнутъ, растутъ еще, частью же тѣмъ меньше бывающъ прочны, чѣмъ ранѣе будутъ срублены. Въ этомъ у насъ господствуетъ старинное обыкновеніе, по Хозяйской пословицѣ: Симонъ Иуда срубаетъ капусту, т. е. въ день сего Святаго, сѣ 28 Октября должно капусту срубать. Ранѣе сего капусту у насъ не снимаютъ, а развѣ позднѣе, когда погода простоишь хороша.

Если же случится, что на капусту, еще въ огородѣ стоящую, противу чаянія упадетъ морозъ, тогда дѣло въ томъ будетъ состоять, продолжителенъ ли будетъ морозъ или крапковременной. Здѣсь разумѣются не тѣ малые ночные морозы, скоро сходящіе, кои не токмо капустѣ не вредятъ, но еще учиняютъ, что она будетъ пріятнѣе вкусомъ, и въ квашеніи скорѣе закисаетъ. Здѣсь рѣчь идетъ токмо о большихъ морозахъ, кои въ кочни далеко прохвашиваютъ, и оныя учиняющъ швер-

твёрдыми. Когда по обычаю господствующей погоды, морозы скоро сходятъ, ожидаютъ срубаніемъ и крошеніемъ капусты, а особливо когда послѣ морозу выпадетъ снѣгъ и кочни покроетъ, до тѣхъ поръ, какъ послѣдуетъ оттепель, и кочни совсѣмъ опшайутъ. Если же морозъ держится, то все равно, скоро или не скоро срубить капусту. Нѣтъ тогда совсѣмъ причины спѣшишь, и должно по столько возить подъ кровлю, сколько въ день перекрошишь можно для опшанія. Лучшій способъ въ этомъ успѣвать томъ, чѣмъ замерзшіе кочни класъ въ дщанъ или кадку, накладывать доски и гнеть, наливать холодною водою, и держаъ до тѣхъ поръ, пока весь морозъ изъ кочней выйдетъ водою. Опшавшіе кочни изъ воды вынимаются, и продолжается это до тѣхъ поръ, какъ весь запасъ къ перекрашиванію будетъ опшанъ. Но какъ во всю зиму для повареннаго употребленія берегутъ капусту въ кочняхъ свѣжую, то въ разсужденіи замерзшей капусты лучшій совѣтъ томъ, чѣмъ оставить оную стоять на мѣстѣ, или когда опасно опъ воровъ и зайцевъ, оную хотя срубить, но не вносить въ выходы, гдѣ она опшайтъ можетъ. Лучше класъ оную въ безопасномъ мѣстѣ, чѣмъ не опшавала она, пока морозы продолжаются: ибо, когда твердо замерзшіе кочни въ избѣ или выходахъ растаятъ, не могутъ оныя про-

ле-

лежать долго. Бравъ же изъ лежащихъ на открытомъ мѣстѣ замерзшихъ кочней на расходъ, должно оныя равномерно опшайвашъ въ холодной водѣ; для шого чпо кромѣ воды опшайная капуста, далеко не таковой хорошій вкусъ имѣетъ, какъ та, изъ которой морозъ водою выпянешъ: подобно сему происходитъ съ замерзшимъ овощемъ и яйцами. Не худо впрочемъ, когда осень раннюю зимою угрожаетъ, часть кочней, а особливо тѣхъ, кои весною опредѣляются для сѣменныхъ высадковъ, нѣсколько ранѣе прибирать съ огорода.

Капуста кочанная надлежитъ въ число любимѣйшей пищи нашихъ снранъ, и готовятъ оную либо одну, либо съ мясами въ различныхъ перемѣнахъ. Почему стараются оную сколько возможно долѣе уберечь свѣжею, и употребляютъ къ тому различныя средства. Обыкновеннѣйшія изъ оныхъ слѣдующія:

1) Кочни выдерживаютъ съ корнемъ, наружные не плотно прилегающіе листы опнимаютъ, и кладутъ отъ скопины въ безопасномъ мѣстѣ, рядами плотно кочень къ кочню, втыкая корень съ кочарыгою въ землю, а самые кочни выставляя сверхъ земли. Когда ожидается морозу, накрываютъ кочни гороховинами или мятою ржаною соломой. Если же кочни уже замерзли, прикрываніемъ оныхъ ожидаютъ до тѣхъ поръ,
какъ

какъ шеплою погодою морозъ изъ нихъ
вышянешь. Когда же покрышы соломою
уже были, то зимою можно сполько
кочней изъ подъ соломы вынимаешь,
сколько на расходъ надобно.

2) Такъ называемыя *капустныя*
ямы въ полѣ дѣлаются шаковымъ обра-
зомъ: копають яму вершковъ десяти глу-
биною и въ два аршина съ ченивертью про-
странствомъ, кладутъ въ нее кочни, не
обламывая наружныхъ листовъ, и кочень
близъ кочня шаковымъ образомъ, чтобъ
верхняя часть пришлась внизъ, послѣ чего
засыпають ихъ землею, и такъ лежатъ
оныя въ землѣ до исхода Марта. Въ это
же время шрескаются они, и начинаютъ
пускашь сѣменные стволы: тогда доб-
рый вкусъ оныхъ пропадаетъ, и начи-
нается посторонній травяной. Когда зи-
мою изъ помянутой капустной ямы вы-
нимаешь на расходъ, земля по порядку
рядовъ опгребается, и по вынутой опять
высыпается.

3) Вынутые по описанному въ No 1
кочни, и по обломантѣ сѣ нихъ листовъ,
относятся въ выходъ, сажаются въ пе-
сокъ или землю, или по опрублентѣ
корней кочни кладутся на землю рядами.
Но какъ выходы и погреба бывають шеп-
лѣ земляныхъ ямъ въ полѣ или огоро-
дѣ, то шеплота побуждаетъ еще ранѣе
прорастаешь кочни въ стволы, такъ
чпц

что уже оныя къ поваренному употребленію не годяшся.

4) Малой запасъ капустныхъ кочановъ можно долѣе уберечь въ сухомъ мѣстѣ, гдѣ оныя ошъ морозу безопасны, или во время спужи прикрываемы бытъ могутъ. Можно же въ чуланѣ высушіе кочни около Рождества ошъ морозовъ вносить въ выходъ, гдѣ оныя долѣе удержашся не прорасшая, нежели сначала въ выходъ внесенные. Когда же большіе морозы кончашся, въ исходѣ Февраля можно кочни выносить опяшь въ чуланъ, дабы шѣмъ долѣе удержатъ ихъ ошъ прорасанія.

Воспитаніе сѣменъ требуетъ особливаго вниманія, пошому что оныя въ нѣкошорые годы бывають очень дороги, и фунтъ оныхъ покупается рубли по два и выше. Къ шомужъ покупныя сѣмена не всегда бывають изъ такихъ мѣстъ, гдѣ родилсѣ хорошая капуста. А хощябъ были оныя и изъ шѣхъ мѣстъ, могутъ оныя ишши изъ шѣхъ рукъ, кои съ намѣреніемъ плохія сѣмена выращивають, чтообъ шолько побольше количествомъ продашь. Великая нужда въ добрыхъ сѣменахъ, чтообъ имѣть хорошую капусту, что съ хорошимъ присмотромъ и содержаніемъ полагаешъ основаніе къ полученію лучшихъ кочановъ.

Первая забота при воспитаніи сѣменъ состоишъ въ выборѣ кочановъ для высадковъ.

ковъ. Избираютъ къ сему не токмо самыя большіе, но и шаковые, кошорыхъ вилокъ очень пугъ въ срединѣ. Сіе послѣднее свойство узнать можно ощаси давленіемъ першовъ, когда вилокъ давленію не уступаетъ, частью же и по шягости, естли взять въ руку и съ другими сравнить. У кого естль круглые и плоскіе кочки, всегда находящаяся между огыми кочки, имѣющіе оспровоано круглой верхъ. Таковыя, хопябъ шуги были, когда на сѣмены отбираютъ круглой или плоской родъ, для высадковъ не берутся.

На высадки выбранные кочки выдерживаются совсѣмъ съ кореньями. Чѣмъ позднѣе эпо осенью произведено бытъ можетъ, тѣмъ годнѣе будущъ оныя къ сѣменоношенію. Почему нѣкоторые искусные огородники въ глубокую осень около отборныхъ кочней землю насѣкаютъ лопаткою, и не много нагибаютъ на сторону, чтобъ позднѣе въ сиволъ пошли. Въ эпомъ состояніи оставляютъ они кочки лежать до самаго наступленія морозовъ, а тогда изъ земли вынувъ, привѣшиваютъ за кочарыги въ сухомъ мѣстѣ до весны, когда надобно будетъ весною высадить ихъ на гряду. Естли же сихъ кочней по вышесказанному до глубокой осени на мѣстѣ оспавить не можно, вынимаютъ ихъ въ шо время, какъ срубляютъ прочую капусту, и привѣшиваютъ за кочарыги въ сухомъ прохладномъ мѣстѣ; однако зимою отъ

моро-

морозовъ закрываютъ, но сполько, чтобъ онъ теплошы въ ростъ не пошли; почему какъ скоро морозы оппускаютъ, должно ихъ опять открыть. Нѣкоторые крестьяне привѣшиваютъ шаковые высадковые кочни за кочарыги въ трубѣ, гдѣ онъ отъ дыму содержащяся въ сухости, а приномъ и отъ морозу защищаются. Замерзанію высадковъ зимою препятствуютъ всякимъ образомъ, для того что листы ихъ опшаявъ въ покаяхъ теплыхъ, скоро въ гниль переходяшъ, хотя сердце въ нихъ останется еще хорошо, и растетъ въ стволъ. Лучшія сѣмена получаютъ отъ шаковыхъ высадковъ, кои зиму хорошо пролежашъ, и такъ, что листовъ на нихъ не загниетъ, или очень мало. Отъ загнившихъ же происходитъ кромѣ сего, по другимъ ниже описаннымъ причинамъ, такъ называемая хвороспная капуста.

Высаживаніе сѣменныхъ высадковъ происходитъ весною шаковымъ образомъ: сажаютъ оныя въ самую жирно унавоженную землю на мѣстѣ, довольно освѣщаемомъ солнцемъ, на семь вершковъ разстояніемъ, такъ глубоко, чтобъ кочанъ наравнѣ былъ съ грядою, или лучше сказать только одинъ верхъ онаго изъ земли выставлялся: шѣмъ принуждается стволъ отрасли свои пускать изъ одного сердца или стержня кочаннаго. Когда появляшя побочные оппрыски, должно ихъ пошчасъ срѣзывать, чтобы вся сила обратилась къ главному

Часть IV. Отдѣл. 2. ф ному

ному себѣ одному. Искусные садовники безъ того утверждаютъ, что побочные отростки, когда допустить оныя сѣмена принесть, не могутъ произвесть годныхъ сѣменъ, равно какъ и главной спволъ въ сообществѣ съ ними, и обыкновенно отъ шаковыхъ сѣменъ много выходитъ хворосшной капусты. На послѣдокъ изъ главныхъ спволоу должно обрѣзывать нижніе малые побѣги, кои только главные спволы ослабляя, доводятъ къ ношенію сѣменъ слабыхъ, отъ кошорыхъ хотя не выходитъ хворосшной капусты, но не бываетъ и шугихъ вилокъ, а лишь слабые и проховые. Изъ сего видимо, сколько надобно знать человека, у кошораго бы покупкою сѣмъ не обманулся. Таковымъ образомъ ощенные сѣмена можно только шамъ употреблять, гдѣ сажаютъ капусту въ полѣ къ полученію малыхъ кочановъ, и въ этомъ намѣреніи даютъ имъ сполько простору, чтобъ сѣли они вершковъ на семь или на десять въ квадрашъ; для того что въ прочемъ выдутъ рухлые или проховые кочаны, или хворосная не вилая капуста. Таковыхъ кочановъ не покупаютъ, или очень бракууютъ. Въ кормленіи скошины шаковою капустою, имѣющею не шугіе кочни, шакъ же обманулся можно. Нужно взять сполько вѣсы и на одну чашку положишъ шугой кочанъ малаго роду, а на другую два или больше не вилыхъ кочановъ, то одинъ

одинъ шугой кочанъ ихъ перешагнетъ. Эк-
хартъ правъ, когда выгоду порядочнаго
капустоводства шаковымъ образомъ ура-
вниваешь: на учаскѣ земли подъ капу-
сною, когда порядочно за оною хожденіе,
скорѣе можно выручить 50 рублей, неже-
ли обсеявъ овсомъ или ячменемъ 25 ру-
блей.

Какъ уже сказано, что на сѣменныхъ
высадкахъ не должно терпѣть побочныхъ
отросковъ, то еще замѣнить должно,
что не рѣдко это предошврашишь можно
провѣтриваніемъ кочановъ. Производи-
ся сіе крестообразною нарѣзкою сверху
въ кочанъ, чрезъ что облегчается проби-
ваніе спволовъ вверхъ. Дѣлають это
недѣли чрезъ чешыре по высаженіи на гря-
ду сѣменныхъ высадковъ. Нѣкоторые ко-
чни долго стоятъ, пока спволы изъ нихъ
пробились могутъ. Таковы обыкновенно
бывають кочни, имѣющіе внутри шугой
вилокъ, и пошому принуждаются въ спо-
роны пробиваться росками и искашь
себѣ выходу. Провѣтриваніе это въ осо-
бливости нужно для красной капусты,
пошому что она не сполько способна къ
произращенію спволовъ, какъ бѣлая. Что
же сѣменные высадки красной и синей ка-
пусты выраживаются въ блѣдой цвѣтъ,
когда сидятъ близъ высадковъ бѣлой ка-
пусты, о томъ выше упомянуто.

Когда поступаемо будетъ съ сѣменными
высадками по сказанному предписанію, дол-

жно, къ удержанію сшволоу ихъ прямо, подкладывать со споронъ жердки на сошкахъ.

Случается иногда, что земляныя блохи посѣщаютъ цвѣты кочанной капусты, плодородной ростокъ выѣдаютъ и цвѣты дѣлаютъ пустыми. Какъ скоро шакковыя блохи на цвѣсахъ примѣчены будутъ, должно нѣсколько разъ въ день изъ поливальника цвѣты, сшволъ и гряды въ сухое и шеплое время до шѣхъ поръ опрыскивать, пока случится дождь, или цвѣты облесятъ и спручья завянутъ.

Спручья большой части капустныхъ родовъ поспѣваютъ въ Августѣ, но не всѣ вдругъ; почему сшблы мало по малу обираютъ, чтобъ не переспѣли, не треснули и сѣмена бы изъ нихъ не высыпались. Послѣднее неминуемо случится, когда до шѣхъ поръ ждать, пока всѣ сѣменные спручья поспѣютъ.

Огородники и другіе люди, прилѣжающіе къ шоргу сѣменами, и поэтому водящіе оныхъ множесшвомъ, достигаютъ кратчайшимъ пушемъ къ полученію сѣменъ. Они срѣзываютъ съ гряды всѣ стебли сѣменные вдругъ, но спараются особливымъ способомъ всѣ сѣмена на нихъ привести въ зрѣлость. Это производится посредствомъ *потѣнія*. Въ сухое время срѣзываютъ всѣ сѣменные сшволы, когда отчаспи нѣкоторыя спручья на нихъ
пре-

прескаться начнутъ, кладутъ оныя въ сараѣ въ круглую кучу, чтобъ охвоспья пришли наружу, а спручья внутрь; кучу прикрываютъ досками, и нагибаютъ камнями; оставляютъ подъ этимъ гнетомъ кучу нѣсколько дней, и до шѣхъ поръ, какъ оная начнетъ разгорячаться, что случается въ теплую погоду чрезъ 4 дни, а въ холодную чрезъ 5 и 6 дней; тогда куча начнетъ дымиться и выпускаетъ вонь. Примѣшивъ это, покрывку немедленно снимаютъ, кучу раскапываютъ, сѣмьны одинъ по одному берутъ въ руку и встряхиваютъ сѣмена, кои легко тогда выпадаютъ. Сѣмена сѣи бываютъ тогда мягки и пухлы, должно оныя не мѣшкать въ нѣнѣстомъ мѣстѣ рассыпать тонкимъ слоемъ, и почасу до шѣхъ поръ переворачивать, пока оныя сожмутся и высохнутъ. Послѣ того очистивъ оныя отъ сору и пыли, хранятъ до употребленія. Однакожъ это производсво не безопасно, и когда разгорячившися сѣмена въ надлежащую пору не провѣтришь, то прорастутъ оныя въ спручьяхъ и сѣмьны пропадутъ. Рѣдко же, чтобъ въ этомъ случаѣ во всѣхъ спручьяхъ сѣмена доспѣли полной зрѣлости; почему недоспѣлые спручья надлежитъ класть въ кучу, и поступать съ ними по вышеписанному. Таковымъ образомъ приготоовленные сѣмена удерживаютъ обыкновенно чадной запахъ, однакожъ естли по надлежащему съ оны-

ми поступаемо было, хорошо всходятъ. Но какъ большая часть сихъ спручьевъ на корнѣ своемъ въ спручьяхъ не могутъ достигнуть надлежащаго совершенства, не могутъ уподобиться оныя шѣмъ, кои на корнѣ совѣмъ вызрѣваютъ, и мало по малу обираются. Различіе оныхъ можно легко усмотрѣть въ янѣмъ на шoku, и увидѣть, сколько много зеренъ будетъ упасть азанками, или у самыхъ ногъ; ибо посѣвныя на корнѣ сѣмена гораздо шжеловѣснѣе, и сосавляютъ шакъ называемое чолушко или ошпрыгъ.

Лѣшней капусшѣ, о копорой по сѣхъ поръ писано было, прошиву посавляется *зимовая кочанная капуста*, копорой различіе шолько во времени посѣва сосшопшѣ; ибо оба рода ошѣ однихъ сѣменѣ, происходшѣ. Изъ семянъ, посѣянныхъ весною, выходшѣ лѣшняя капусша, а изъ сѣмянъ **высѣваемыхъ** лѣшомъ въ Іюль или Августѣ даже, выходшѣ озимая кочанная капуста.

По сему озимую капусшу сѣютъ 14 Іюля на грядѣ, освѣщаемой солнцемъ, и къ удержанію земляныхъ блохъ прилѣжно поливаютъ. Вскорѣ послѣ Воздвиженья (14 Сентября) высаживаютъ расаду на грядѣ, прошиву полденъ расположенной, вершковъ на 14 между собою разстояншѣ, и сажаютъ нѣсколько глубже лѣшней расады. Огородники обыкновенно дѣлаютъ къ шому небольшое углубленіе или ямку подобіемъ куриного гнѣзда, въ ко-
шо-

порой расшѣнія въ слѣдствіи небольшимъ количествомъ навозу опѣ морозовъ сохраняющъ. Если же случится жестокой морозъ, прикрываютъ капусту сухимъ листомъ, а не соломой, подъ которою охотно заводятся мыши. Когда же послѣдуетъ дождливая погода, должно капусту опять опкрыть, чѣмъ не сгнила. Нѣкоторые кусы могутъ зимою пропасть, почему на первой грядѣ оставляютъ разсаду въ запасъ, чѣмъ весною оную на упалыя мѣста высадить. Нѣкоторые сажаютъ въ помянутыхъ ямкахъ по 3 и 4 корня разсады, чѣмъ послѣ жестокой зимы хотя одинъ остался цѣлъ, а лишніе весною выдергиваютъ. Еще другіе, въ предосторожность зимней стужи, стараются разсаду на грядкахъ или въ выходахъ или въ парникахъ уберечь, весною же по окончаніи морозовъ высаживаютъ. Послѣднее въ особливости шамъ совѣтовать должно, гдѣ зайцамъ входъ въ огородъ отвраишь не можно; потому что оныя сѣбѣдаютъ капусту по самой корень, и гдѣ пропитаніе ихъ скудно, выкапываютъ изъ подъ снѣгу разсаду и молодыя высадки, кои бы легко прозимовашь могли, и совѣмъ оныя выѣдаютъ. Хожденіе за озимую капустою впрочемъ съ лѣтнею капустою одинаково.

Поелику озимая или зимовая капуста къ половинѣ Іюля въ большіе кочаны свивается, то огородники въ большихъ горо-

дахъ, и подгородныхъ селеніяхъ деревенскіе жишели, очень прилѣжанъ къ вожденію оной, для того чшо на оную, какъ первую въ году, великой расходъ, и платяшъ за нее цѣну цѣлою шрепью больше.

ББ. *Савойская капуста.*

Земледѣліе и хожденіе за эшою капустою одинаково съ предшешюю, и равномѣрно изъ однихъ сѣменъ вырощающъ оную лѣшнюю и зимовую, чшо зависяшъ отъ высѣву въ разное время сѣменъ.

Для лѣшней Савойской капусты, или какъ садовники называющъ *жатаго сафою*, сѣющъ разсаду въ Мартѣ и Апрѣлѣ, и высаживаютъ оную на жирную землю на 14 вершковъ между собою разстояніемъ; впрочемъ обкапываніе и пригребаніе земли къ корнямъ одинаково, какъ и въ разсужденіи бѣлой кочанной капусты. Кочаны оной лѣломъ и осенью поспѣвають въ кушанъѣ. Охотнѣе употребляютъ оную, пока она не свилась еще въ кочаны, для того чшо она тогда пріятнѣе вкусомъ, а со временемъ ребра въ лиспахъ ея учиняются толсты и жестки.

Кочней Савойской капусты не лъзя беречь въ ямахъ, землю засыпаемыхъ; почему укладываютъ ихъ на огородѣ рядами шаковымъ образомъ, чшобъ корень и кочерыга была въ землѣ, а кочни свержъ оной. По наступленіи морозовъ покрываютъ ихъ землею. Въ сухомъ выходѣ кладущъ ихъ шако-

паковымъ же образомъ, только не покрываютъ.

Изъ самаго сего лѣшняго роду отбираются сѣменные высадки, и припомъ паковыя, кои прямо желшны, имѣютъ очень кудрявые лисшны и крупные кочни; впрочемъ сѣмена выраживаются, и производятъ лишь худой зеленой сафой, или такъ называемую шлоштеръ-коль, у которой кочни очень дробны. Съ высадками поступаютъ одинаково, какъ съ бѣлою капустою.

Для зимоваго сафою сѣютъ разсаду въ Юлѣ съ начала или съ половины. Разсаду осенью высаживаютъ, и оспавляютъ зимовашъ безъ всякой покрывки, и весною поспѣваетъ она въ кушанѣ. Впрочемъ въ жестокіе морозы прикрываютъ оную подобно зимовой бѣлой капустѣ.

ВВ. *Зеленая Савойская капуста, или Вирѣннская капуста.*

Нѣмцы называютъ оную *Wirting Kohl*, *Welsch-Kohl*, *Herz-Kohl* и *Worsch-Kohl*. Она соспавляетъ опродѣ настоящей Савойской капусты; и шѣмъ только опличается, что имѣетъ зеленые, кудрявые, морщеватые и большею часшью съ шемною зеленью лисшны, на кошорыхъ морщины иногда такъ между собою не равны, что лисшны кажутся какъ бы соспавлены изъ вздутыхъ пузырей, снизу пустыхъ. У Нѣмцовъ называется она *Herz-Kohl*, ш. е. сердечная капуста; потому что большихъ

кочней на оной не бываетъ, а свиваются только сердечки или малые кочанки внутри.

Раздѣляютъ эту капусту равномерно на лѣтнюю и зимовую. Оба опродія вырастаютъ по прежде описанному образцу о Савойской капустѣ.

Лѣтній родъ сѣютъ въ Мартѣ и Маѣ. Въ послѣднемъ мѣсяцѣ произведенной сѣвъ, по состоянію погоды, не рѣдко производитъ лучшіе кочни, нежели первый сѣвъ. Ошъ онаго разсаду высаживаютъ въ Маѣ, а послѣдняго сѣву въ Іюнѣ, въ жирную землю, на 14 вершковъ разспоянѣмъ.

Капуста сія рѣдко вымерзаетъ зимою, почему оную въ самую глубокую осень выдергавъ, вшыкаютъ въ землю рядами, и только въ жестокіе морозы прикрываютъ соломой.

ГГ. Брюква сверхъ-земная.

Называется оная инако съ Нѣмецкаго названія *кольрибенъ*, неправильно *кольраби* или *кулерабія*; собственно же Нѣмецкое имя ея значитъ рѣдную капусту, и есть оная насшоящее опродіе капусты. Эшой брюквы два сорта, различествующихъ въ краскѣ, пошому что одна зеленая, а другая синя. Сѣютъ оную въ Мартѣ, а разсаду въ Маѣ и Іюнѣ, въ тучную землю, на 14 вершковъ разспоянѣмъ, и пошомъ хожденіе за оною одинаково съ бѣлою капустою. Листовъ съ нее не обламываютъ, пошому что шары распушъ
луч-

лучше, и мякишъ оныхъ не таковъ выходитъ швердъ. Послѣднее выходитъ осенью. Когда шары или булавы эшой брюквы будутъ величиною въ большое яблоко, тогда въ оныхъ лучший вкусъ.

Осенью для зимняго расходу кольрабѣю вынимаютъ, и обрѣзавъ листы до самаго сердца, выкаютъ ее въ сухой песокъ въ выходъ; или лучше, кладутъ въ выкопанную на огородѣ яму, и засыпаютъ землею, отъ чего бываетъ она свѣжѣе и вкуснѣе сохраняемой въ погребахъ.

Къ воспитанію сѣменъ перезимовавшій булавы высаживаютъ на огородѣ, выкакая оныхъ три четверти въ землю, а четверть выставляя наружу.

ДД. Брюква подземная.

Сію брюкву также сѣютъ въ Мартѣ и Маѣ, и разсаду послѣдней высаживаютъ въ Іюнѣ и Іюлѣ. Ранняя сѣву брюква, хотя ранѣе лѣшомъ поспѣваетъ, однакожъ, когда мѣсяцы Май и Іюнь будутъ жарки и сухи, нападаютъ на листы ея черви, отъ чего оныя вянутъ, корни же не годны въ пищу учиняющіяся, или пускаютъ сѣменные стволы и цвѣтутъ.

Разсаду эшой брюквы высаживаютъ въ посредственную не свѣже унавоженную землю, на 10 вершковъ разстояніемъ, а потомъ ходеніе за нею одинакое съ брюквою сверхземною. Корень ея, единственно въ пищу употребляемый, выходитъ лучше, когда листы ея обламывать уже осенью.

Хаге-

Хагедорнъ пишетъ: этотъ родъ брюквы въ деревнѣ необходимъ. Она сыпна для домовыхъ служителей; по величинѣ своей не трудна она къ очищанію, вкусна и здорова для щогаго желудка. — У насъ въ Нѣмецкой землѣ, въ недоспашкѣ малой Маркской рѣпы, подають брюкву эшу на столъ особъ средшвеннаго соспо-янія, пошому чшо вкусомъ она соспавляетъ средину между сею и большою водяною рѣпою; а особливо находятъ оную пріятною въ пригшвленіи съ щукою и коровымъ масломъ. Зимомъ вкусъ ея не шаковъ, для шого чшо дѣлаешся очень сладокъ. Въ лежанье она прочнѣе бѣлой рѣпы. На зиму лучше оную хранишь въ земляныхъ ямахъ, нежели въ выходахъ: въ землѣ бываешъ она вкуснѣе. Сѣмена вырощають, подобно шакъ, какъ бѣлой капусы.

ЕЕ. *Цвѣтная капуста.*

Называютъ же оную инако *сырная капуста* и *карвіоль*. Имѣемъ мы оной многіе роды, которыхъ сѣмена, поелику у насъ рѣдко выпсѣвають, выписываютъ изъ теплыхъ странъ. Кипрская считается лучшею: оная шемнокрасна, крупна и кругла въ сѣменахъ, а выходящая изъ нихъ капуста получаетъ красивые, крупные, бѣлые кочни. Ишпаліанская блѣдно шемнаго цвѣшу, и кочни ея больше раздѣляющся, и между листовъ прорасшють. Обоихъ родовъ сѣмена лежатъ всхожи 5 лѣтъ, почему на сполько

лѣтъ изъ показанныхъ странъ оными запасаться надлежитъ; ибо извѣстно, что можно получить оныя опшуда въ первой годъ.

Посѣвъ цвѣтной капусты можно производить въ разное время года, какъ кому угодно будетъ имѣть оную въ кушаньѣ, лѣтомъ, осенью или зимою. Когда надобно имѣть оную рано, сѣютъ ее въ парникъ въ концѣ Феврала, тогда какъ парникъ перваго жару своего лишится; а чтобы и впредъ скорому вырастанію ея воспрепятствовать, не худо парникъ вмѣсто оконницъ накрывать только досками или соломенными полстьми, ославляя съ высокой или сѣверной стороны опшверстїе, чтобы пары выходили, и отъ кошорыхъ молодая разсада легко загниваетъ. Высаживаніемъ разсады охотно выжидаютъ Мая мѣсяца, потому что въ Апрѣлѣ нападають на нее скорѣе земляныя блохи, за недостаткомъ въ пищѣ. Высаживаніе можно производить, когда разсада получитъ шесть листовъ, въ сухую землю, на 14 вершковъ разстояніемъ. Нѣкоторые по пересадкѣ днемъ на нѣсколько часовъ разсаду прикрываютъ отъ жару, пока примется; требуетъ же она рачительнаго поливанія и обкапыванія. Лучшая земля для нее песчаная, упученная добрымъ навозомъ, или жирными землями; однако навозъ не должно употреблять свѣжій. Мѣсто низменное, или совсѣмъ болопистое, подъ оную

оную не годилися. Однакожъ случилось мнѣ нѣсколько разъ видѣшь въ жаркія и сух-
менныя лѣта, что цвѣтная капуста на
влажномъ низменномъ мѣстѣ приносила
цвѣтныя вилки вдвое крупнѣе обыкно-
венныхъ. Въ тоже время на цвѣтной ка-
пустѣ, родившейся на шаковомъ мѣстѣ,
что она бывъ посажена рано, по срѣза-
нїи первыхъ цвѣтовъ, къ осени вшорично
цвѣты принесла. Впрочемъ нижнїе листы
этой капусты обыкновенно обламываются,
чтобъ у цвѣтовъ соку не опнимали. Так-
же и цвѣты, когда начнушъ пробиваться,
прикрываютъ отъ жару листомъ.

Когда надобно, чтобъ цвѣтная капу-
ста была осенью и въ зиму, сѣмена ея въ на-
чалѣ Мая мѣсяца на открытой, вскопан-
ной, не вновь унавоженной, лучше нѣсколь-
ко песчаной грядѣ разсѣваютъ сверху,
потомъ вдавливаютъ въ землю, чтобъ не
попали въ пустошу земли, а разсаду, какъ
скоро годна будетъ, разсаживаютъ, и
далѣе поступаютъ точно такъ, какъ съ
кочанною капустою. Въ концѣ Сентября
можно уже будетъ нѣсколько кустовъ вы-
рѣзать, и продолжатъ это чрезъ долгое
время, потому что кустъ за кустомъ по-
спѣвать начнетъ. Осенняя цвѣтная капу-
ста производитъ крупнѣе и лучше кусты,
нежели лѣтняя цвѣтная капуста, которой
разсада сѣяна въ парникахъ. Сїя обыкновен-
но не имѣетъ шаковой красивой бѣлизны,
и выходитъ желтовата или красновата.

По-

Понеже цвѣтная капуста кѣ спужѣ очень чувствительна, должно сидящіе на открытомѣ мѣстѣ кусты осенью выдерживать и переносить въ сохраненіе, что можно производить съ поспѣвшею и недоспѣлою.

Когда въ осеннее время будетъ поспѣвшая цвѣтная капуста, отрѣзываютъ корни либо совсѣмъ, или въ половину отъ кочарыги, укорачиваютъ листовъ, и шакъ кладутъ на доски въ прохладномѣ погребѣ или въ сухомѣ чуланѣ, гдѣ она еще многія недѣли въ цѣлости улежатъ можешъ.

Въ кошоромѣ же кустъ цвѣточная головка еще мала, отрѣзываютъ верхнихъ листовъ половину, и сажаютъ оную въ выходѣ на грядѣ, сдѣланной изъ огородной песчаной земли, или изъ одного песку. Кусты шутъ садить должно въ шакомѣ разстояніи, чшобъ листья разныхъ кустовъ другъ друга не касались. Угнѣпаяютъ землю кѣ корнямъ при саженіи, и поливаютъ такъ, чшобъ воды ни на кустъ, или на цвѣтъ не попало: эшо приключаетъ гниль. Должно же остерегаться, вынимая въ разныхъ мѣстахъ поспѣлые кусты, чшобъ земли или песку не попало въ сосѣдственной кустъ; ибо отъ того равномѣрно гнилоеть происходитъ. Главное обстоятельство при храненіи эшой капусты то, чшобъ впускать въ погребъ или выходъ воздухъ. Ешшли сего въ по-
слѣд-

слѣдствѣ дѣлать будетъ не можно, но временемъ по различію погоды иногда больше, иногда меньше воздуху впускашь должно, есѣли хотѣшь, чтобъ вышли хорошіе цвѣты.

Зимовая цвѣтная капуста можетъ равномерно выдерживаема быть, къ чему Г. Людеръ сдѣлалъ насѣвленіе, какъ оную безъ покрѣшки и парниковъ на открьтомъ воздухѣ сажать, и весною въ совершенствѣ приводить можно. Надлежитъ къ сему преимущественно брать добрыя Англическія сѣмена, которыя больше, красноватѣе и не столько круглы, какъ обыкновенныя капустныя сѣмена. Сѣять оныя въ началѣ Августа на грядѣ, не имѣющей застѣни и не подверженной вѣспрамѣ, а при томъ состоящей изъ земли не жирной, но нѣсколько худощавой и не свѣжевыкопанной. Опорожнившаяся гороховая гряда къ сему самая способнѣйшая. Сѣять на ней сѣмена очень рѣдко, и къ споспѣшествованію всходовъ очень умѣреннѣе поливать. Чѣмъ растѣнія зиму выдержали, должно каждому вершка на полшора или на два имѣть пространства, чтобъ оныя укрѣпиться могли. Въ началѣ Октября пересаживать ихъ на лежащую въ сухомъ мѣстѣ, не худощавую, отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣспровъ защищенную, глубоко вскопанную и стоппанную гряду, послѣ чего оныя весною принесутъ цвѣты. Пересаживать же расаду сію по самое сердце,

це, но такъ, чѣнобъ ни сердца землею не засыпашъ, ни земли бы въ него не попало, на 14 вершковъ разсѣпоаніемъ крестообразно. Какъ скоро расада будешъ посажена и угнѣшена, полишъ въ ямку, отъ давленія руки произшедшую, воды, и въ сухмень нѣсколько вечеровъ сряду поливаніе повторишъ. При пересадкѣ концы кореньевъ обрѣзашъ. Въ Мартѣ и Апрѣлѣ, когда еще лисы на ней очень малы, нѣкоторыя изъ высадковъ начинаютъ выпускать цвѣты, но оныя вскорѣ раздѣляющіяся и пріемлютъ красноватую краску. Поелику изъ такихъ не лзя ожидать крупныхъ цвѣтчаныхъ головицъ, можно оныя шотчасъ вырѣзывать и употреблять. Другіе же, не выводящія цвѣтовъ, пока лисы ихъ надлежащей величины достигнутъ, доспавляютъ въ Маѣ и Іюнѣ лучшую капусту. А чѣнобъ во время прибавляющейся теплой погоды головицы не раздѣлились, можно лисы всего куста, когда оныя бывають совсѣмъ сухи, надъ головицею связывать.

ЖЖ. *Спаржная капуста или броколи.*

Сія капуста лѣтъ за 40 перешла къ намъ изъ Италіи, но въ основаніи составляетъ шокмо ошродіе цвѣтчаной капусты. Спаржную капустою называють ее по тому, что толстые ея стебли бдятъ какъ спаржу. Оныя бывають шѣмъ вкуснѣе, чѣмъ больше въ нихъ содержишя соку, мягкости и нѣжности.

Часть IV. Отдѣл. 2. X

Са-

Садовники въ разсужденіи названія броколи производящъ замѣшательство, когда оппрыски весенніе листвяной капусты, и всякой капусты вообще, называютъ брокколи или брокельнѣ. Г. Бекманъ припоминаетъ въ своихъ *Grundsätzen der Deutschen Land-Wirtschaft* справедливо, что за сію неизвѣстность должно упрекать Ботанику; ибо приводитъ онъ изъ де ла Морра въ *Хомелевомъ Лексиконѣ* I. стр. 606, что во Франціи называютъ брокколи оппрыски кочанной и кудрявой капустъ, ославляемыхъ зимовать на своемъ мѣстѣ, по срѣзаніи кочановъ, и когда они весною оппрыснутъ. Нашъ помянутый Нѣмецкій домо-водства учитель прибавляетъ къ тому, что Ботаника не имѣетъ нужды далѣе заболѣться о переменчивыхъ и безконечныхъ отродіяхъ, кромѣ того только, чтобъ опредѣлить, къ какому роду оныя надлежатъ. Садовники же и Хозяева не рѣдко предпочитаютъ случайное отродіе за вкусъ, или иное хорошее свойство, прочимъ, и стараются оное размножать особливо. Между тѣмъ всеконечно стоить труда вѣдать названія, даваемые Ботаниками отродіямъ; ибо чрезъ то можно достигнуть вышняго степени достовѣренности, каковую естество сей вещи позволяеть. —

Наша брокколи воспитаніемъ и содержаніемъ своимъ большею частью во всемъ сходствуетъ съ настоящею цвѣтною капустою.

пустою. Два оной рода, между собою сходныхъ, синяя и бѣлая; но первая выводитъ сшволы нѣсколько выше послѣдней. Оба рода вообще распунливы, и получающъ опѣ шого большіе толстые лисы и длинныя толстыя кочарыги. По утвержденію Г. Миллера находимся три опродія броколи, *Римская* или *пурпуровокрасная*, кою онѣ за лучшую считающъ, и кошорая только цвѣтомъ своимъ опѣ цвѣтной капусты различествуетъ. *Темная* или *черная* похуже первой, не шакъ вкусна и прочна, но холодъ выдерживаетъ лучше. *Неапольская* или *бѣлая* всѣхъ сходнѣе къ цвѣтной капустѣ, и едва ли вкусомъ различна.

33. *Листвяная капуста.*

Элсхольцъ въ своемъ новомъ садоводствѣ, Т. III. глав. 13. капусту вообще раздѣляетъ на кочанную и листвяную, ш. е. не вилую, и подѣ послѣднимъ родомъ разумѣетъ всѣ опродія, въ кочанѣ не свивающіяся. Онѣ листвяную капусту опять на три опродія раздѣляетъ: 1) на обыкновенную сѣрую или зеленую капусту; 2) на обыкновенную темнокрасную капусту; 3) на кудрявую капусту, и присовокупляетъ къ шому яловую капусту, кошорая въ шрешій годъ въ сшволѣ идеетъ, и какъ онѣ пишетъ, шо изъ всякой листвяной капусты можно сдѣлать кочанную, а именно посѣявъ сѣмена въ послѣдней половинѣ Іюля, въ половинѣ Сентя-

бря пересадивъ, весною получишь яловую капусту, которая въ слѣдующій пошомъ годъ пойдетъ въ сѣменной символъ. Во-первыхъ замѣчаю я сіе, что Эдсхольцъ въ разсужденіи различныхъ опродій лиспяной капусты употребляетъ названія, кои поднесъ въ шомъ мѣстѣ, гдѣ онъ жилъ, и около Берлина удержаны. Въ среднемъ Маркѣ Брандбургскомъ разумѣютъ подъ однимъ именемъ *зеленой капусты* всѣ роды, хотябъ цвѣшомъ были оныя зелены, желты или сини. Равнымъ образомъ въ другихъ мѣстахъ всѣ сіи роды разумѣютъ подъ однимъ названіемъ *синей капусты*, а въ иныхъ то же подъ именемъ *темной капусты*.

Не взирая на краску, пойду я здѣсь по слѣдамъ славнаго Профессора Г. Бекмана, которой въ своей вышеприведенной столько основательной книгѣ опродія этой капусты въ слѣдующемъ порядкѣ описываетъ:

1) *Плюмажная капуста*, или *перистая капуста*. Лисы ея бывають украшены пестрою краскою, служащъ въ пищу, но обыкновеннѣе обкладываютъ оными блюда для прикрасы. Лѣшомъ пестроты этой на лисахъ не бываетъ, а оказывается она осенью и зимою. Равномѣрно лисы сіи меньше пестры бывають закопанные въ землѣ, нежели содержимые въ погребѣ. Тутъ украшаются оныя примѣшнымъ образомъ. Лѣшомъ

помѣ можно ихъ обламывать и сушить для зимняго корму скопамъ, что удобно, ибо оныя не скоро загниваютъ.

2) *Темная капуста, крестьянская капуста, синяя капуста, Брауншвейгская кудрявая капуста.* Это отродѣ растетъ высоко, и тѣмъ выше, чѣмъ тѣснѣ капуста сидитъ, и чѣмъ чаще листья съ нее обламываютъ. Сію высокую капусту тамъ предпочитаютъ, гдѣ много мышей, потому что оныя спержень ея не такъ легко выѣдать могутъ, какъ у слѣдующаго рода. Но какъ оную скорѣе убиваетъ морозъ, то по сему низкая капуста предпочитается. Когда кусны вырастутъ, нижніе листья чрезъ все лѣто обламываются въ кормъ скопамъ; ибо впрочемъ желкнутъ, и лишь вредящъ росу другихъ листовъ. Оснавляютъ эту капусту либо зимовать на мѣстѣ, елики нѣтъ опасности отъ кражи и поядѣнія отъ звѣрей, или выдержувъ кусны около Екаперирина дни (24 Ноября), кладутъ рядами въ землю такъ, чтобы спержня не закрытъ, какъ послѣ подробнѣе будетъ сказано.

3) *Бардовикская капуста, низкая темная капуста.* Сія капуста отъ земли не растетъ, рѣдко бываетъ вершковъ семи вышиною, и выдерживаетъ зиму подъ снѣгомъ въ сухомъ пескѣ. Елики часто листья съ нее обламы-

вашъ, принуждаетъ эшо ее съ году на годъ расти выше. Почему не должно обламывать съ нее лисовъ, кромѣ желшѣющихъ и загнивающихъ съ земли.

4) *Высокая, Померанская капуста, Руппинская капуста.* Прозваніе свое безъ сомнѣнія имѣетъ отъ того, что много оной водятъ въ Помераніи. Маркцы называютъ оную Руппинскою, пошому что нигдѣ оной столько нѣтъ, какъ въ Руппинскомъ уѣздѣ, гдѣ крестьяне сажаютъ оную даже въ садахъ подѣ плодовитыми деревьями, для кормленія и откармливанія своей скопины. Еслили растетъ она на тучной землѣ, могутъ снѣбли ея выбѣжать выше чело-вѣка ростомъ, а толщиною въ толстую трабельную ручку. Листы на ней велики, толсты, длинны и не кудрявы. Обламываютъ оную лѣтомъ. Не должно ославлять оную поздно осенью на мѣсѣ, для того что снѣбли ея и сред-свеннымъ морозомъ убиваетъ, послѣ чего оныя въ кормъ не годятся. Крестьяне въ Руппинской округѣ начинаютъ въ половинѣ Септября длинные снѣбли ея, пока оныя мягки, срѣзывать, крошатъ оныя мелко по подобію рѣзки, и смѣшавъ съ соломенною рѣзкою даютъ скопинѣ. Оныя лучше питаютъ, нежели листы. Два рода оной въ разсужде-ніи цвѣту, синяя и зеленая. Листы ея изъ всѣхъ капустныхъ родовъ вкусомъ

ху-

хуже, почему рѣдко ихъ въ пищу употребляютъ; но скопы бдящъ листы и стебли ея охотно ѣ всякой зелени. Можно же какъ листы, такъ и стебли изрубивъ въ крошиво, по подобію рѣпы и кочанной капусты, квасить.

5) *Подрѣзная капуста*, названіе свое имѣетъ по тому, что какъ скоро ошраснаетъ столько, что рукою захватить можно, до нѣсколькихъ разъ оную влощъ по землю срѣзываютъ, и употребляютъ въ пищу. Сѣмена ея сѣютъ весною, а кочарыги оставляютъ зимовать на мѣстѣ, ибо онѣ не вымерзаютъ. Весною идутъ онѣ въ споль, цвѣтутъ и сѣмена приносятъ.

6) *Яловая капуста*. Находится она большею частью только въ Маркѣ Брандбургскомъ, и по Элсхолцову раздѣленію знакома шамъ была еще въ прошедшемъ вѣкѣ. Яловою прозвали оную, потому что она такъ какъ нѣкопорыя коровы, коихъ называютъ яловыми, въ третій годъ бываютъ стѣльны, такъ и она послѣ въ третій годъ сѣмена приносятъ. Можно назвать оную *озимою капустою*, ибо послѣ и пересадка оной производятъ точно такъ, какъ зимовой кочанной капусты.

Въ сочиненіи Г. Рейххарта и другихъ садоводства учившей мало объ ней упоминается; но во общепользныхъ запискахъ Г. Геппенса упоминается запи-

ска одного Хозяина, что водилъ онѣ сѣю капусту шаковымъ образомъ: онѣ разсады, посѣянной 24 Юня, вышли многія высадки на другой годѣ въ сѣменные стволы, нежели изъ посѣянныхъ въ половинѣ Августа; изъ шѣхъ же, кои подсаживалъ въ Апрѣлѣ и Маѣ (именно оставляя для сего разсаду на грядѣ), почти ни одинъ кустъ въ стволѣ не шелъ. Тѣ, которые въ стволы не пошли, получили послѣ 24 Юня спелбли около сажени вышиною, и въ руку шолщиною; лиспы же сполько больше были добрыхъ большихъ листовъ зимовой бѣлой капусты, сколько оныя бывающъ больше листовъ лѣтней бѣлой капусты. Видѣвшіе оную не могли счесть, чѣмъ была по обыкновенной темная капуста или по садовничьи брунколь.

Польза этой сполько рослой капусты въ обламываніи листовъ продолжалась по Декабрь. Тогда я сѣю зимую капусту, по надобностямъ грядъ для инаго употребленія весною, пріуготовляя оныя подѣ зиму, вынулъ, вспахнулъ навкосъ въ порожнюю гряду, и мало по малу обламывая листы для дожныхъ коровъ, шолокъ, толстые изъ нихъ крошилъ, а спержни оставлялъ людямъ въ пищу.

Кипо по сему имѣетъ охоту сѣю этою темною озимою капустою сдѣлать опытъ, шомъ посѣи сѣмена обыкновен-

веннаго брунколя въ половинѣ Августа, или еще и позднѣе, послѣ сильнаго дождя, но не ранѣе; припомѣ не на свѣжей землѣ, но на другой опорожнившейся и еще не перекопанной, содравъ только съ поверхности праву граблями, и когда сохнешь, переграбивъ землю опять. Еслилижъ принуждено сѣять по свѣжей землѣ, тошчасъ по вспапаніи разсѣй сѣмена, утопчи ихъ ногою въ ногу, и послѣ на четверть вершка глубиною проскрабъ граблями. Сѣять же должно очень рѣдко, и послѣ прорвать разсаду, чтобъ каждому растѣнію сдѣлался просторъ. Это составляетъ лучший способъ къ удержанію отъ выбѣганія въ сѣменные сиволы. Со мною однажды случилось, что вся гряда этой разсады была густа и осталась зимовать; въ Апрѣлѣ вся пошла въ сиволы, кромѣ растѣній сивоявшихъ сдѣлленно на краю гряды. По сему разсаду должно сѣять очень рѣдко, или прорвать послѣ, а особливо ту разсаду, кою должно высаживать въ слѣдующемъ Марѣ или Апрѣлѣ.

Но къ сему попребно, чтобъ огородъ, въ кошоромъ разсада зимовать остается, отъ зайцовъ и дикобразовъ былъ безопасенъ. (Послѣдніе приключаютъ великой вредъ капустѣ, а особливо поздней низкой, у кошорой выдаютъ сердце.) Если же безопасно, то

совѣшую я разсаду содержать въ такомъ огородѣ, куда сїи враги капусшы войти не могутъ; и тогда, естли въ такомъ огородѣ не будетъ мѣста къ пересажденію ея, оставишь зимовать на грядѣ, и въ слѣдующую весну пересадишь: или, какъ Г. Рейххартъ обѣлой кочанной капусшѣ совѣшаетъ, разсаду въ Октябрѣ высадишь на порозжую гряду въ безопасномъ огородѣ, отъ сѣвернаго и восточно-сѣвернаго вѣтра въ защищѣ, на вершокъ между собою разстояніемъ, по самое сердце въ землю; и въ слѣдующемъ Мартѣ, или какъ скоро снѣгъ сойдетъ и земля оттаешъ, пересадишь на гряду, подъ нее назначенную, на семь вершковъ въ квадратѣ разстояніемъ. Таковое разстояніе для нее не шѣсно, и можешъ она большіе лисы произвесъ; сидишь же она въ этомъ положеніи не слишкомъ просторно, и можешъ собою закрыть порозжія промежки.

По сему послѣднему способу стоишь она зиму свободнѣе и прохладнѣе, а потому слѣдующею весною еще меньше пойдетъ въ сѣменные спволы; бывъ же посажена по самое сердце въ землю, имѣвъ защищу отъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ, въ слѣдующія иногда сухія зимы не столько отъ морозовъ вреда терпишь. Трудъ и употребленное время къ разсаживанію таковой
раз-

разсады осенью, на вершокъ разспоянїемъ, изобильно награждается въ слѣдующее лѣто довольствомъ лисповъ къ обламыванію.

Что касается до сѣменъ этой капусты, думаю я навѣрное, что когда получены будущъ ошъ оной новыя сѣмена, оныя по тому, что корень уже бываетъ двулѣтній, могутъ быть прочнѣе, и чѣмъ долѣе будутъ отъ сего рода собираніе сѣменъ, отъ часу будутъ оныя прочнѣе, шакъ что на послѣдокъ разсада отъ нихъ либо совсѣмъ не спашетъ иппи въ спволъ, или только не многіе кусты оной; подобно какъ лакшукъ, спинашъ, кервель, когда нѣсколько лѣтъ сряду сѣмена ихъ получаемы будущъ отъ зимняго лакшуку, зимняго спинашу и зимняго кервелю, всегда позднѣе будутъ выходить въ сѣменной спволъ, нежели отъ сѣменъ, полученныхъ отъ лѣшняго рода показанныхъ салашовъ. По тому же основанію счишаю я, что сѣмена, продаваемыя подъ именемъ зимняго брунколя, отъ копорыхъ разсада выходятъ совершенно сходная къ высокому брунколю, отъ обыкновенныхъ сѣменъ брунколя не больше различествуюшъ, какъ только шѣмъ, что собраны оныя съ шаковой капусты, которая нѣкогда учинена была зимовою. По сему я поздно сѣяннаго брунколя кочарыгъ никогда на сѣмена не высаживаю,

ваю, но беру высадки отъ разсады, сѣ-
янной въ Февралѣ и Мартѣ; ибо опасаясь, что отъ поздно сѣмой капусты
полученныя сѣмена, а особливо естѣли
то повторится нѣсколько лѣтъ сряду,
легко могутъ принять свойство рано
выбѣгать въ сѣменные спволы. Во вся-
комъ случаѣ можетъ быть полезно
сѣмена всякихъ капустъ собирать отъ
высадковъ озимой капусты, а потомъ
употреблять оныя, какъ для полученія
лѣтней, такъ и зимней капусты. —

Не давно выше упомянуто объ оста-
вляемой въ огородахъ къ зимованію капу-
сты. Нѣкоторые изъ моихъ пріятелей
сказывали мнѣ, что они капусту свою,
дабы оной зимою не покрали, пересаживали
близъ своихъ домовъ, но находили
оную отчасти ушатавшюю вкусъ, частью
же замерзшею, и что они года за два предъ
симъ избавились сего неудобства, когда
начали поступать съ своею капустою по
слѣдующему наставленію Г. Геннена, нахо-
дящемуся въ его Энциклопедическомъ лѣ-
тописцѣ:

Капусту должно вынимать въ Ека-
терининъ день, 24 Ноября. Естѣли учи-
нишь это ранѣе, листы на ней увядаютъ,
и даже совсѣмъ опадаютъ, а особливо
когда теплые дни послѣдуютъ. Вынутая
такимъ образомъ капуста изъ отдален-
ныхъ огородовъ связывается въ вязанки,
относится на свое зимовье, шутъ на гря-
дѣ

дѣ прокапывается малой ровокѣ, глуби-
ною соразмѣрно вышиной сажаемой въ него
капусты, и для высокой самой капусты
глубиною вершковѣ въ семь, или больше;
въ этотѣ ровѣ сажать капусту рядомъ
и такъ близко, чтобѣ только спержни
или сердце ея между собою не сполкну-
лись, что сосжавишѣ простору между
оними на ладонь. Ровокѣ припомѣ дѣ-
лается искошенно, и капуста пошому са-
дится такъ нагнуто, что спержень или
сердце ея будетѣ ошстоятъ опѣ земли
вершка на три, или по крайней мѣрѣ на
шесть вершковѣ.

Когда первой ровокѣ будетѣ накла-
денѣ, выкапывается въ семи вершкахѣ
разстоянїемѣ опѣ него другой. Вынима-
емая изѣ него земля кладется на корни
капусты, въ первомѣ ровкѣ находящейся, и
по наполненїи земля упашивается, чтобѣ
капуста сѣла швердо и могла вкоренишѣ-
ся. Послѣ того укладываетѣ капусту въ
другой ровокѣ, и спержни оной приля-
гушѣ на кочарыги первого ряда; пошомѣ
копается третїй ровокѣ, и поступаетѣ
по вышеписанному.

Естьли таковымѣ образомѣ укладено
будетѣ рядовѣ восемь, должно оспавишѣ
между оними и другими рядами проходѣ,
безѣ чего весною много ошпрысковѣ мо-
жетѣ бышѣ поломано.

Малая и низкорасшущая капуста са-
жается таковымѣ же образомѣ, сѣ шѣмѣ
шоль-

только различіемъ, что ровки для нес-
копавшѣ не такъ глубоко, чтобы спер-
жни оной прились на ладонь распояні-
емъ отъ земли. Не должно же оную и
класнѣ такъ шѣсно, пошому что у оной
спержни или кочанки, а особливо у рода
Бардовикской капусты, обыкновенно бы-
вають крупнѣе, нежели у высокой капу-
сшы, и отъ продолжительныхъ дождей
отъ шѣсношы легко могутъ загнить.

Высокая капуста въ расходъ употреб-
ляется прежде, для того что когда она
не будетъ покрыта снѣгомъ вершковъ на
семь вышиною, скоро побитая будетъ мо-
розомъ; низкорастущую капусту употреб-
ляютъ послѣ. Еслижъ случится, что
высокая капуста замерзнетъ, то зимою
только не лзя будетъ употреблять ея
спержней, но въ Апрѣлѣ опуститъ она
прекрасные побѣги, коими можно будетъ
пользоваться до половины Мая. Когда же
морозъ сію капусту убьетъ, такъ что
она не опрыскнетъ; тогда остается еще
хороша низкая капуста. Хотя же и сія
отъ переменъ дождливой и морозной пого-
ды повредится, то кочарыги этой низкой
капусты не вымерзаютъ, по крайней мѣ-
рѣ въ шѣхъ часяхъ, кои покрыты зем-
лею. Опускаютъ отъ прекрасные побѣги
отъ самой поверхности земли, и даже изъ
оной; а какъ скоро настанетъ тепло,
либо въ началѣ Апрѣля, или въ половинѣ
онаго, можно уже обламывать оныя къ
упо-

употребленію въ пищу. Какая бы зима ни случилась, навѣрное въ Апрѣлѣ будущѣ отъ нее оппрыски, кои тѣмъ пріятнѣе, чѣмъ тогда еще въ зелени великой недоспапокъ.

Многую защищу отъ морозовъ оппрыскамъ капусты составляешь, когда можно высадить показаннымъ образомъ оную такъ, чтобъ отъ сѣвера или сѣверо-востока составлялъ ей прикрытіе отъ холодныхъ вѣтровъ домъ, заборъ или иное зданіе. Въ этомъ намѣреніи высаживая наклоняющъ оную на полдень: суровые и холодные вѣтры тогда переходящъ чрезъ нее скользя. Ежели же наклонишь оную на сѣверъ или сѣверо-востокъ, можетъ вѣтромъ поддувать подъ нее, и тогда холодомъ повредишь несказанно больше глазковъ, изъ коихъ выходятъ оппрыски.

Весенніе капустные оппрыски бывающъ годны въ пищу по самой Май. Обыкновенно разцвѣщающъ они въ первую недѣлю онаго, и тогда уже къ употребленію бывающъ негодны. Поселику оныя до того времени нужны, что само по себѣ разумѣется, что капусту должно осенью высаживать на шакую гряду, которая не нужна подъ иныя растѣнія, каковыя гряды бывающъ нужны для бобовъ и позднаго гороху. Когда синіе бобы въ первыхъ числахъ Мая сажашъ должно, что остальные капустные кочарыги выдергивающъ совсѣмъ для скопины предъ тѣмъ, ибо
часть

часть оныхъ съ самаго цвѣша выдергана уже бываешъ для коровъ. Тогда гряда, умяченная копаніемъ подъ посадку капусты, будетъ гошова : нужно лишь оную загрести, и бобы уродятся на ней хорошо.

Если же огородъ обширенъ, и можно выгадашь гряды, не нужныя къ безпрестанному засажению, то лучше высаживать капусту на шаковую гряду, копорой бы предстоящее зданіе дѣлало засѣнь опъ полуденнаго солнца: ибо извѣстно, что растѣнія, у насъ зиму выдерживающія, тогда погибають, когда замерзлое опъ солнца пришаешъ, а въ слѣдующую ночь опяшь замерзнешъ, и эшо чрезъ нѣскольکو времени будетъ перемѣняться. Извѣстно также, что самая высокая капуста, если не будетъ скорѣ покрыта снѣгомъ, и приномъ въ шаковое мѣсто будетъ высажена, въ копоромъ въ продолженіи морозовъ всегда оспанешся замерзлую, и опъ солнца не распаевашъ, опъ того не пропадешъ, или не вымерзашъ, какъ природъ сего растѣнія свойственно. Г. Раммель повѣствуетъ, что зимою 1763 года, въ копорую снѣгу было мало, даже петрушка, рапунцель и дрягтя морозъ выдерживающія растѣнія совсѣмъ вызябли; а къ тому присовокупляешъ, что капуста, въ тѣни сидѣвшая, осталась цѣла, но освѣщаемая солнцемъ вымерзла.

Поелику въ таквомъ тѣнистомъ мѣстѣ всю зеленую капусту можно уберечь

речь цѣлу такъ, что всѣ очки оной отпрыскнушъ, и въ Мартѣ или Апрѣлѣ навѣрное пускашъ побѣги; слѣдственно больше оныхъ будетъ, нежели нужно для весенняго употребленія въ пищу; то можно таковою грядою еще и другимъ образомъ воспользоваться, а именно: получить съ оной много сѣменъ къ выбиванію масла. Она сидитъ для сего довольно пространно, потому что много съ оной сплотовъ съ Марша по Май или до половины Мая на пищу будетъ выломано, такъ что свободно можетъ оная всюду завязать сѣменные спручья. Отъ высаживанія капусты въ тѣнистомъ мѣстѣ произойдетъ еще и та выгода, что изъ каждого цвѣтика завяжется сѣменной спручокъ; напрошивъ, естли сидитъ оная на освѣщаемомъ солнцемъ мѣстѣ, и случится теплая и сухая погода, то нападающъ на цвѣты ея земляныя блохи, кои зародыши спручей въ нихъ выѣдающъ.

Мало домовъ въ городахъ и по деревнямъ, въ которыхъ бы съ Декабря, а именно, какъ скоро морозы вкусь зеленой капусты поправяшъ, не бѣли оной хотя однажды въ недѣлю, или бы бѣлы не желали; также зимою продающъ оную вдвое дороже обыкновеннаго. Почему сельскому Хозяину должно стараться изъ вышеписаннаго наставленія беречь капусту въ зиму дѣлать употребленіе. Многимъ однако не доспанетъ удобности

высадишь капусту такъ, чтобъ она за-
щищена была отъ полуденнаго солнца ка-
кимъ нибудь зданіемъ. Однакожъ всякое
открытое мѣсто безъ дальняго труда и
убытку можно отъ зимняго не высоко
ходящаго солнца защитить. Къ сему на
примѣръ можно сдѣлать слѣдующее изъ со-
сновыхъ вѣтвей, сквозь которую солнеч-
ные лучи до посаженной подъ нею капусты
доходить не могутъ. Надлежитъ вбить
въ землю толстыхъ жердей въ надлежа-
щемъ разстояніи, привязавъ къ нимъ по-
перегъ лушошекъ, коими горохъ переть, въ
два ряда, а къ онымъ прислонивъ сосно-
выхъ или еловыхъ вѣтвей привязавъ,
чтобъ вѣтромъ не отваливало: это со-
составитъ посаженной капустѣ отъ полуден-
ной стороны защиту и тѣнь. Въ недо-
статкѣ вѣтвей помянутыхъ иглистыхъ де-
ревъ, можно употребить прутья или
длинную солому, и привязавъ или пере-
плестъ къ показаннымъ жердямъ и лушош-
камъ. Когда же въ огородѣ состоитъ опа-
сность отъ зайцовъ, можно загородишь
таковыми соломенными стѣнками мѣсто
со всѣхъ четырехъ сторонъ, и тѣмъ зай-
цовъ удержавъ отъ капусты. Для тако-
выхъ соломенныхъ стѣнъ потребно на-
бить въ землю гороховыхъ лушошекъ ря-
да въ 3 или четыре, и между оными на-
пихать соломы, а отчаси перевязать,
чтобъ вѣтромъ не раздувало. Само по се-
бѣ разумѣется, что длинная сторона этой
обго-

обгородки или продолговатаго четвероугольника должна быть съ полуденной стороны къ удержанію солнечныхъ угре-вовъ, а прошивоспоящая спорона съвер-ныхъ вѣтровъ; и еспли можно таковую загородку сдѣлать изъ тесницъ (кои ве-сною опять разобрать удобно), тѣмъ бу-детъ лучше. Тесницы всего легче запу-скають въ выдолбленной пазъ вкопанныхъ сноповъ, такъ какъ во многихъ мѣстахъ дѣлають около дворовъ и садовъ забо-ры. Во время жестокихъ морозовъ мо-жно эту обгородку накрывать на время досками, и по окончаніи оныхъ снимать. А еще того лучше можно морозъ удержатъ, когда вмѣсто досокъ сверху изрѣше-нныя жердями, накрыть длиннымъ кон-скимъ навозомъ, или сухими кореньями травы собачины или малаго повою, ко-шорыя борсною изъ пашенъ выпаскивають.

Наконецъ, здорова ли капуста и до-скавляеть ли доброе питаніе, вообще опредѣлить не можно. Изъ всѣхъ капустъ цвѣтная капуста легче вѣрится въ желудкѣ. Кочанная капуста и бруколь питають мало, и тяжела для желудка. Между тѣмъ ни мало не вредно, когда вмѣстѣ съ питательными пищамя упо-треблять и таковыя, кои меньше пита-ють. Надмѣніе производящее свойство ка-пусты обыкновенно уменьшается тѣмъ, когда много съ нею вмѣстѣ есть хлѣба и сильно работаютъ; для особъ средняго

состоянія производитъ пожъ дѣйствіе, что они употребляютъ съ капустою пряноспи, колбасъ, вѣнчину и копченое мясо; равнобрно во многихъ домахъ есть похвальное обыкновеніе класъ въ капусту много укропу или кишнецу. Славный Докторъ Г. *Беръ* замѣчаетъ въ разсужденіи капусты только вообще, что вода, въ которой варена капуста, пріемлетъ вонючій запахъ; а пошому легко догадаться можно, что скрываются въ ней щелочныя непремѣнныя частицы, почему не должно оной употреблять въ таковыхъ болѣзняхъ, въ которыхъ соки гнилое сосшояніе оказываютъ; напрошивъ же съ пользою, когда въ оныхъ кислоша господствуютъ.

Когда Кокъ, славный обѣхатель кругомъ земнаго шара, въ 1775 году, послѣ трехлѣтняго и 18 дней путешествія возвратился, потерялъ онъ изъ бывшихъ съ нимъ на кораблѣ 200 человекъ только четырехъ, и при томъ одного отъ болѣзни, а трехъ по несчастливому случаю. Между дѣшическими средствами отъ столько опасной въ продолжительныхъ путешествіяхъ цынгошной болѣзни оказываетъ свѣжая пряность солода хорошую услугу въ удерживаніи распространенія сего припадка, хотя на морѣ болѣзнь сію тѣмъ совершенно прекратить не можно. Онъ давая кислой капусты на каждого человека въ недѣлю по 2 фунта и больше,

на-

нашелъ лучшее средство отъ скорбута, такъ что вмѣсто того, чтобъ по обыкновенному исчисленію обѣ умирающихъ, изъ 200 человекъ сего возраста въ 3 года по крайней мѣрѣ 20 надлежало помереть отъ болѣзней, а у него, какъ упомянуто, умеръ только одинъ.

43) В о б ы.

Въ садовничествѣ обыкновенные бобы, кои иначе называются *румяные бобы*, противупоставляются *свиннымъ бобамъ*. Румяные же бобы раздѣляются на плетистые или вьющіеся, и на пряморастущіе бобы.

АА. Обыкновенныя вьющіеся бобы, или фазолы.

Многіе садовники называютъ сіи бобы въ противоположеніе пряморастущимъ или низкимъ бобамъ перистыми; попому что оныя подобно вьющемуся гороху должно наперяшь, выпыкая лушошки или хвороспинки, около копорыхъ бы они обвиваться могли. Въ нижней Саксоніи, и отчаспи въ Маркѣ, называютъ ихъ *фитсбоне*, или какъ многіе пишутъ и выговариваютъ *фицбоне*. Для повареннаго употребленія, по крайней мѣрѣ въ домахъ средственнаго состоянія, содержатъ одни *бѣлые бобы* или *фазолы*, отъ которыхъ отличаютъ *пестрые*.

Изъ бѣлыхъ бобовъ есть отродія, кои въ разсужденіи употребленія зеленыхъ

спручевъ въ пищу другимъ предпочитающа-
ся. Таковы извѣстны подъ именемъ *меч-
ныхъ бобовъ* и *Швейцарскихъ бобовъ*.

Швейцарскіе бобы называютъ инако
ломкими, и *сахарными бобами*. Послѣ-
днее названіе не по значенію, чшобъ бо-
бы сіи были сладки, такъ какъ сахарной
горохъ, но по тому лишь оное дано, чшо
молодые не спѣлые спручья оныхъ, по-
добно помянутому гороху, не имѣющъ вну-
три швердой лузги или лыка, по садовни-
ческому называемаго. Ломкими бобами на-
зываютъ ихъ потому, чшо ихъ въ
рукъ на шрое и на чешверо разламыва-
ютъ для варенія. Это бывающъ тогда
только, пока сѣмена въ нихъ мягки, но
уже почти полны намыющъ. Въ среднемъ
Маркѣ Брандбургскомъ соснавляютъ они
обыкновенное блюдо въ Августѣ и Септя-
брѣ съ говядиною или бараниною. При-
готовленіе сего кушанья самое скорое, по-
тому чшо бобовъ сихъ вскорѣ наломать
можно, и когда они подложены будуще въ
мягко уваренное мясо, въ короткое время
разкипающъ. По сему огородники больше
всего прилежатъ къ вожденію сего рода
бобовъ, для шого чшо на нихъ больше ра-
сходу. Пока спручья ихъ еще зелены, кро-
шатъ ихъ тонкими полосками для упо-
требленія въ соусы, чего не можно дѣ-
лать, когда спручья устарѣющъ. Для та-
коваго крошенія предпочитаютъ *мечные
бобы*, пошому чшо спручья ихъ бывающъ
вдвое

вдвое длиннѣе и втрое шире, а потому крошеніе оныхъ скорѣе происходишъ.

Пестрые бобы называются впрочемъ *Турецкими бобами*, или *забавными*; послѣднее названіе производишъ единствен- но опѣ красивости и крупности сѣ- менъ, а по цвѣту ихъ, которой бываетъ самой алой, называютъ ихъ *огненными бо- бами*. Есть также пестрые бобы сѣ ма- лыми сѣменами, кои величиною разняюш- ся сѣ малыми фазолями, имѣющими круг- лый зерна.

Къ Турецкимъ пестрымъ бобамъ над- лежатъ крупные фазоли, имѣющіе бѣлыя сѣмена, которые опличу я здѣсь именемъ *бѣлыхъ мясистыхъ бобовъ*; потому что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и пестрые Турец- кіе бобы въ разсужденіи толстаго мяси- стаго ихъ спручка такъ называютъ.

Бѣлые мясистые бобы имѣютъ бѣ- лыя крупныя сѣмена и бѣлые цвѣты. Они лучше родятся по навозу обыкно- венныхъ вьющихся бобовъ, распушъ вы- ше, и больше спручье въ приносяшъ, неже- ли шѣ. Кому нужны одни только сѣмена бобовъ, должно пому преимущественно сажать бѣлые мясистые бобы; потому что гряда оныхъ больше сѣменъ прине- сешъ, нежели при другихъ и равныхъ онымъ величиною; равно какъ и сушеные они сполькожъ мягки бываютъ, какъ обы-

кновенные фазоли, и сполькожъ шонко-
кожи. Они заслуживающъ еще пошому пре-
имущесвенно бытъ сажаемы, что зеле-
ные спручья ихъ хорошо крошить въ соусы.
Во многихъ домахъ любящъ блюдо тако-
выхъ крошенныхъ бобовъ сполько, что и
осенью оное еще не наскучиваетъ. Бѣлые
мясисные бобы таковымъ охотникамъ до-
лѣе удовлетворяющъ могутъ, пошому что
еслы оныхъ не обрывать, то до поло-
вины Сентября будутъ имѣть зеленые
спручья, и припомъ лучше всѣхъ другихъ
бобовъ осеннѣе морозы выдерживающъ; ибо
извѣстно, что зеленые спручья другихъ
вѣющихся бобовъ небольшимъ морозомъ
убиваетъ. Морозъ не убиваетъ бѣлыхъ
мясисныхъ бобовъ прежде, какъ будетъ
имѣть выше двухъ градусовъ спужи по
Фаренгейтову шепломѣру; ибо оны имѣ-
ютъ шолстую мясисную кожу. Имѣютъ
же они предъ прочими вѣющимися бобами
то преимущесво, что меньше повре-
ждаетъ ихъ медвяная роса. Ашомъ 1784
года листы вѣющихся бобовъ во многихъ
мѣстахъ шакъ медвяною росою повредило,
что оны почернѣли и засохли, а отъ
того послѣдовалъ недостатокъ въ спру-
чьяхъ и сѣменахъ. Бѣлые же мясисные бо-
бы напрошивъ ошались у меня на шой
же грядѣ, бывъ посажены смѣшанно съ
другими вѣющимися бобами, цѣлы и до-
брошны; въ другѣе же годы можно ихъ по-
зднѣе крошить и заготовлять въ прокъ,
по-

потому что они не шаковы въ спручяхъ шверды, какъ другіе.

Что песырые Турецкіе бобы упошребляюшся къ обвиванію листвяныхъ бесѣдокъ, эшо извѣстно. Иногда сажаютъ ихъ въ горшки для забавы, и спавяшъ на окна. Пчелы посѣщаютъ ихъ цвѣты, и приномъ несравненно больше цвѣты бѣлыхъ мясисыыхъ бобовъ, нежели другихъ вьющагося рода.

ВВ. Ползучіе фазолы или карлочки.

Ползучими бобами называютъ ихъ потому, что они распушъ очень низко, и какъ бы ползутъ по землѣ, а для того оныхъ и не перяшъ. Есть изъ сего рода съ плоскими и круглыми сѣменами, кои въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ опличеніе называютъ гороховыми бобами, яичными и принцессиными.

Фазолы карлочки сажаютъ множественно въ огородахъ и на поляхъ, а особливо тамъ, гдѣ къ напериванію въ лѣсѣ недостатокъ. Въ полѣ сажаютъ ихъ обыкновенно на паровомъ клину, вспахавъ подъ нихъ землю съ осени и вшорично весною. Въ огородахъ занимаютъ оными особливыйя гряды, или обсаживаютъ въ садахъ рабашки и дорожки.

Между бѣлыми карлочками бобами прочимъ родамъ предпочитаются *Англинскіе*

скіе фазолі карлочки, пошому чшо они рано поспѣвають, и можно ихъ въ парникахъ сажать. Желаящимъ сажать ихъ въ парникахъ должно дать онымъ поостынуть немножко, и не забывать къ провѣтриванію приподнимать оконницы. На открытомъ воздухѣ сіи фазолі карлочки предъ другими вьющимися бобами, въ одно время посаженными, ранѣе цвѣтуть и спручя приносятъ недѣлю и двумя. Есть желтые плоскіе фазолі карлочки, кои на открытомъ воздухѣ не токмо первые зацвѣтають, но и спручя ихъ въ кушанье поспѣваютъ, имѣютъ кожу мягче, а пошому пріятнѣе, для которой оныя единственно и сажаютъ.

Я замѣчаю у себя ежегодно, что фазолі карлочки, когда посажены будутъ на жирной землѣ, хошябъ сѣмена ихъ изъ другаго мѣста получены были, шолько въ половину росла плеші свои выводятъ, и когда отъ оныхъ сѣмена опять посажены будутъ, выходятъ изъ того ползучіе бобы. Почему не должно употреблять подъ нихъ тучную землю. Еслии мѣсто будетъ низменно, а погода случится продолжительна дождливая, спручя легко загнивають и сѣмена въ нихъ погибають. Еслии въ огородѣ нѣтъ возвышеннаго мѣста, должно гряду дѣлать подъ нихъ съ возвышеннымъ ребромъ, съ которой бы вода скоро стекаетъ могла.

На вопросъ, кою родъ фазолей сажашъ выгоды, вьющихся или ползучихъ? должно отвѣстствовать, что содержаніе урожая бобовъ карлочекъ противу вьющихся сосипавляеиъ какъ 1 къ 4. Хотя замѣняеиъ въ разсужденіи бобовъ карлочекъ расходъ на шичинки къ напериванію, но это сбереженіе мало важно: ибо урожай вьющихся бобовъ расходъ эиоиъ далеко замѣняеиъ. Впрочемъ хотя бы въ безлѣсѣ шичинки издадека привозишъ и дорого покупашъ, но въ бережи могуиъ оныя служишъ лѣиъ 12 и 15, когда ихъ по употребленіи собравъ оиоисишъ въ сухое мѣсио. Здѣсь разумѣюиъ словыя шичинки оскoblеныя, а не лупошки или липовыя: словыя очень прочны, и когда будуиъ оныя не довольно смолянисны, нужно шолько концы ихъ, пока быиъ онымъ въ землѣ, обжечь. Я испыывалъ употребляшъ ольховыя жердки, закаливая оныя сырыя въ хлѣбной печи; но оныя едва 4 года выдержали. Прочнѣ оныя быиъ могуиъ, когда держашъ ихъ въ водѣ до шѣхъ поръ, какъ дерево зашвердѣеиъ, какъ желѣзо.

Время къ саженію фазолей въ Маѣ, для того что молодые ихъ всходы малѣишій ночный морозъ убишъ можеиъ. Ранѣ сажашъ ихъ по шому не ловко, что сѣмена ихъ въ землѣ, не довольно согрѣваемой солнцемъ, легко загниваюиъ. Между шѣмъ, кто рано желаетъ получашъ спручья, можеиъ

жешъ одно саженіе произвешъ въ половинѣ Апрѣля, второе въ исходѣ, а третье въ половинѣ Мая. Кто же очень рано фазоли сажашъ намѣренъ, не долженъ сѣменъ мочить, кои впрочемъ цѣлыя сушки проращиваютъ.

Вьющіеся бобы требуютъ влажнаго чернозема, однако подобно гороху карлочки довольствуются и худю землею; но на первой урожаются лучше. Гряду подъ фазоли или вьющіеся бобы дѣлаютъ шириною въ полшора аршина, по шнурку раздѣляютъ вдоль на четверо, проводятъ борозды, кладутъ въ нихъ бобы, на три вершка разстояніемъ, и засыпаютъ землю на вершокъ.

Но какъ бобовъ сажаютъ разные роды, берутъ деревянную шарелку, проверяютъ въ оной 7 скважинъ, утверждаютъ въ оныхъ по толстой спицѣ въ вершокъ длиною, а въ срединѣ шарелки ушверждаютъ палку, локтя въ три длиною, и этою шарелкою напыкаютъ въ грядѣ скважины, и кладутъ въ нихъ бобы. Другіе дѣлаютъ гряду аршина въ два длиною и больше, вшыкаютъ въ нее по шнурку жердки, къ напериванію употребляемыя, на каждомъ разстояніи десять вершковъ, около каждой жердки обводятъ кругомъ борозду, сажаютъ въ оную 7 и 8 бобовыхъ зеренъ, и загребаютъ землю. Ибошорые шаковымъ же образомъ около жерд-

жердки обводятъ пальцомъ кругъ, въ пол-
вершка глубиною, сажаютъ въ оной 5 и 6
бобинъ, и потомъ на вершокъ вышины
засыпаютъ землею.

Сажаніе бобовъ первымъ способомъ
тамъ предпочиташъ должно, гдѣ земля
правяниста или шверда такъ, что пре-
жде полошья должно будетъ оную вска-
пывать, чтобъ сдѣлалась рыхлѣе. Рабо-
ту сію удобнѣе производишь мотыкою,
когда бобы посажены будутъ рядами по
снурку.

Когда послѣ сажденія послѣдуетъ за-
суха, должно гряду надъ вечеръ слегка
спрыскивать водою, и продолжашъ повшо-
реніе сего 8 дней.

Гряду подъ фазоли должно въ огоро-
дѣ такъ располагать, чтобъ оная дру-
гимъ растѣніямъ низкимъ отъ солнца за-
стѣни не дѣлала, и оныхъ бы не глуши-
ла. Бобы требуютъ защиты отъ сѣвер-
наго вѣтра и много солнца. Можно выю-
щіеся бобы сажашъ подъ голеняшими де-
ревьями; но это удобно только въ отно-
шеніи къ спручьямъ, которые зеленью упо-
требляшъ въ пищу, а не до сѣменныхъ
бобовъ, кои отъ застѣни не высѣютъ,
или по крайней мѣрѣ созрѣютъ очень
поздно. Фазоли карлочки напротивъ мо-
гутъ сидѣть подъ деревьями лучше.

Кромѣ помянушаго вскапыванія земли
около фазолей пошребно опалываніе къ
даль-

дальнѣйшему за оными хожденію. Вьющимся бобамъ нужно оное только однажды, для того что они, поднимаясь вверхъ, сорнымъ травамъ расти не допускающъ. Для карлосковыхъ же можетъ оное по состоянію земли нужно быть два раза, ибо впрочемъ нѣкопорыя травы бобы сѣи легко одолевашъ и глушатъ.

Очень хорошо жердки выкапывать или наперивать скоро послѣ того, какъ бобы взойдутъ, елики только оныя не встѣкнушы были при саженіи бобовъ. Я многократно замѣнилъ, что равно наперенные взшедшіе бобы отъ морозовъ мало вреда терпятъ или вовсе никакого, нежели шѣ, кои въ холодныя ночи стояли не наперены. Но крайней мѣрѣ перекапываніемъ не должно ждать по шѣхъ поръ, какъ бобы пустятъ плени; ибо тогда между собою перекручиваются, и шрудно не повредивъ ихъ распросать.

На грядѣ, на кошорой бобы посажены въ 4 ряда, должно жердки перекапывать въ 3 ряда, а именно по срединѣ рядъ, и съ обоихъ боковъ по ряду. Или дѣлающъ гряду въ аршинъ съ четвертью шириною, сажаютъ бобы на ней въ два ряда, а жердки выкапывашъ съ обѣихъ сторонъ навось, чтобъ концы ихъ вверху сошлись. Таковымъ образомъ подъ оными можно свободно ходить, и струщая, кои обыкновенно внутрь висятъ, свободно очищать.

вашь. Еще иные, у копорыхъ въ жердкахъ недосапковъ, засаживающъ гряды въ чешыре ряда бобами, и шолько съ боковъ жердки вошкнувъ переплешающъ ихъ шакъ, чшобъ концы ихъ надъ серединою гряды кресшъ сосшавили. На смычкъ жердей другъ къ другу вверху кладущя шакковыя же жердки поперегъ, а на смычкахъ связывающъ лыкомъ или мочаломъ, чшобъ вбшпромъ ихъ не расшачало. Отъ шаковой связки происшодитъ шаковая швердосшь, чшо никакимъ вихремъ на опшкрытомъ мбшстъ опрокинуть ихъ неможешъ. Два среднихъ ряда бобовъ наперивающъ шолько прушиками шаковой длины, чшобъ плеши по онымъ лишь до переплешу жердокъ добрашься могли, а пошомъ вились и просширались, куда хошяшъ. Впрочемъ жерди должны бышь не корошки и не шонки, а безъ шого концы ихъ отъ шягосши плодовъ обламывающя. Эшотъ родъ наперивантя въ особливосши шамъ хорошъ, гдъ Хозяинъ желаешъ бока огороду шакъ прикрышь фазолями, чшобъ сосъди и мимоходящје на огородъ ничего видъшь не могли.

Вообще не хорошо на влажной и шушной землѣ наперивашъ бобы корошкими жердями: плеши на шаковыхъ перепушывающя шшолько, чшо вверху глохнушъ и плодовъ принесшъ не могушъ.

Когда отъ вьющихя бобовъ желаемо получишь много спблыхъ сбменъ, должно

по-

послѣ Ильина дни (20 Іюля) крайніе концы бобовыхъ плешей обрѣзать, дабы удержать нѣмѣ ростъ и пишательной сокъ обрашину въ плоды. Если сие будетъ упущено, то плети будутъ росны и цвѣсти даже въ Сентябрѣ, такъ что едва трень спручевъ выпѣетъ.

Можетъ потому случиться, что къ половинѣ Сентября находящія спручя, хотя съ полными, но еще мягкими сѣменами. Одинъ ночной морозъ можетъ ихъ повредить и къ употребленію сдѣлать негодными, что при многомъ вожденіи бобовъ сихъ не малой убытокъ составляетъ. По сему должно шаковые недоспѣлые спручя заблаговременно снимать, и вылучивъ бобы сушить, или сырые мало по малу варить для стола, потому что сушеные тверды и не шаковы вкусны бывающъ.

О такъ называемыхъ ломкихъ бобахъ выше сказано, что ихъ посадскіе и крестьяне въ Нѣмецкой землѣ очень любящъ, а потому у огородниковъ на нихъ великой расходъ. Послѣдніе, примѣнивъ въ Сентябрѣ, что послѣдуетъ ночной морозъ, и бобы повредить можетъ, выдерживающъ жерди обще съ плешми, складывающъ малыми кучками на землѣ, подсплавъ въшочекъ, или сухой бобовой или гороховой соломы, а сверху прикрывающъ чѣмъ нибудь, удобнымъ отъ морозу защищать.

тишь. Таковымъ образомъ можно уберечь свѣжіе спручья еще нѣсколько недѣль.

Когда бобы поспѣютъ, собираютъ ихъ въ ведреной день, и зерна либо вымолачиваютъ, или въ вечернее время заспавляютъ домашнихъ служителей оныя изъ спручьевъ вылущивать. Для продажи послѣдніе бывають шоварѣе вымолачиваемыхъ, для того что цѣны на шокъ много зеренъ вредятъ и плющатъ. Лузгу и плеши сихъ бобовъ высушивая опдають въ кормъ шѣляшамъ и овцамъ; а бобы содержатъ въ бочкахъ, и для посѣву могутъ оныя быть годны пять лѣтъ. Когда недоспѣлые бобы содержатъ въ себѣ еще сырость, во избѣжаніе сего должно спручья до вылущиванія поддерживать нѣсколько недѣль, разсыпавъ на полу въ прохладномъ мѣстѣ шонкимъ слоемъ, и переворачивать граблями, могутъ они лежать долѣе, не потерявъ своего вкуса, и не сдѣлавшись твердые.

Зеленые спручья къ употребленію въ пищу зимою опчасши солятъ, часью же сушатъ. Когда же служить онымъ вмѣсто салата, солятъ ихъ въ укусѣ подобно малымъ огурчикамъ. Обыкновенно для повареннаго употребленія крошатъ ихъ извѣстнымъ образомъ вкось по спручку, и перешрусивъ соломою кладутъ въ кадочку, и хранятъ въ погребѣ. Къ сушенію, когда оныя еще очень зелены, кладутъ

въ кошелъ кипящей воды, снимаютъ пѣну, опяшь вынимаютъ, охлаждають въ холодной водѣ, кладутъ на рѣшето, или на ивовую рѣшешку, и засушиваютъ на воздухѣ, или еще лучше въ хлѣбной печи, не очень горячей. Если сушишь оныя на солнцѣ, теряютъ они свой зеленой цвѣтъ. По высушеніи привѣшиваютъ въ мѣшкахъ въ сухомъ мѣстѣ. Но чтобъ оныя въ пріуготовляемомъ кушанье были сполькожъ вкусны и мягки, какъ соленые, должно ихъ заранѣе съ вечера въ водѣ мочить, а по утру гошовишь отваривая въ мясномъ бульонѣ.

Пифагоръ внушеніе бобовъ отсовѣщивалъ, и самъ оныхъ не ѣдалъ. Не извѣстно, какого рода бобы онъ разумѣлъ. У насъ зеленые фазолы всякому пріятны и здоровы, а сухія оныхъ сѣмена равномерно по подобію гороху безъ вреда ѣдятъ.

ВВ. Свинные или синіе бобы.

Поелику Ботаника одинъ только родъ изъ бобовъ составляетъ, то въ общезнѣшій опличаютъ отъ вѣющихся бобовъ сїи. Сверхъ того крупные свинные бобы опличаютъ отъ малыхъ, которые въ среднемъ Маркѣ называются конскими или кормными бобами, и во многихъ мѣстахъ сѣютъ оныя множественно на поляхъ для лошадей и свиней. Надобно думать, что малые синіе бобы составляютъ выроdkовъ отъ

отъ крупныхъ: ибо самые крупные budú отъ часу мѣлѣть, есъли отъ часу на худой землѣ budú сажены. Большіе синіе бобы надлежитъ сажать въ пучную мягко уопанную землю, есъли хотѣть, чѣобъ имѣли они величину свою. Каждый бобъ сажается на 7 вершковъ отъ другаго разстояніемъ, и вершка на полшора или на 2 глубиною. Въ нѣкопорохъ садахъ обсаживающъ оными дороги по шнуру.

Морозъ не очень вредитъ бобы сїи, а хопя бы и побилъ оныя, то опять опрыскивающъ. Можно пошому садить ихъ начавъ съ Марша по Май, даже въ глубокую осень. Они содержатъ въ себѣ сїю особливостъ, чѣо хопя бы зеленые спручья съ нихъ ощищать, и сѣволы до половины срѣзать, они опять цвѣсти спанущъ и плодъ принесущъ. Предъ саженіемъ обыкновенно мочатъ ихъ сушки въ навозной водѣ.

Бобы сїи въ нижней Нѣмецкой землѣ, пошому чѣо очень рано поспѣвающъ, не рѣдко идущъ на столъ въ дворянскихъ домахъ, а именно подъ названіемъ песпраго Веспфальскаго блюда. Вылуцивъ молодые мягкіе бобки, варящъ съ молодою морковью, зеленымъ горохомъ, дикимъ перцомъ, и подающъ къ копченой вѣшчинѣ. Нѣкопороыя бобы кладущъ цѣлакомъ, а другіе слупляющъ съ оныхъ кожицу, и тѣмъ учиняющъ вкуснѣе и не такъ вѣшры производи-

ми. По извѣстію Г. Рейххарта въ нѣкопорохъ мѣспахъ Тирингена продають поспѣлые бобы варенные мѣркою, и простой народъ во время работы ѣстъ ихъ холодные.

Хотя сїи бобы лежатъ 5 лѣтъ всхожи, но не могутъ удержаться въ шаковой доброшѣ, какъ фазоли: ибо чѣмъ долѣе лежатъ, тѣмъ больше вредяшъ ихъ черви; но фазоли не бывають подвержены никакимъ насѣкомымъ.

Сухіе синіе бобы употребляютъ въ деревняхъ отъ худаго зрѣнія: шрутъ оныя на шерку шюю спороною, на которой зародышъ; мѣсятъ въ шѣшо на розовой водѣ, и прикладываютъ къ вискамъ шакъ, какъ нарывной пластырь. Это очень шянешъ, и не рѣдко оказываешъ желаемую услугу.

Примѣч. Перевод. Синихъ бобовъ, сосжженныхъ на подобіе кофе, мука составляетъ въ присыпкѣ многокрашно испытанное мною средство, и всегда удачное отъ свѣжихъ ранъ и ожоги, когда уже пузырь прорветъ или сначала скочитъ кожа.

44) Горохъ огородной.

Горохъ вообще раздѣляютъ на полевой и огородной, изъ котораго первой съють въ полѣ, а послѣдній шолько въ огородахъ. Оба рода выраживающъ въ одномъ.

номъ. Большая часть огородниковъ утверждаютъ, что огородной горохъ выражается и мѣлѣе, когда оной съ году на годъ сажашъ на одномъ мѣстѣ или грядѣ. Вѣрно то, что тонкокожій сахарной горохъ, когда садишь его нѣсколько лѣтъ на одномъ мѣстѣ, получаетъ твердую лузгу. Я на здѣшнихъ поляхъ замѣтилъ, что крестьяне, сѣявъ огородной такъ называемой кишкисной горохъ въ полѣ, съ году на годъ получали отъ него горохъ дробнѣе зерномъ и соломою, а на послѣдокъ совсѣмъ оной сравнялся съ обыкновеннымъ полевымъ.

Огородные горохи бывають не токмо зерномъ крупнѣе, но и вкуснѣе полевого гороху, а именно въ зеленомъ состоянїи; для того что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а особливо въ Маркѣ Брандбургскомъ, гдѣ земля не тверда или не связна, полевой горохъ сухой лучше бываетъ вкусомъ огороднаго, потому что желтъ какъ воскъ, въ вареньи же столько тонкожъ, что нѣтъ нужды оной проширать, и такъ разваривается, что кожи совсѣмъ не примѣтно. Кто желаетъ собственнаго сладковатаго вкуса огородному гороху въ сухомъ состоянїи, тотъ въ нѣкоторые годы содержитъ оной и полевой горохъ въ показанныхъ мѣстахъ больше или меньше. Но сладковатой сухой горохъ не всякому нравится; довольно, когда только нѣтъ въ немъ праянаго вкуса, какъ въ горошкѣ.

Въ садовничьихъ спискахъ сѣменамъ содержишся иногда болѣе 15 родовъ огороднаго гороху, изъ коихъ упомянемъ здѣсь только о первенствующихъ:

Скороспѣлой горохъ можно садить два раза въ году. Когда первой посаженъ будетъ рано въ Февралѣ или Мартѣ, то по созрѣнїи онаго на той же грядѣ можно посадить въпорично, и къ осени оной опять поспѣетъ въ пищу. Должно для сего гряды готовить еще съ осени, избирая къ тому мѣсто, къ полднямъ нѣсколько скатъ имѣющее, да и гряду съ сѣверной стороны дѣлать нѣсколько выше, и шѣмъ грядѣ еще больше къ полднямъ наклонить. Въ большихъ городахъ и близъ оныхъ избирающъ къ сему огородники мѣсто къ садовому забору или спѣнѣ, чѣлобъ солнечные лучи на оную ударяли, а отъ сѣвернаго вѣтру имѣла бы оная защиту; отъ сего выспѣвающъ спручья двумя недѣлями ранѣе, нежели на другихъ мѣстахъ огорода. Гряду подъ него дѣлаютъ не шире двухъ аршинъ, и сажаютъ сѣмена, какъ скоро снѣгъ сойдетъ, рядами, на 2 вершка и съ половиною разстоянїемъ, и на вершокъ глубиною. Морозъ имѣетъ скороспѣлой горохъ не очень вредитъ, и къ продолженію онаго рода замѣчаютъ тѣ стебли, кои прежде другихъ начнутъ цвѣсти; оныя замѣчаютъ, и оставляющъ спручья къ собранію сѣмянъ.

Большой горохъ или грецкой, у Нѣмцовъ клункеръ или фонтанельной, имѣетъ вкусъ слаще и пріятнѣе перваго, также и крупнѣе сѣмена. Перить онаго не надобно, естли только сидишь въ защитѣ, чшобъ въпромъ не поваляло. Когда первой садки горохъ эшотъ соидетъ, сажаютъ на шомъ же мѣстѣ въпорично, чшобъ во все лѣто въ зеленыхъ спручьяхъ недоспашка не было.

Сахарной горохъ, или крупной Голландской, приноситъ спручья въ добрыя полвершка шириною и до шрехъ вершковъ длиною, внупри безъ жесткой лузги, и пошому способные цѣлкомъ въ кушанье. Цвѣты на немъ бѣлые, а плети вырастаютъ почти въ сажень, почему не лзя оныхъ перить хвороспинками, для шого что толстыя сего гороха плети шонкія подпоры вѣсомъ своимъ придавляютъ, сами заламываются, и отъ шого безплодны бывають. Не должно же и поздать напериваніемъ онаго, чшобъ плети на землю не повалялись, или не перепушались.

Кистистой горохъ, кронной и розовой горохъ. Хошя эшотъ горохъ на худощавой землѣ безъ напериванія пробытъ можетъ, но на землѣ посредственной доброты необходимо перить оной должно; пошому что у него спручья всѣ выходятъ изъ кроны или верхнихъ часшей плети, отъ чего оная обременяется и притяги- вается къ землѣ.

Карлочка горохъ или францъ, изъ всѣхъ родовъ самой низкорастущей: ибо плени его не бывающъ выше двухъ или съ половиною вершковъ; почему онъ всѣхъ способнѣе для парниковъ. Нѣкоторые обсаживаютъ эшимъ горохомъ края грядъ.

Для имени только можно сюда причесть такъ называемой *спаржной горохъ*. Оной надлежитъ собственно къ породѣ лопусной дяшловины. Пленъ онаго бываетъ не больше семи вершковъ длиною, и разширяется на многія вѣшви. Послѣ бывающихъ въ Юнѣ красныхъ цвѣтовъ слѣдующъ спручья, кои зеленые бдяшъ опварные съ спаржнымъ соусомъ.

Огородной горохъ сажаютъ единственно только для зеленыхъ спручьевъ, копорые чѣмъ ранѣе выдутъ, тѣмъ пріятнѣе, и дороже продаются.

Въ разсужденіи самыхъ сихъ зеленыхъ спручьевъ заслуживающъ огородники одобреніе, дѣлающіе подъ свой горохъ такъ узкіе гряды, чтобъ не болѣе двухъ рядовъ гороху на оныхъ умѣстилось, для того что средніе ряды онаго сполькожъ, какъ и крайніе, отъ щипашелей спручьевъ топчущся и приводятся въ безпорядокъ; напрошивъ гряду въ два ряда съ обѣихъ сторонъ такъ обирашъ можно, не повредивъ ни одной плени. Широкія гряды не рѣд-

ко безобразяшъ весь огородъ, бывъ перемѣшны и пошопшаны обирашелями спручьевъ.

На узкихъ грядахъ равномерно не долженъ Хозяинъ позволяшъ обирающимъ, чшобъ употребляли они одну только руку, и порывая оною опривали вмѣстѣ плечи или оныя заламывали, какъ-то дѣлающъ сѣи обирашели изъ лѣнкости и способности. Отъ прирваннаго или заломленнаго гороху плодовъ ожидать не можно, или только мало. Къ сорванію каждаго спручка должно употребляшъ обѣ руки: одною брашъ за черешокъ спручка, а другою оной опшамывать. Но рѣдко проходивъ безъ ломанія и прирыванія плечей, когда либо одна рука къ обиранію употребляется, или хотя и другою рукою придерживаютъ, но за самую плешь, а не за черешокъ спручка. Всего лучше спручьа обстригашъ старыми ножницами, или обрѣзывать оспрыми малыми ножичками.

Кому не нуженъ горохъ рано поспѣвающій, для котораго по вышеписанному дѣлающъ гряду у садовой стѣны, по не худо и для позднаго гороху, чшобъ имѣлъ оной защиту отъ вѣтра: ибо оной, а особливо бурею и грозю сопровождаемой, когда ударяетъ въ высокой горохъ безъ задержки, оной отчасти опровергаетъ на землю, часпью же ломаетъ плечи, и опустошаетъ гряду шакъ, чшо мало принесетъ оная спручьевъ.

Земля подъ горохъ должна быть сама по себѣ мягка и нѣсколько смѣшана съ пескомъ. Черноземъ также очень для него способенъ. Если земля будетъ навозная, то огородной горохъ шѣмъ больше расстетъ вверхъ, а потому должно располагать и жердки къ напериванію онаго, чтобъ въ этомъ случаѣ не вышли оныя корочки.

Образъ саженія гороху не одинаковъ. Протягиваютъ шнурокъ вдоль гряды, проводящъ по оному бороздки рукою или полотьбенною лопаткою, и когда по состоянію земли горохъ должно сажать больше или меньше рѣдко, то сѣмена засыпаются землею, изъ шѣхъ же бороздокъ вынутою, и земля граблями уравнивается, не такъ, чтобъ горошины не обнажились. На худой землѣ ряды или борозды проводятъ на три вершка между собою разстояніемъ, а сѣмена въ бороздкахъ чтобъ легли на полвершка другъ отъ друга. Инымъ образомъ сажаютъ горохъ, не проводивъ бороздокъ, но по шнуру рукою, вершка на два съ половиною разстояніемъ, всегда бравъ въ руку по шести горошинъ, и продолжаютъ саженіе, пока вся гряда будетъ засажена. Таковымъ образомъ сажаетъ у меня престарѣлой лѣсовщикъ изъ давнихъ лѣтъ свой горохъ, окапываетъ оной слетка тогда, какъ вырастетъ оной вершка въ два отъ земли: горохъ его всегда

гда бывалъ лучше и бодрѣе, нежели у меня, по первому образу сажаемый, такъ что явскорѣ учинился его подражателемъ. Всякъ долженъ испытывать, какимъ образомъ на его землѣ садишь горохъ способѣе, и когда послѣдній способъ найдетъ лучше, то можешь поступать такъ, какъ выше писано было о фазоляхъ карлотахъ, а именно, чтобъ въ большую ямку сажаемыя зерна пришлись между собою на четверть вершка разстояніемъ. Когда весною владычествуетъ холодная сухая погода, и землю очень выдуваетъ, тогда молодой горохъ, часто между собою сидящій, лучше выдерживаетъ сію погоду, нежели растущій рѣдко.

Хотя бы земля и влажна была, но горохъ всегда предъ сажденіемъ размачивающъ, чтобъ оной совсѣмъ разбухъ. Когда сіе разбуканіе происходитъ по посадкѣ въ самой землѣ, многія зерна оголяются приподнимаясь вверхъ, такъ что воробы, голуби и курошники, усмотрѣвъ оныя, начнутъ искать и выклеивать. Сажаемой по первому образу горохъ посѣщеніе сихъ непріятныхъ гостей скорѣе привлекаетъ, и больше погибаетъ, нежели сажаемый часпо. Пшеницы всегда идутъ вдоль по рядамъ, но естли находятъ кучками, то болѣе при оныхъ задерживаются, и не столько вреда приключаютъ.

къ

Къ отвращенію помянутыхъ птицъ отъ гороховыхъ грядъ огородники обыкновенно распынувъ ниченки вокругъ, привязываютъ къ онымъ перья, чѣмъ въшрѣмъ оныя качало. Но для воробьевъ чрезъ каждые три дни надобно пугалы перемѣнять вновъ, елики хотѣшь, чѣмъ они боялись. Голубей скорѣе отвратить можно, когда гряда наперена будетъ въшпочками. Гдѣ же водятся куропапки, и при томъ еще спадами собравшись, тамъ въшпочки не помогутъ; ибо подъ нихъ онѣ охотнѣе подлазятъ.

Въ молодости своей горохъ еще имѣетъ враговъ въ земляныхъ блохахъ, а повзрослши въ листовыхъ вшахъ, отъ которыхъ на послѣдокъ листья кажутся бѣлы, какъ бы напудренные, а тѣмъ препятствуется завязыванію и росту стручьевъ, или выходяиъ отъ того стручья пустые и зерна въ нихъ правяны вкусомъ, да и никогда выспѣшь и на сѣмена годны бытъ не могутъ.

Нѣкоторые садовники избавляются отъ сего золою и извѣстью, а именно: въ тихую погоду посыпаютъ гряду сухою золою или негашеною извѣстью, равномерно какъ дѣлаютъ шоже съ грядами бобовыми и огуречными, дабы при томъ землѣ и убоженіе доставить. Когда мыловаренную золу высыпать въ хлѣбную печь по вынушіи хлѣбовъ, на шо мѣ-

мѣсто, гдѣ пригребенъ былъ жаръ, то зола, и извесь шакже, получающъ прежнюю свою силу, шакъ чшо довольно будешъ насыпашъ оными въ меньшомъ количествѣ.

Зеленой неспѣлой горохъ сполько уважается у насъ, чшо оной заготовляющъ на зиму для повареннаго употребленія сушеніемъ. Въ эшомъ намѣреніи извъющагося или напериваемаго гороху избираютъ шопъ, кошорый называется зеленымъ, для того чшо оной и засохнувъ зелени своей не теряетъ. Когда засушенъ будешъ эшотъ горохъ вылущенной или въ спручьяхъ зеленыхъ, шо покупаютъ оной охотнѣ предъ другими за его зеленѣйшій цвѣтъ.

Неспѣлой молодой горохъ въ спручьяхъ не шокмо всякъ находитъ по своему вкусу, но и здоровымъ. Сухой горохъ напрошивъ не всякому хорошъ, для того чшо легко приключаетъ вѣшры. *Трагусъ* предписываетъ оной одержимымъ падучею болѣзнію, а другіе ободряютъ ошваръ его къ споспѣшествованію мѣсячнаго очищенія, облегченію исшеканія урины и ошвращенію запоровъ. Гороховою мукою многіе шрутся во время мышья, чшобъ кожа на шѣлѣ была чиста и нѣжна.

И з в ѣ с т і е.

Слѣдующая Пятая Часъ содержитъ *шесть главъ*. Въ первой продолжается описаніе повареннаго огорода, раздѣленное на спашьи 1) обь огурцахъ; 2) шыхвахъ; 3) дыняхъ; 4) арбузахъ; 5) спаржахъ; 6) земляницъ, и родахъ показанныхъ растѣній съ подробнымъ насавленіемъ, какъ оныя разводить и содержать, и проч. — *Вторая Глава* занимается пряными и шоварными шравами; описываются въ оной: маіоранъ, перцовникъ или сатурей, настурцій, базиликъ, шалфея, шиміянъ, лавендель, исопъ, руша, размаринъ, спручковой перецъ, чернушка, анисъ, укропъ, фенхель, кишнецъ, шафранъ, ревень, крапль, вейда, шабакъ, солодковой корень, ленъ, конопля и хмѣль. Растѣнія сіи описаны во всѣхъ родахъ и свойствахъ своихъ, и показаны всѣ лучшіе способы къ разводу, содержанію и употребленію оныхъ. Въ *третьей Главѣ* предлагается о садоводствѣ со всѣми подробностями онаго и родами древъ плодовыхъ и для увеселительныхъ садовъ служащихъ. Въ разныхъ оидѣленіяхъ описаны: 1) пишомникъ или древесная школа; 2) прививаніе различнаго рода; 3) пересадка деревъ; 4) шпалерникъ плодовыхъ деревъ, осприжка оныхъ; 5) шпалерныя деревья; 6) оспригаемые деревья разными вилами; 7) учрежденіе шпалерныхъ деревъ; 8) хожденіе за плодовыми

тыми деревьями, и леченіе отъ болѣзней;
 9) особливья правила для каждаго рода
 плодовыхъ деревъ и кустарниковъ, и
 прочее весьма многое и съ подробнымъ на-
 сѣщеніемъ. *Въ четвертой Главѣ* описы-
 вается виноградоводеніе со всѣми подроб-
 ностями. *Пятая Глава* ошносится до вино-
 дѣланія, хожденія за винами и сбереже-
 нія оныхъ въ погребахъ. Ошдѣленія этой
 главы слѣдующія: собираніе винограда, раз-
 боръ и ошипываніе гроздовъ, разные спо-
 собы дѣланья мостъ или сокъ виноград-
 ной, заквашиваніе винъ, сливаніе оныхъ
 по заквасѣ, разливаніе оныхъ, поджига-
 ніе винъ, болѣзни вина и леченіе, ошсыл-
 ка винъ, средства къ поправленію винъ,
 мѣшаніе хорошихъ винъ съ худыми, сгу-
 щеніе винъ замораживаніемъ, очищаніе винъ,
 невинныя поддѣльванія винъ, средства воз-
 вращать вину хорошій вкусъ и запахъ, о
 вредныхъ въ вины подмѣсахъ, искусствен-
 ное подкрашиваніе, поправленіе винъ,
 подосженныя вина, смѣсь вина съ водкою,
 опасная вина поддѣлка, о употребленіи
 и злоупотребленіи винъ, ошсаніе различ-
 ныхъ родовъ винъ, какъ Европейскихъ,
 такъ и всѣхъ вообще съ ихъ названіями,
 напослѣдокъ Спешинская цѣна винамъ въ
 покупкѣ. *Въ шестой Главѣ* ошсывается
 лѣсоводство съ насѣщеніями, какъ лѣса
 разводить; о должностяхъ лѣсовщиковъ;
 какъ лѣсъ содержать, какъ рубить, ка-
 кой, къ чему, и въ какое время; и проч.

и проч. — Все означенное предложено вообще, и при описаніи каждаго рода деревъ съ ихъ опродіями. По обширности сего предмета въ этой Части описаны только дубъ, букъ, кленъ и осина; окончаніе же сей машеріи займешъ начало шестой Части.

Конецъ втораго Отдѣленія

и

ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

О Г Л А В Л Е Н І Е

IV Части 2 Отдѣленія Хозяина и Хозяйки.

| | Спран. |
|--|--------|
| Продолж. III. Главы о поваренныхъ огородахъ. | |
| Паровыя гряды къ особливому употребленію. | 3 |
| Унавоживаніе огорода. | 16 |
| Вскапываніе огорода. | 22 |
| Обсѣваніе огорода. | 25 |
| Полоніе, поливаніе и пересадка. | 31 |
| Огородныя растѣнія: | |
| Салатъ лашукъ. | 39 |
| Рапунцель, полевой или ягнячій лашукъ. | 47 |
| Садовой крессъ. | 49 |
| Зимній или Сибирской крессъ. | 50 |
| Индѣйской крессъ. | 51 |
| Ключевой крессъ. | 52 |
| Ложечной крессъ. | 53 |
| Огуречникъ или боррашъ. | 54 |
| Пимпинель или бибернель. | — |
| Поршулакъ. | — |
| Цикорія или солнцева сестра. | 56 |
| Эндивія. | 61 |
| Кервель. | 64 |
| Драгунъ. | 67 |
| Трипъ мадамъ. | 68 |
| Часть IV. Отдѣл. 2. | III |
| | Скор- |

| | |
|--|-----|
| Скорцонера или черной овсяной корень. | 70 |
| Рѣпчатая селлерей или рапунцельной корень. | 72 |
| Садовой или рѣпной рапунцель. | 73 |
| Гонощи, рѣпной кервель или пеперлей. | 74 |
| Земляной орѣхъ или земляной каштанъ. | 75 |
| Американской земляной орѣхъ. | 77 |
| Земляные орѣшки или земляныя мыши. | — |
| Земляные яблоки, земляные арпишоки или Иерусалимскіе арпишоки. | 80 |
| Трюфели. | 82 |
| Картофели. | 88 |
| Лѣтніе картофели. | 95 |
| Осенніе картофели. | 99 |
| Осенніе картофели съ темною кожею. | — |
| Осенніе картофели съ желтоватою кожею. | 12 |
| Употребленіе картофелей къ разнымъ домовымъ надобностямъ. | 138 |
| Употребленіе картофелей въ кормленіе скотовъ. | 148 |
| Арпишоки, обыкновенные садовые арпишоки. | 158 |
| Кардовой арпишокъ. | 164 |
| Бѣлая рѣпа. | 166 |
| Малая морковная рѣпа. | 167 |
| Большая бѣлая рѣпа. | 175 |
| Майская рѣпа. | 176 |
| Длинная круглая бѣлая рѣпа. | — |

Морковь. - - - - - 198

Свекла. - - - - - 212

Двуцвѣточная морская свекла. - —

Огородная бѣлая свекла. - - —

Красная свекла. - - - 213

Большая монгольская рѣпа, тол-
стая свекла или Бургонская
свекла. - - - - - 218

Пастернакъ или пастинакъ. - - 224

Петрушка. - - - - - 227

Травяная петрушка. - - —

Коренчатая петрушка. - - 231

Селлерей. - - - - - 234

Сахарной корень. - - - - 237

Овсяной корень. - - - - 239

Хрѣнъ. - - - - - —

Рѣдка. - - - - - 246

Рѣдисъ или мѣсячная рѣдечка - 256

Лукъ. - - - - - 258

Обыкновенной рѣпчатой лукъ кра-
сной и бѣлой или лѣтній лукъ. —

Ивановской лукъ. - - - 274

Саженецъ. - - - - —

Зимовой лукъ. - - - - 276

Шалотъ или Аскалонской лукъ. - 278

Порей или лукъ съ чесночными ли-
стами. - - - - - 282

Поръ съ луковыми листьями или ма-
лой порей. - - - - —

| | Стран. |
|---|--------|
| Чеснокъ. | - 287 |
| Обыкновенной чеснокъ. | - — |
| Рокамболь или змѣистой чеснокъ. | 291 |
| Капуста. | - — |
| Кочанная капуста. | - 292 |
| Савойская капуста. | - 328 |
| Зеленая Савойская капуста. | - 329 |
| Брюква сверхземная. | - 330 |
| Брюква подземная. | - 331 |
| Цвѣтная капуста. | - 332 |
| Спаржная капуста или брококи. | - 337 |
| Листвяная капуста. | - 339 |
| Бобы. | - 357 |
| Обыкновенные вьющіеся бобы или фазоли. | - — |
| Ползучіе фазоли или карлочки. | - 361 |
| Свинные или синіе бобы. | - 370 |
| Горохъ огородной. | - 372 |

УКАЗАТЕЛЬ

На содержащіяся въ сей Части первенствующія вещи.

| | Стран. | | Стран. |
|--|---------|--|--------------|
| А. | | БЛОХИ земляныя, средство отъ нихъ. Ч. IV. | |
| А РТИШОКИ и роды оныхъ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 158 | Ошдѣл. 2. | - - 299 |
| — сбереженіе оныхъ чрезъ зиму. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 163 | БРОКОЛИ. См. Спар- жная капуста. | |
| — лѣкарствен- ное дѣйствіе. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 166 | БРЮКВА. Обѣ роды оной. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | 330 |
| — артишокъ кар- довой. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 164 | В. | |
| — артишокъ эс- ляной. См. земляные яблоки. | - - | ВОДОПОЙ на пасбищѣ. Ч. IV. Ошдѣл. 1. | - 248 |
| Б. | | Г. | |
| БОБЫ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | 357 | ГОНОЩИ , трава пова- ренная. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 74 |
| — вьющіяся бобы и роды оныхъ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 357 | ГОРОХЪ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 372 |
| — какъ оныя гото- вятъ для кухни. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 358 | — разные роды ого- роднаго гороху и сбрзѣ сажденія оныхъ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 374, 378 |
| — синіе или свиные бобы. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 370 | ГРЯДЫ , паровая гряда. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - 3 |
| | | — холодная. Ч. IV. Ошдѣл. 2. | - - |

| Стран. | Стран. |
|--|--|
| <p>ГРЯДЫ, паровая гряда изъ сухаго лису. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 4</p> <p>— скорыная гряда. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 5</p> <p>— пещеричная гряда. Ч. IV. Ошдѣл. 2, - 10</p> | <p>— кормленіе ско- повѣ. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 55</p> <p>— лѣкарства ско- памѣ ошѣ надмѣнія, производимаго дят- ловиною. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 59</p> <p>— какѣ кормить оною свиней. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 68</p> |
| Д. | |
| <p>ДРАГУНЪ салащѣ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 67</p> <p>ДЯТЛОВИНА красная или клѣвѣрь, или Ту- рская дятловина. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 13</p> <p>— ячменная дятло- вина что? Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 16</p> <p>— дятловинная смѣсь. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 18</p> <p>— сбразѣ сѣянія Г. Шуберта. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 20</p> <p>— гипсѣ и соль дятловинамѣ къ уго- бженію полезны. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 29</p> <p>— сженіе гипсу къ шму. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 30</p> <p>— какѣ осбирать дятловинныя сѣмена. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 40</p> <p>— сушеніе дятло- вины въ сѣна. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 49</p> | <p>ДЯТЛОВИНЫ, разные роды. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 100</p> <p>— желтая донная шрва. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 101</p> <p>— медвяная дятло- вина. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 103</p> <p>— бѣлая Голландская дятловина. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 104</p> <p>— красная горная дятловина. Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 108</p> <p>— красная остро- лисная горная дят- ловина. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 109</p> <p>— пузырьная дятло- вина. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 110</p> <p>— хмѣлиная сѣлая дятловина. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - 111</p> <p>— желтая хмѣлин- ная. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 112</p> <p style="text-align: right;">ДЯТЛО-</p> |

ан.

55

59

68

90

01

03

04

08

09

10

11

12

0-

Спран.

ДЯТЛОВИНЫ, хмѣлин-
ная улишковая Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - - 114
— Шведская луцер-
ная Ч. IV. Ошдѣл. I. —
— луговая стручи-
стая дяпловина.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 116
— малая стручи-
стая дяпловина. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - - 117
— козья дяпловина.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 120
— плоской горохъ.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 121
— земляной орѣхъ.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 122
— стручковая пра-
ва. Ч. IV. Ошдѣл. I. 125
— пестрой горо-
шекъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 126
— мышій горохъ.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 128
— вшиная шрава.
Ч. IV. Ошдѣл. I. - 130
— сѣмена ея спо-
собны къ откармли-
ванію домовыхъ
птицъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 135
— манжетка. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - - 137
— Англинской бур-
нетъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 138
— придорожная гор-
чица полезна овцамъ

Спран.

отъ чахошки, коро-
сты, и лошадямъ
отъ степицы. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - 140, 141
— въ числѣ дяпло-
винъ полагаемая:
спинашъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 142
— щавель. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - - 143
— репсъ или коль-
зашъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 147
— рѣшеніе вопроса:
истощаетъ ли дяп-
ловина землю? Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - 165-168

Е.

ЕНДИВІЯ, салатъ. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - - 61
— храненіе онаго
въ зиму. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 62-64
ЕСПАРЦЕТЪ. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 84
— какимъ образомъ
оной сѣять и содер-
жать. Ч. IV. Ош-
дѣл. I. - - - 93, 94
— заговѣленіе она-
го въ сѣно. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - - 96
— выборъ покуп-
ныхъ сѣменъ. Ч. IV.
Ошдѣл. I. - - 96-98

Ш 4

Ж.

Ж.

К.

ЖЕРНОВЪ корытной
машина. Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. 33

З.

ЗАМАЗКА для шре-
щинъ въ деревѣ.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. 327
— оконничная замаз-
ка. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 34

ЗЕМЛЯНОЙ орѣхъ. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. 122
— земляной орѣхъ
Американской. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. 77

ЗЕМЛЯНЫЯ мыши.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 77

ЗЕМЛЯНЫЕ яблоки.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 80

ЗЕМЛЯ изъ перегни-
вшихъ листовъ и дре-
весъ къ чему год-
на. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 290

— прочія земли къ
удобрению огородовъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. 290-298

ЗЛАКИ, прибавленіе обь-
онныхъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. 148

— Англинская бай-
грасъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. 149

— мешлинка. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. 152

КАЛЕНДАРЬ парнико-
вой. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 362

КАПУСТА. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. 291

— бѣлая или кочан-
ная, выборъ подѣ
нее земли, и какъ
водить оную въ лин-
товѣ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. 292

— различные обра-
зы капустоводства.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. —

— Хатедорново на-
ставленіе къ тому.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 298

— лучший способъ
пересаживать разса-
ду. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 306

— кормленіе коровъ
капустою. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. 312

— прибираніе и хра-
неніе. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. —

— высадки сѣмен-
ные. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 320

— провѣщиваніе ко-
чановъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. 323

— Зимовая кочан-
ная капуста. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. 326

— Савойская капу-
ста и роды оной.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 328

Слран.

Слран.

- КАПУСТА, цвѣтная** ка-
пуста. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 332
- **спаржная** капу-
ста. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 337
- **лиственная** капу-
ста и роды ей. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 339
- **свойства** капу-
сты. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 344
- КАРТОФЕЛИ.** Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - 88
- **лучше ли** землю
подъ нихъ копать,
или пахать? Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - 89
- **на какой** землѣ
какъ сажать. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - 90
- **роды** лѣтнихъ
картофелей. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - 97
- **какіе** картофели
здоровѣе въ пищу? Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 98
- **осенніе** картофе-
ли. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 99
- **скотскіе** или
Американскіе карто-
фели. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 102
- **разводъ** карто-
фелей ошъ сѣменъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 113
- **картофельное** зе-
мледѣіе. Г. Вергена.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 117

- **какіе** картофели
могутъ вредны быть
здоровью. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 128
- **сборъ** картофе-
лей или выниманіе
изъ земли, и сохра-
неніе. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 134
- **употребленіе** кар-
тофелей къ разнымъ
домовымъ надобно-
стямъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 138
- **вино** изъ карто-
фелей. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 144
- **употребленіе**
картофелей въ кор-
мленіе скотовъ. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - 148
- КОЧАННОЙ** салатъ,
смотри лашукъ.
- **какъ** собирать его
сѣмена. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 41
- КЕРВЕЛЬ.** Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - 64
- **врачебныя** его си-
лы. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 65
- **рѣпной**, смотри
Говощи.
- КЛЕВЕРЪ**, смотри кра-
сная дятловина.
- КОРМЛЕНІЕ** въ стой-
лахъ скота гдѣ нуж-
но и полезно. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. - - 241

| Стран. | Стран. |
|------------------------|-----------------------------|
| КОРМНЫЯ справы. Ч. IV. | — правила кѣ по- |
| Ошдѣл. 1. - - 9 | сѣву и содержанію |
| КРЕССТЪ. См. Цыггош- | ея. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 76 |
| ная справа. | — собраніе сѣменѣ. |
| КУДРЯВЕЦЪ. См. Овся- | Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 83 |
| ной черной корень. | |
| КРЮКЪ для полонья. | |
| Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 32 | |
| КУПАНІЕ скота еже- | |
| дневное сохраненіе | |
| отъ заразы. Ч. IV. | |
| Ошдѣл. 2. - - 251 | |
| | |
| Л. | М. |
| ЛАТУКЪ салатъ и ро- | МАГАЗИНЪ запасной |
| ды онаго. Ч. IV. Ош- | сухаго корму. Ч. IV. |
| дѣл. 2. - - 39 | Ошдѣл. 1. - - 263 |
| ЛОЖЕЧНАЯ трава. Ч. IV. | — какимъ образомъ |
| Ошдѣл. 2. - - 53 | сберегать кормѣ. Ч. |
| ЛУКЪ и роды онаго. | IV. Ошдѣл. 1. - - 265 |
| Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 258 | — правило кѣ заве- |
| — разные способы | денію магазина сего. |
| въ возденію. Ч. IV. | Ч. IV. Ошдѣл. 1. 270-274 |
| Ошдѣл. 2. - - — | МОРКОВЬ. Ч. IV. Ош- |
| — собраніе сѣменѣ. | дѣл. 2. - - 148 |
| Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 272 | — какъ оную сѣять. |
| — Ивановской са- | Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 199 |
| женецъ лукъ. Ч. IV. | — хранить въ зиму. |
| Ошдѣл. 2. - - 274 | Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 201 |
| — зимовой лукъ. | — высадки морков- |
| Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 276 | ные. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 203 |
| — лѣкарствен- | — лечебныя ея дѣй- |
| ное дѣйствіе луку. | ствія. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 204 |
| Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 280 | — польза для ло- |
| ЛУЦЕРНА. Ч. IV. Ош- | шадей. Ч. IV. Ош- |
| дѣл. 1. - - 69 | дѣл. 2. - - 205 |
| | — морковный сы- |
| | рокъ, вмѣсто сахару |
| | служащій, и приуго- |
| | товленіе онаго. Ч. IV. |
| | Ошдѣл. 2. - - 206 |
| | МУЧИМАЯ рожь что |
| | значитъ. Ч. IV. Ош- |
| | дѣл. 1. - - 160 |

ан.

76

83

63

65

74

48

99

01

03

04

05

26

160

Н.

Стран.

Н.

НАВОЗЪ голубиной и
куриной служить къ
обновленію спарыхъ
плодовитыхъ дре-
весь. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 18

— навозъ свиной
служить къ удержанію
спѣлости по-
варенныхъ растѣній.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 17

НАВОЗНАЯ гряда, см
Паровая гряда.

О.

ОВОЩНИКЪ. см Пова-
рочной огородъ,
ОВСЯНОЙ КОРЕНЬ. Ч.
IV. Ошдѣл. 2. 239

— черной или
скорсонера. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. 70

— употребленіе она-
го вмѣсто кофе. Ч.
IV. Ошдѣл. 2. 72

ОГОРОДНЫЯ растѣнія.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 39

— навозъ перетлѣв-
шій раздробившійся
умножаетъ урожай
и доброту оныхъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. 19

ОГУРЕЧНИКЪ. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. 54

ОКОННИЦЫ парнико-
вые. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 324

Стран.

ОПЫТЪ, какъ узнать
землю, требующую
унавоженія. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. 25

П.

ПАСВИЩЕ или ското-
паства Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. 177

— основанія проти-
ву скотопаствъ съ
возраженіями Ч. IV,
Ошдѣл. 1. 178

— основанія проти-
ву удержанія паст-
вы на паровомъ по-
лѣ съ возраженіа-
ми противу оныхъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. 204

— различіе состо-
яніе паствъ. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. 225

— скудная паства.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. —

— полная паства. Ч.
IV. Ошдѣл. 1. 227

— ошдѣленная паст-
ва. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 229

— ближняя паства.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. 231

— низменная паства.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. 232

— возвышенная па-
ства. Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. 233

— кислая паства. Ч.
IV. Ошдѣл. 1. 235

ПАС-

| Стран. | Стран. |
|---|--|
| ПАСБИЩЕ, еладкая па- ства. Ч. IV. Ошдѣл. I. 238 | навозъ для пар- никовъ. Ч. IV. Ош- дѣл. I. — 335 |
| — полевая паства. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — | накладываніе на- возу въ парники Ч. IV. Ошдѣл. I. — — |
| — дѣсная паства. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — | насыпаніе земли на навозъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 342 |
| — содержаніе и при- зоръ скотопаствъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — 242 | — присмотръ за парниками. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 345 |
| — вычищанія оныхъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. 243, 252 | — шпикованіе пар- никовъ что? Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 347 |
| ПАРНИКЪ, см. Паро- вая гряда. | — подогрѣваніе пар- никовъ. Ч. IV. Ош- дѣл. I. — — 349 |
| ПАРОВАЯ гряда. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 300 | — поливаніе. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 354 |
| — различіе паро- выхъ грядъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 302 | — паровыя гряды къ особливому упо- требленію. Ч. IV. Ошдѣл. 2. — — 3 |
| — положеніе паро- выхъ грядъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 304 | ПАСТАРНАКЪ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. — — 224 |
| — приготовленіе зе- мли. Ч. IV. Ошдѣл. I. 307 | ПЕПЕРДЕЙ. См. Гогощи. |
| — обгораживаніе парниковъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 314 | ПЕТРУШКА. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. — — 227 |
| — разстояніе отъ земли до оконницъ. Ч. IV. Ошдѣл. I. — 317 | — травяная пестру- шка. — — — — |
| — каменные парники для чего не удобны? Ч. IV. Ошдѣл. I. — 320 | — коренчатая пе- струшка. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. — — 231 |
| — парники особли- ваго рода. Ч. IV. Ошдѣл. I. — — 322, 323 | — сборъ съменъ и врачебныя свойства петрушки. Ч. IV. Ошдѣл. 2. — — 232, 233 |
| — покрываніе пар- никовъ. Ч. IV. Ош- дѣл. I. — — 324 | |

ПЕЧЕ-

ан.

35

42

5

7

9

4

3

4

7

1

3

-

Стран.

Стран.

ПЕЧЕРИЦЫ или шам-
пинионы, способъ
имѣть ихъ ежедне-
вно свѣжя. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - - 10
ПИМПИНЕЛЬ или би-
бернелъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 54
ПИСАРЬ, орудіе, служа-
щее при сажденіи
сѣменъ. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 304
ПОВАРЕННОЙ огородъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 275
— соснояніе добра-
го огорода. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. - - - 276
— какое мѣсто изби-
рать подъ овощникъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 277
— правила къ по-
правленію земли подъ
огородъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 1. - - 290-299
— унавоживаніе ого-
рода. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 16
— вскапываніе ого-
рода. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 22
— что припомѣ на-
блюдаютъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 23
— объясненіе и выборъ
сѣменъ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 25
— полоніе, полива-
ніе и пересадка. Ч.
IV. Ошдѣл. 2. - - 31
ПОЛИВАНІЕ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - 33

— нѣжныхъ растѣ-
ній зимою. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - - 37
ПОЛСТИ парниковыя
какъ дѣлать? Ч. IV.
Ошдѣл. 1. - - - 330
ПОЛУПАРНИКЪ что?
Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 316
ПОРТУЛАКЪ, и дѣкар-
ственные его силы.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 54
ПОРЪ или порей, роды
оного. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 282
— подъза оного до-
мовымъ животнымъ.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 284
— Испанской лукъ,
большой порей. Ч.
IV. Ошдѣл. 2. - - 285
ПРИМѢРНОЕ начерта-
ніе учрежденія па-
ствы для деревень,
въ которыхъ зимня-
го корму не до-
стаетъ по первыя
числа Мая. Ч. IV.
Ошдѣл. 1. - - - 258

Р.

РАЖОЛИРОВАНИЕ что?
Ч. IV Ошдѣл. 1. - 286
— какъ производя-
ся. Ч. IV. Ошдѣл. 1. 297
РАПУНЦЕЛЪ салатъ и
дѣкарственное дѣй-
ствіе оного. Ч. IV.
Ошдѣл. 2. - - - 48

РА-

| Стран. | Стран. |
|---|--|
| РАПУНЦЕЛЪ садо- вой. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 47, 73 | — лѣкарственные дѣйствія. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 175 |
| РОКАМБОЛЪ Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 291 | — бѣлая бѣлая рѣпа. Ч. IV Ошдѣл. 2. — |
| РѢДИСЬ , мѣсячная рѣ- дка. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 256 | — шарелочная рѣпа. Ч. IV Ошдѣл. 2. - - 276 |
| РѢДЬКА . Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 246 | — длинная круглая бѣлая рѣпа. Ч. IV. Ош. дѣл. 2. - - - — |
| — саженіе оной и какъ сдѣлать оную крупною. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 249 | — чѣмъ сохранять рѣпу отъ наѣско- мыхъ. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 177 |
| — какъ получать хорошія сѣмена. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - - 250 | — какъ шурнипсъ сохранять въ зиму. Ч. IV Ошдѣл. 2. - 182 |
| — лѣшняя рѣдка. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 252 | — кормленіе рѣпою скота. Ч. IV Ош- дѣл. 2. - - - 183 |
| — выходъ или по- гребъ къ храненію рѣдки и всякихъ корней. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - 252, 253 | — какъ запасаться рѣпными сѣменами, Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 192 |
| — свойство рѣдки и лѣкарственные си- лы. Ч. IV. Ошдѣл 2. 254 | — мѣра сѣменъ къ высѣву. Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 194 |
| РѢПЕЙНИКЪ , употрѣ- бленіе онаго въ кормѣ. Ч. IV. Ош- дѣл. 1. - - - 243 | РѢПЧАТАЯ сельдеря. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 72 |
| РѢПЫ , бѣлая рѣпа. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - - 166 | |
| — малая или Тел- шовская рѣпа. Ч. IV. Ошдѣл. 2. - - - 176 | |
| — храненіе рѣпы. Ч. IV. Ошдѣл. 2. 171-174 | |

С.

| |
|--|
| САХАРНОЙ корень. Ч. IV. Ошдѣл. 2 - - 237 |
| СВЕКЛА и роды оной Ч. IV Ош. дѣл. 2. - 212 |
| СЕЛЕРЯ . Ч. IV. Ош- дѣл. 2. - - - 72 |

СЕЛ-

н.

Стран.

Стран.

СЕЛЛЕРЕЯ, пересадки
оной. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 73

СКОТОПАСТВА. Смотри
Пасбище.

СМОРЧКИ и другіе гри-
бы какъ завесити на
грядяхъ. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 15

СОВѢТУЕМОЕ учрежде-
ніе пасивы. Ч. IV.

Отдѣл. I. - - - 253

СТЕКЛА, какъ ихъ чи-
стить, Ч. IV. От-

дѣл. I. - - - 353

Т.

ТРИП-МАДАМЪ салатъ.

Ч. IV. Отдѣл. 2. - 68

ТРЮФЕЛИ. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 82

— какъ оныя сы-
скиваютъ и какъ раз-

водятъ. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 85, 86

ТУРЦІКІЕ бобы. См.

Вьющіеся бобы.

ТУРНИПСЪ. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 179

Ф.

ФАЗОЛИ. См. Вьющіеся
бобы.

Х.

ХРЪНЪ какъ разводиль.

Ч. IV. Отдѣл. 2. - 239

— польза хрѣну ло-
шадямъ. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 244

— свойства его и лѣ-
карственные силы.

Ч. IV. Отдѣл. 2. - —

Ц.

ЦИКОРІА. Ч. IV. От-

дѣл. 2. - - - 56

— лѣкарственныеяси-
лы ея и употребле-
ніе въ кофе. Ч. IV.

Отдѣл. 2. - - - 58

ЦЫВУЛЯ. См. Лукъ.

ЦЫНГОТНАЯ трава или

крессъ, крессъ садо-

вой. Ч. IV. Отдѣл. 2. 49

— зимній крессъ. Ч.

IV. Отдѣл. 2. - - 50

— Индѣйскій крессъ
или настурцій. Ч. IV.

Отдѣл. 2. - - - 51

— приуготовление
оного въ укусъ. Ч.

IV. Отдѣл. 2. - - 52

— ключевой или во-
дяной крессъ, и лѣ-

кар-

Спран.

Стран.

карственный его си-
лы. Ч. IV. Ошдѣл. 2.

III.

ШАЛОТЪ. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - - 278
ШАМПИНИОНЫ. См. Пе-
черницы.

Ч.

ЧЕРВИ дождевые, чѣмъ
ихъ отвращать, ошѣ
разсады. Ч. IV. Ош-
дѣл. 2. - - - - 301
ЧЕСНОКЪ обыкновенной
и врачебный его силы.
Ч. IV. Ошдѣл. 2. - 287

III.

ЩИТЫ шроспниковые.
Ч. IV. Ошдѣл. 1. - 534

раи.

278

34





